



595.76
ENT

SIEBENBÜRGENS KÄFERFAUNA

AUF GRUND IHRER ERFORSCHUNG BIS ZUM JAHRE 1911


ZUSAMMENGESTELLT VON

Dr. KARL PETRI
BÜRGERSCHULDIREKTOR IN SCHÄSSBURG


HERAUSGEGEBEN

VOM

**SIEBENBÜRGISCHEN VEREIN FÜR NATURWISSENSCHAFTEN
ZU HERMANNSTADT**



KOMMISSIONSVERLAG VON
R. FRIEDLÄNDER & SOHN, BERLIN



SIEBENBÜRGENS KÄFERFAUNA
AUF GRUND IHRER ERFORSCHUNG BIS ZUM
JAHRE 1911

ZUSAMMENGESTELLT VON

Dr. KARL PETRI

BÜRGERSCHULDIREKTOR IN SCHAASBURG

HERAUSGEGEBEN

VOM

SIEBENBÜRGISCHEN VEREIN FÜR NATURWISSENSCHAFTEN
ZU HERMANNSTADT

KOMMISSIONSVERLAG VON
R. FRIEDLANDER & SOHN, BERLIN

Siebenbürgens Käferfauna

auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911

zusammengestellt von

Dr. Karl Petri

Bürgerschuldirektor in Schässburg



Hermannstadt

Buchdruckerei Jos. Drotleff

1912

Vorwort.

Seit dem Erscheinen der letzten entomologischen Arbeit des um die Landeskunde Siebenbürgens so verdienten Dr. phil. h. c. E. A. Bielz im Jahre 1887, welche übersichtlich das Ergebnis der Forschung auf dem Spezialgebiete der Coleopteren-Kenntnis bis zum Schlusse des Jahres 1886 darstellt, sind abermals 24 Jahre vergangen. Dieser lange Zeitraum ist auch an dieser Wissenschaft nicht spurlos vorübergegangen. Es haben sich die Methoden des Sammelns vervollkommenet, es hat sich die Literatur ausserordentlich vermehrt, indem zahlreiche Familien und Gattungen monographisch bearbeitet wurden, wobei das ganze palaearktische Faunengebiet Berücksichtigung fand, es sind die Instrumente der Untersuchung unter dem Einfluss der hohen Entwicklung der Technik leistungsfähiger und vollkommener geworden, der hochentwickelte Austausch von wissenschaftlichem Material hat das vergleichende Verfahren der Untersuchung gefördert, wodurch erst der Charakter der Fauna eines Gebietes ins rechte Licht gerückt und in ein bestimmtes Verhältnis zur Fauna der umgebenden Gebiete gebracht wird, die systematische Wissenschaft hat aber auch unter dem Einfluss der modernen naturwissenschaftlichen Theorien Elemente in sich aufgenommen, die ihr ursprünglich fremd sind, vor allen Dingen Entwicklungsgeschichte und vergleichende Anatomie, auch die Paläontologie wird mehr und mehr herangezogen, um die verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten, Gattungen und Familien sicherer festzustellen: die Entomologie ist aus einer rein systematischen zu einer biologischen Wissenschaft geworden, welche nicht nur gewisse äussere, morphologische Verhältnisse von systematischer Wichtigkeit, sondern das ganze Werden und Sein, das Leben der Tiere nach allen Richtungen berücksichtigt. Diese Einflüsse finden ihren Gesamtausdruck auch in der Zusammenstellung und Anordnung der Käferfauna ganzer faunistischer Gebiete, am vollkommensten in denen der ganzen Erde, im sogenannten natürlichen Systeme. Die Kataloge wollen also nicht mehr nur in Linnéischem Sinne als ein mächtiges Fachwerk angesehen werden, dessen Endzweck im wesentlichen ein nomenclatorischer ist, sondern sie geben ein Bild der verwandtschaftlichen Verhältnisse in der Ordnung der Käfer, soweit dieselben gegenwärtig wissenschaftlich festgestellt werden konnten. Es ist natürlich, dass dieses Bild um so lückenhafter ist, je kleiner ein

Faunengebiet abgegrenzt wird, weil darin alle jene Glieder ausfallen, welche nur eine beschränkte Verbreitung besitzen.*

Die Bestrebungen auf dem Gebiete der modernen Entomologie liefern auch das kritische Material, mit Hilfe dessen das bisher in Geltung gestandene System zahlreiche, wesentliche Veränderungen erfahren hat, die sich zu erkennen geben nicht nur in einer vielfach gegen früher abweichenden Gruppierung der Familien, Gattungen und Arten, sondern auch darin, dass die Charaktere der Abteilungen höheren und niederen Grades wesentlich schärfer gefasst wurden, wobei manche Familien wie die *Platypidae*, *Metaulacnemilae* ihre Selbständigkeit verloren durch Verschmelzung mit verwandten Familien, während andererseits manche Gattungen, wie z. B. die Gattung *Phrydiuchus* für *Marmaropus topiarius* Germ. und *Speiseri* Schultze, die Gattung *Brachyodontus* für *Rhytidosomus Reitteri* Weise, drei neue Arten und für *Amalus alpinus* Hampe etc. neu aufgestellt, und frühere Untergattungen zum Range von Gattungen erhoben werden mussten, so z. B. die frühere Untergattung *Phylonomus* Schönk., in der alten Gattung *Plinthus* die frühere Untergattung *Neoplinthus* Bedel; die alte Gattung *Cleonus* wurde sogar in 23 neue Gattungen zerteilt.

Von grosser Wichtigkeit gerade in entwicklungsgeschichtlichem Sinne ist die Variabilität der Arten. Die Vertreter einer Gattung zeigen alle untereinander eine gewisse Verwandtschaft. Ist die Stammform ausgestorben, welche gleichsam den Typus der Gattung darstellt, so führt die Entwicklung in verschiedenen Verbreitungsgebieten in divergierender Richtung zur Entstehung neuer Arten, die ganz bestimmt von einander unterschieden werden können. Doch kommt es wohl nicht selten vor, dass die Stammform, oder was man als solche nach dem gegenwärtigen Stande der Erkenntnis anzunehmen geneigt ist, in manchen Gebieten noch anzutreffen ist, in andern aber bereits zu divergieren beginnt; es entstehen die Varietäten oder Lokalrassen. Den Beginn dieser

* Ich habe mich auf die obigen Ausführungen auch aus dem Grunde hier näher eingelassen, um der Behauptung entgegenzutreten, dass einseitige Katalogisierung die wichtigste und einzige Aufgabe der modernen Systematik sei (vergleiche L. Ganglbauer: Die Käfer Mitteleuropas); obgleich auch der vielseitige Wert dieser wissenschaftlichen Beschäftigung nicht zu unterschätzen sein wird. Dieselbe schliesst ja vielmehr die Biologie als eine ihrer wesentlichen Aufgaben ein, und wenn gefordert wird, dass letztere intensiver zu betreiben sei, so geschieht dies aus dem Grunde, weil wir von verhältnismässig nur sehr wenigen Käfern ihr Leben in allen seinen Beziehungen kennen. Die Forderung ist also wohl berechtigt, und ich schliesse mich derselben aus vollem Herzen an: nur muss betont werden, dass zweckmässig zu betreibende Biologie, ich möchte sagen „experimentale Systematik“, nur im Zusammenhang mit Systematik denkbar ist, und dass die Pflege dieses Teiles der Wissenschaft viel frei verfügbare Zeit, Geduld, Ausdauer und Scharfsinn erfordert, was denn wohl auch mit die Ursache ist, dass so Wenige sich mit ihr beschäftigen können, obgleich das zu erstrebende Ziel, den Schleier von so manchem tiefen Geheimnis im Leben der Käferwelt mehr und mehr zu lüften ein so lockendes ist, und wohl auch von vielfachem praktischem Nutzen sein wurde.

Divergenz deuten bereits die individuellen Abweichungen an, wofür ein prächtiges Beispiel die Coccinelliden abgeben. Daher hat die moderne Entomologie die schwierige Aufgabe, auch diesen zahlreichen Variationen ihre eingehende Beachtung zu schenken, weil sie in ihnen das Mittel erkannt hat, die Verwandtschaft der Arten festzustellen und dadurch auch für die Entwicklungslehre ein reiches, nicht zu unterschätzendes Beweismaterial zu liefern.

Aber nicht nur in Beziehung auf den gegenwärtigen Stand der Systematik entspricht die Bielz'sche Käferfauna Siebenbürgens nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen, sondern es hat sich auch die Zahl der in Siebenbürgen seit ihrem Erscheinen aufgefundenen Arten bedeutend vermehrt. Das älteste systematische Verzeichnis der Käfer Siebenbürgens, welches von E. A. Bielz im I. Jahrgang der „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften 1850“ und im II. Jahrgang derselben Zeitschrift 1852 veröffentlicht wurde, enthielt 2220 Arten und 16 Varietäten und wurde durch spätere Nachträge bis Ende des Jahres 1853 um 257 Arten und 3 Varietäten, also auf 2477 Arten und 19 Varietäten vermehrt. Das von Karl Fuss im „Archiv für siebenbürgische Landeskunde“ unterm 15. Juni 1869, also 16 Jahre später, veröffentlichte Verzeichnis wies zusammen mit den in den „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenb. Vereins für Naturwissenschaften“ XXI. Jahrgang 1871, XXIII. Jahrgang 1873 und XXIV. Jahrgang 1874 einen Stand von 2983 Arten, also innerhalb 20 Jahren einen Zuwachs von 506 Arten aus. Die bis zum Schlusse des Jahres 1886 reichende, im XXXVII. Jahrgang der „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenb. Vereins für Naturwissenschaften“ im Jahre 1887 wieder von E. A. Bielz veröffentlichte Käferfauna Siebenbürgens ergab einen Stand von 75 Familien, 936 Gattungen, 3705 Arten und 320 Varietäten, demnach den ansehnlichen Zuwachs von 722 Arten innerhalb 12 Jahren.

Dank der unermüdlichen Sammelthätigkeit unserer siebenbürgischen Entomologen Friedrich BIRTHLER in Sächsisch-Regen, Friedrich DEUBEL in Kronstadt, M. v. KIMAKOWICZ in Hermannstadt, Alexander ORMAY, einstigen Gymnasialprofessors in Hermannstadt, Ludwig MÉHELY, einstigen Realschulprofessors in Kronstadt, A. MÜLLER in Hermannstadt, Eduard SCHEESER in Kronstadt, Rudolf ALBRECHT in Hermannstadt, Karl HÖCHSMANN, Bürgerschulprofessors in Schässburg, und des Verfassers, dann mehrerer ungarischer und zahlreicher deutscher, namentlich Wiener Entomologen, welche gelegentliche Sammeltouren in Siebenbürgen unternahmen, hat die Zahl der in Siebenbürgen nachgewiesenen Käfer innerhalb der letzten 24 Jahre abermals um 1 Familie, 181 Gattungen, 1058 Arten und 82 Varietäten zugenommen, wozu noch 324 Aberrationen hinzukommen, so dass sich ein gegenwärtiger Stand von 76 Familien, 1117 Gattungen, 4763 Arten, 402 Varietäten und 324 Abänderungen ergibt. Die auffallend starke Vermehrung der Gattungen ist zum Teil auf Rechnung des oben erwähnten Umstandes zurückzuführen.

Ich halte es für angezeigt, das immerhin schöne Ergebnis der Durchforschung der siebenbürgischen Landesteile Ungarns im wesentlichen durch die deutsche Arbeit von 9 Dezennien bekannt zu geben, namentlich auch um der Gefahr vorzubeugen, dass dasselbe spurlos verschlungen werde in einem Käferkatalog, der das gesamte Königreich Ungarn umfassen wird, in dem die siebenbürgischen Landesteile als *Hungaria orientalis* figurieren werden und dem auch die magyarisierende Tendenz unserer gegenwärtig noch üblichen Orts-, Fluss- und Gebirgsnamen nicht abzusprechen ist. Mit aus diesem Grunde habe ich und zwar nicht in Abkürzung, wie dies im Bielz'schen Verzeichnis der Fall ist, die ausgeschriebene, gegenwärtig noch in Geltung befindliche und allgemein bekannte Lokal-Nomenclatur verwendet.

Die Veröffentlichung des neuen Käferkataloges ist notwendig auch darum, weil sich in das Bielz'sche Verzeichnis zahlreiche Irrtümer eingeschlichen haben, wie sie sich bei der Schwierigkeit der Determination mancher Spezies auch in andern Verzeichnissen einstellen. Die Richtigstellung konnte an vielen Orten erfolgen und ist durch entsprechende Fussnoten angezeigt. In solchen Fussnoten ist auch auf solche Arten aufmerksam gemacht, deren Vorkommen bei uns zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, aber aus verschiedenen Gründen wenig wahrscheinlich ist. Hieher gehören auch solche Spezies, deren Vorkommen in den benachbarten Faunengebieten verbürgt ist, von denen jedoch eine nahe verwandte Art in neuerer Zeit beschrieben wurde, die wahrscheinlich die Stelle jener Form bei uns vertritt. So führt z. B. Bielz die in Oesterreich und in der Schweiz vorkommende *Laena viennensis* Sturm für Siebenbürgen an, da die vicariirende *Laena Ormay* Reitter erst 1887, also ein Jahr nach dem Erscheinen seiner »Fauna transsylvanica«, beschrieben wurde; ferner soll sich nach Bielz der *Liparus dirus* Herbst bei uns finden, weil ihm der viel später beschriebene *Liparus transsylvanicus* m. unbekannt war; auch der den Ländern des Mittelmeergebietes eigentümliche *Larinus longirostris* Gyllh. wird für den dem südöstlichen und östlichen Europa eigenen *Larinus Beckeri* m. angeführt usw. Es wird die Aufgabe unserer Entomologen sein, die endgiltige Berichtigung dieser zweifelhaften Fälle vorzunehmen.

Für die relative Richtigkeit der Angaben im neuen Verzeichnis bürgt auch mit der Umstand, dass das reiche und schöne Sammelergebnis unseres erfahrenen und erfolgreichsten Sammlers, Friedrich Deubel in Kronstadt, fast vollständig und auf das sorgfältigste von Autoritäten auf dem Gebiete der Entomologie determiniert wurde, wie Regierungsrat L. Ganglbauer, Direktor der zoologischen Abteilung des kaiserlichen Museums in Wien, kaiserlicher Rat Edmund Reitter in Paskau, Dr. Karl Daniel in München und Dr. Josef Daniel in Ingolstadt, Oberst Schultze in Detmold †, Dr. Eppelsheim in Germersheim †, Stierlin in Schaffhausen †, Dr. Krauss in Marburg (Steiermark), Dr. Holdhaus in Wien, Dr. Bernhauer in Grünberg (Oberösterreich), Dr. Flach in Aschaffenburg,

Schilsky in Berlin, J. Weise in Niederschönhausen-Berlin, Oberpostrat Formanek in Brünn u. a. Ebenso haben es die Professoren Ormay und Méhely gehalten und in zweifelhaften Fällen, namentlich wenn die nötige Literatur mangelte, hat auch der Verfasser die Unterstützung eines Teiles der angeführten Herren nie vergebens in Anspruch genommen, wofür denselben auch hier der verbindlichste Dank ausgesprochen wird.

Besonders wertvoll und auch reich an Erfolgen sind die Sammel-touren gewesen, welche L. Ganglhuber in Siebenbürgen unternommen hat, namentlich ist es die Sammelreise in das Rodnaer Gebirge, deren Ergebnis er in den Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Band XI, Heft 2, 1896 veröffentlicht hat.

Die Resultate einer vierjährigen Sammelperiode im südlichen und westlichen Siebenbürgen publizierte Professor Alexander Ormay in der Beilage zum Schulprogramm des Hermannstädter Staatsgymnasiums 1888 unter dem Titel »Adatok Erdély bogárfaunájához«. Er beschrieb in demselben an neuen Arten: *Pherositchus Elelkae*, *Sphaerosoma Reitteri*, *Meleus Elekeschii*.

Das Ergebnis einer ebenfalls vierjährigen Sammelarbeit im Kronstädter, Fogarascher, Háromszéker, Udvarhelyer, Csiker, Maros-Tordaer, Koloser und Szolnok-Dobokaer Komitat veröffentlichte der Oberrealschul-professor Ludwig Méhely in »Az értesítő tudományos közlemények, termész. tudom. szak.«, XX. Jahrgang, 2. Heft 1895.

Eine lobenswerte, mit analytischen Tabellen versehene Arbeit, bestimmt für die Hand der Schüler, schrieb im Programm des Klausen-burger röm.-kath. Obergymnasiums vom Jahre 1890/1 unter dem Titel »A kolozsvári bogárgyűjtő« Dr. Aloysius Pachinger. Abgesehen von dem pädagogischen Werte dieser Arbeit kann dieselbe mit Rücksicht auf die Bereicherung unserer Landeskunde nur mit Vorsicht benützt werden, da das von Schülern viele Jahre hindurch zusammengetragene Material mit Rücksicht auf seine Herkunft sehr unsicher ist und kaum aus der Umgegend von Klausenburg allein abstammen dürfte.

Ernst Csiki, Kustos an der zoologischen Abteilung des ungarischen National-Museums, schrieb in »A pótfüzetek (LV.) állattani közleményei,« 1900: »Magyarország cicindela-féléi« (*Cicindelidae*), in den Annales musei nationalis hungarici IV. Jahrgang 1906) »Beiträge zur Kenntnis der unga-rischen *Morphocaraben*.« Beschreibungen mehrerer Blindkäfer Sieben-bürgens lieferte derselbe in Annales musei nationalis hungarici II, 1904 von *Pholeuon hungaricum*; in derselben Zeitschrift I, 1903 unter dem Titel »Magyarországi új bogarak« von *Anophthalmus Deubelianus*; in der-selben Zeitschrift III, 1905 von *Anophthalmus pseudoparocetus*; in »Rovar-tani lapok« XI, 1904 von *Anophthalmus Sziladyi*; in »Természeti füzetek« 24, 1901 von *Anophthalmus Mallászi*; in »Állattani közlemények« I, 1902 von *Anophthalmus Bielzi* var. *transsylvanicus*, welchen Ganglbauer in den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien, 1899 als *Anophthalmus pilosellus* Mill. gedeutet hatte.

Meine eigenen, auf Siebenbürgen bezüglichen Arbeiten, welche, soweit sie umfassenderer Art sind, immer auch die siebenbürgische Fauna berücksichtigen, sind folgende: Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Hermannstadt 1891: Ueber den Stand der Coleopterenfauna Schässburgs; in derselben Zeitschrift 1901: Monographie des *Coleopterentribus Hiperini*; in derselben Zeitschrift XLIV, 1894: Monographie des *Coleopterengenus Liparus* Oliv.; Wiener entomologische Zeitung XXV, 1906: *Malthodes serbolae*; ebenda XXVI, II, 1907: Vier neue Rüssler aus Turkestan und eine neue *Crepidodera* aus Siebenbürgen; ebenda XXII, 1903: *Agabus regalis* vom Bulea-see; ebenda 1904 und 1905: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, LV, *Genus Licus*; Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1902: *Oliorrhynchus amplus* und *Quedius decoratus*; Annales musei nationalis hungarici VI, 1908: I. Eine neue blinde Seydmaeniden-Gattung aus Ungarn soll heissen Siebenbürgen); II. Beitrag zur näheren Kenntniss der *Saulcyella Schmidti* Maerkel; III. Eine neue Cleonide aus Turkestan; Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Brünn: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, LX: *Genus Larinus* und Verwandte; Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, IV, Band 1896: Revision der Gattung *Plinthus*.

Ich halte es für überflüssig, die zahlreichen übrigen kleinern Arbeiten nicht siebenbürgischer Autoren hier besonders anzuführen, da sie für jede Species in dem Catalogus coleopterorum Europae etc. von Heyden etc. 1906 zu finden sind. Doch halte ich es für eine Ehrenpflicht, bei dieser Gelegenheit auch jenes Mannes zu gedenken, der uns am Beginne der letzten Periode (1887—1910) im Jahre 1891 die „Fauna transsylvanica“ geschenkt. Es ist der frühere Dozent an der kaiserlichen Universität Dorpat, jetzt Privatgelehrter in Ebenhausen (Bayern), Dr. Georg von Seidlitz. Dieses Werk ist der Anstoss geworden zu vertiefter, mit neuem Eifer und einem gewissen Sicherheitsgefühl begonnenen und fortgeführten Arbeit auf dem Gebiete unserer heimischen Entomologie. Das Werk, wenn es auch wie jede andere so umfassende Arbeit gewisse Mängel besitzt, ist bis jetzt einzig in seiner Art und vollständig noch durch kein anderes gleichwertiges ersetzt (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, ist noch nur Torso), auch hat es eine Bedeutung gewonnen, die es zu einem unentbehrlichen Handbuch nicht nur für die baltischen Provinzen und Siebenbürgen, sondern für ganz Europa macht. Wenn neben demselben in zweifelhaften Fällen auf die Originalbeschreibungen zurückgegangen werden muss, so glaube ich, dass das auch bei allen andern kompendiösen Zusammenfassungen Bestimmungstabellen Reitter's der Fall sein wird; aber gerade diese Kürze hat auch den Vorzug, die sichere Determination wenigstens von Familie und Gattung, oft auch der Art ausserordentlich zu erleichtern und zu beschleunigen, indem sie vieles Nachschlagen in zerstreuten Werken erspart. Es ist seiner Anlage

und Durchführung nach auf streng wissenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeitet, und wenn die strenge Kritik, die der Verfasser gelegentlich übt an Autoren, ihren Beschreibungen und an ihrer zuweilen jeder Wissenschaftlichkeit entbehrenden Willkürlichkeit, so erscheint mir das als ein Verdienst, das wohl dem Verfasser manchen offenen und heimlichen Gegner geschaffen hat: jeder wahre Freund der Wissenschaft aber freut sich dieses grossen „Reinmachens“ mit dem scharfen Besen der Kritik. Mir selbst ist das Werk eben wegen seiner kompendiösen Kürze unentbehrlich geworden, namentlich bei Bestimmung der Familie und Gattung, wenn es auch ernster Arbeit bedarf, um sich in demselben mit Leichtigkeit zurechtzufinden. Und so sei dem Verfasser, der uns auch mit einer ganzen Reihe neuer Arten beschenkte, wie *Carabus decorus*, *Dyschirius latipennis*, *Anopthalmus Bielzi*, *Gyrinus hungaricus*, *Cyrtusa Fussi*, *Oliorrhynchus edentatus*, *Paophilus Hampei*, *Brachysomus transsylvanicus*, *Barypythos globus*, und der mit unsern siebenbürgischen Entomologen, besonders früher, stets in freundschaftlicher Föhlung gestanden ist, der herzliche Dank für seine schöne Gabe auch an dieser Stelle, wenn auch spät, so doch nicht zuspät, dargebracht.

Und somit übergebe ich die jüngste „Fauna transsylvanica“ voll Vertrauen der Öffentlichkeit. Möge auch an ihr die echte Kritik ihre Aufgabe erfüllen, damit, was unbeabsichtigt an Fehlern und Irrtümern enthalten ist, nach wissenschaftlichem Rechte falle, das Neue, das noch aufzufinden sein wird — denn mancher Teil Siebenbürgens ist noch gründlicher zu durchforschen —, hinzugefügt werde, möge sie, kurz gesagt, ein neuer Anstoss werden für unsern jüngeren Nachwuchs, seine Arbeit auf dieses schöne und interessante Gebiet zu verlegen, damit in absehbarer Zeit unser wahrer Besitz, auch was diese Kleinwelt anbetrifft, immer zuverlässiger und genauer festgestellt und verbucht werde. Ich hoffe, es werden sich immer noch neue Arbeiter finden, welche auch auf diesem Gebiete die Fahne sächsisch-deutscher Forschung hochhalten werden.

Schässburg, den 15. August 1910.

Dr. Karl Petri.

Berichtigungen und Ergänzungen.

- Pag. 6 Z. 30 v. o. ist vor a. Bielzi zu setzen; a. Deubeli aus Fleischer (= Pareysi v. Deubelmanus Fleischer, W. v. Z., August 1911, Heft XLVII). Nach Oski eine aberrante Form des C. v. euclionus.
 Pag. 32 Z. 1 v. o. lies „ovipennis“ statt ovipunnis.
 Pag. 42 Z. 1 v. o. ist auch ereptans einzuschalten: **Ganglbaueri** Apfl. Karlsburg, Schassburg c. a.
 Pag. 42 Z. 6 u. 7. v. o. ist bei psophia Karlsburg, Schassburg c. a. zu streichen. Br. psophia wird bei uns wahrscheinlich durch Ganglbaueri ersetzt. Nach Fleischer's Bestimmung kommen bei uns auch vor folgende zwei Arten:
 Pag. 65 Z. 9 v. u. hinter gracilis: Sc. debilis Hochh. Also Rakos, Rotenturm (Deubel).
 Pag. 74 Z. 25 v. o. vor punctus einzuschalten: Ph. puella Nordm. Also Rakos (Deubel).
 Pag. 86 Z. 7 v. u. ist als Aberration zu Br. exigua zu setzen; a. **colorata**. Ausser den Beinen und Fühlern sind auch die Flügeldecken und die beiden ersten Abdominalsegmente gelb. Schassburg c. a.
 Pag. 95 Z. 13 v. u. ist bei rigidicornis hinter Glasbutte einzuschalten „Vajda-Hunyad“.
 Pag. 136 Z. 1 v. u. ist hinter (Müller) einzuschalten „Vajda-Hunyad c. a.“
 Pag. 146 Z. 5 v. o. vor morosa ist einzuschalten: **marginata** Kust. Vajda-Hunyad (c. a.).
 Pag. 148 Z. 13 v. u. lies „Calytis“ statt Calytis.
 Pag. 149 Z. 8 v. o. lies „Thymalus“ statt Tymalus.
 Pag. 160 Z. 23 v. o. lies „Chatharus“ statt Chatarus.
 Pag. 161 Z. 8 v. u. ist vor Passandri einzuschalten: **Lathropus Erichs.**
sepicola Müll. Karlsburg unter den Weingarten vom Zaune gealopt c. a.
 Pag. 170 Z. 3 v. o. ist Russen (c. a.) zu streichen.
 Pag. 183 Z. 13 v. u. lies „Mysa“ statt Misa.
 Pag. 185 Z. 31 v. o. ist hinter (Bielz) einzuschalten „Vajda-Hunyad c. a.“
 Pag. 187 ist vor Helodidae als Familienname XXXIX zu setzen, entfällt also vor Dascilliden.
 Pag. 215 Z. 17 v. u. lies „Helodina“ statt Hodobia.
 Pag. 217 Z. 17 v. u. lies „Cocnoeara“ statt Cocnoera.
 Pag. 281 Z. 25 v. o. ist hinter pallida einzuschalten: **nigriceps** Redt. Schassburg c. a.
 Pag. 289 Z. 16 v. o. ist hinter der Gattung Charagus einzuschalten:

Pseudochoragus n. g.

Antennae breviusculae, marginem posteriorem thoracis haud attingentes, articulatione puncta marginem inferiorem oculorum insituae articulis duobus albis crassioribus, quattuor sequentibus tenuioribus, clava triarticulata, subdepressa, articulis subremotis. Rostrum breve, subplanum, apice subdilatatum. Oculi laterales, subovati, convexi, haud prominenti. Thorax convexus, subcylindricus, antice obtusato angustatus, lateribus haud, ante haud elevato-marginatus, basi subobtusato, scutellum minutum. Elytra oblongoovata, basi latitudine thoracis, margini posteriori thoracis appressa, convexa pygidium haud tegentia, striatopunctata, pedibusculi, posteriores vix crassiores, tibus rotatoris brevioribus, 4 articulatione, articulis albis angustis, art. 3^a bilobato, subdilatato, art. ultimo vix elongato. Coxae anteriores globosae, paulo prominentes, haud eparsae, coxae posteriore angustate dentatae.

Die Gattung gehört in die Subfamilie der Choragini und steht in nächster Verwandtschaft mit der Gattung Choragus, von welcher sie sich wie entlehnt nur durch die 9 ebendrigen Fühler unterscheidet. Mir ist nur folgende Art bekannt geworden:

brachycerus n. sp. Long. 14–15 mm

Dem Choragus Sheppardi sehr ähnlich, aber schlanker und etwas kleiner, doch schwarze Basis der Fühler, Schenken und Tarsen rötlichgelb, Kopf und

Hals schild matt, sehr dicht und fein maschig punktiert, Flügeldecken glänzend an sehr zart und zerstreut anliegend behaart. Die beiden ersten Fühlerglieder länger als breit, das erste cylindrisch, etwas gebogen, das zweite nach aussen gerundet erweitert, etwas breiter als das erste, die folgenden vier Glieder länger als breit, dünn, von abnehmender Länge, die zwei ersten Glieder der 9. abgesetzten Keule kaum so lang als breit, das letzte eiförmig. Büschel kürzer als breit, Stirne flach gewölbt, kaum schmaler als der Rüssel, Halsschild cylindrisch, gewölbt, vor der Mitte nach vorne stark gerundet verengt, die schwach erhabene Leiste vom schwach zweiblättrigen Hinterrande ab, aber deutlich und überall gleichweit entfernt, in der Mitte der Scheibe häufig eine leichte Längsverlängerung. Die länglich-eiförmigen Flügeldecken sind an der Basis genau von der Breite des Halsschildes und dem Hinterrande desselben eng angeschlossen, an den Seiten etwas gerundet erweitert, grösste Breite etwas hinter der Mitte, an der Spitze gemeinsam abgerundet, das Pygidium nicht bedeckt, punktiert-gestreift, die Streifen schwach vertieft, an der Spitze etwas verworren, die Zwischenräume wenig gewölbt, fast glatt.

Ich sammelte diese Art in einem Exemplar wahrscheinlich durch Klopfen an einem Zaun unter den Weingärten oberhalb der Festung in Karlsburg, besitze jedoch auch zwei Exemplare aus Trenin in Nordungarn, welche mir von Dr. Bramesek als Choragus piceus zugesendet worden sind.

Adephaga.

I. Cicindelidae.

Cicindelinae.

1. Cicindela Dej.

- soluta** Latr. Kronstadt (Méhely).
silvicola Latr. Durch das Gebiet verbreitet, auf sonnigen Waldwegen bis in das Gebirge (Frecker Geb., Serbota).
hybrida L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, namentlich an dem Ufer süsser Gewässer.
 var. **riparia** Latr. Rodnagelb. (Vale vinului), Vargyastal (Deubel); Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz).
campestris L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, an sonnigen Bergabhängen, Waldwegen bis ins Gebirge.
 a. **coerulescens** Beuth. Zood, Puj (Hätszeg, Csiki).
 a. **connata** Heer. Schässburg (c. a.).*
 a. **manca** D. Torre (affinis Heer). Hermannstadt (Csiki); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).
 a. **funeris** Sturm. Kronstadt (Méhely); Petrozsény (Deubel).
germanica L. Karlsburg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Thalheim, Unterkorz, Fogarasch, Persány, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh), Borszék, Säch.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay). In den Flusstälern auf sandigen Feldern und Wiesen.
elegans var. **stigmatophora** Fisch. Torda, Szamosfalva bei Klausenburg (c. a.). Auf Salzboden. Die Dilacerat-Form mit vollständig unterbrochener Mittelbinde sehr selten.
chiloleuca Fisch. Déva, Reussmarkt, Salzburg, Torda, Szamosfalva, Baassen, Eidisch, Zsabenitz, Szamosfalva, Mezőség (Záh). Auf Salzboden, höchstens sekundär durch Ueberschwemmungen an andern Lokalitäten.
 In Schässburg findet sich diese Art nicht.
litterata var. **viennensis** Schrank. Poresesd, Mediasch, Schässburg, Nagyenyed, Záh, Säch.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a., in Flusstälern); Dicső-Szt.-Márton (Csiki); Nussbach (Deubel).
lunulata F. Auf Salzboden, nur sekundär an anderen Orten.
 a. **fabricii** Beuth. Torda, Szamosujvár (Csiki).
 a. **barbara** Cost. Klausenburg (Meleg völgy, Tarcsahegy, Csonthehy, Csiki).

* Sammlung des Verfassers.

- a. **memoralis** Oliv. Schässburg (c. a., bei einer Ueberschwemmung der Kokel).
 a. **ragusae** Beuth. Salzburg b. H. (Csiki).
 a. **conjunctae-pustulata** Doktat. Salzburg, Torda (Csiki).
 a. **venatoria** Poda. Torda (Biró).

II. Carabidae.

Carabinae.

2. Cycheus Fabr.

- rostratus** L. Paringul, Mádo, Götzenberg, Präsbe, Kerzer, Arpascher Geb., Kronstadt, Schulergebirge, Busecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Grossschenk, Záh, Hargita, Marosgebirge (Bielz); Schanta, Gyógy, Remele (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Rotenturm, Retjezat, Nagyenyed, Rodnagelb. (c. a.).
 var. **Hoppei** Ganglb. (elongatus Hoppe). Hätszeg Geb., Retjezat (Bielz); Porkovica (Ormay).
 Ob wir den 19-23 mm grossen Hoppei Ganglb. haben, wäre erst sicherer zu erweisen, da meine Exemplare vom Retjezat zwar schlanker, aber nicht grösser als die Stammform sind.
 var. **pygmaeus** Chd. Surian, Zilinsjaser, Surul, Kerzer Geb. (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Busecs, Fieker Geb. (Serbota), Retjezat, Paringul, Borszék, Rodnagelb. (c. a.).
semigranosis Pall. Zemeschter Gebirge, Kronstädter Gebirge (Deubel).
 var. **balkanicus** Hopff. Scheltal (Zenoga), Zood, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Dragus, Fogarasch, Kronstadt, Schulergebirge, Nussbach, Bithalm, Mediasch, Schässb. (Bielz); Ömpolyitzal (Erlsburg, c. a.); Rodnagelb., Vargyastal (Deubel); Rotenturm (Ormay).
attenuatus F. Bithalm, Mediasch (Bielz); Bodzaer Gebirge (Deubel).

3. Calosoma Weber.

- inquisitor** L. Hermannstadt, Grossscheuern, Szombat, Grossschenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Bistritz (Bielz). In Eichenwäldern.
 (Callipora.)
sycophanta L. Mühlbach, Hermannstadt, Reusslörfel, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Szamosujvár (Ormay).
 var. **severum** Chd. Sielenbürgen (Klausenburg).

4. Procerus Dejean.

- gigas** Creutz. Rotenturmpass (Bielz).

5. Carabus Latr.

(Procrustes.)

corlaceus L. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzungen, Gotzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tömöscher Pass, Busecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Bolzaer Pass, Nussbach, Gross-Schenk, Birtihalm, Mediasch, Schässburg, Borszék, Sächsisch-Regen, Bistritz, Rodna, Klausenburg (Bielz).

Bielz halt die Rassen dieser Art, die allerdings ineinander übergehen, nicht auseinander, ich führe die Fundorte für die Varietäten daher an, soweit sie in meiner Sammlung vertreten sind. *V. subrugosus* Kr. ist nach dem europäischen Katalog synonym mit *Var. Hopfgarteni* Kr., der bei uns nicht beobachtet wurde, während die der *Var. spretus* Dej. genährte Form (*V. banaticus* Redtenb.) nachgewiesen wurde.

var. rugifer Kraatz. Csukás, Előpatak, Nagyenyel, Schässburg, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.).

var. spretus Dej. (*banaticus* Redtenb.). Déva, Karlsburg (c. a.); Klausenburg (Dr. Pachinger).

(Pseudococheneus.)

irregularis F. Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge, Kuhhorn (Bielz); Schanta (Ormay).

var. Montandoni Buyss (Peronae Hopffg.) Zool, Kronstadt, Busecs, Tömöscher Pass, Piatra-mare, Hosszufalu, Tesla, Dongókő, Bolzaer Pass (Bielz); Bistra, Schuler Geb., Frecker Gebirge, (Serbota, c. a.).

(Megodontus.)

planicollis Küst. Schiedtal, Strazsa, Dusch, Präsbe, Sterpu, Zood, Surul, Fogarascher Gebirge, Frecker Jäser, Porumbacher Gebirge, Negoi, Kerzer Gebirge, Bulea Jäser, Frecker Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Parungul, Retjezat, Bistra (c. a.).

var. verae Csiki. Südöstliche Geb. Csiki-Deubeli Reitter. Busecs (c. a.).

violaceus L. Rodnagelbirge, Frecker Geb. (Serbota), Malomviz, Rotenturm, Szurdok-Pass (c. a.).

Bielz führt nur die Stammform an und die Varietät *cyclolumbatu* Kr., die bei uns jedenfalls nicht vorkommt. Ich beschränke mich daher bei der Angabe der Fundorte auf diejenigen Formen, die in meiner Sammlung vertreten sind.

var. obliquus Thoms. Kerzer Geb. (Bielz).

Das Vorkommen dieser Varietät mit ihrer Aberration ist noch zu erweisen, da sie nicht mehr gesammelt worden ist.

a. Germari Sturm. Präsbe, Kerzer Geb., Bodzaer Pass, Kuhhorn, Borgoer Pass (Bielz).

a. pygmaeus f. n. Schässburg (c. a.).

C. violaceus a. *pygmaeus*. Länge 20 mm. Sie hat Grösse und Gestalt des *C. neesi* Hoppe, aber die matten, fein gekörnten Flügeldecken des typischen *violaceus* mit goldgrünen Rändern der Flügeldecken und einem ähnlichen unbestimmten Fleck in den Gruben neben den Hinterwinkeln des Halsschildes.

Der Seitenrand des Halsschildes ist vorne schmaler, hinten breiter abgesetzt als bei der typischen Form. Das vorliegende Exemplar ist wohl nur eine Zwergform des typischen *violaceus*.

var. Mehelyi Ganglb. Fogarascher Gebirge.

Busecs, Schässburg, Előpatak (c. a.).

var. macilentus n. v. Schässburg, Bistra.

C. violaceus var. *macilentus* n. v. Herr Reitter, dem ich diese Varietät vorlegte, bezeichnete sie als *var. macilentus*, ohne sie beschrieben zu haben, ich akzeptiere den Namen. Sie hat dieselbe Grösse, wie *var. mehelyi*, ist aber auch im weiblichen Geschlechte schlanker als diese und in beiden Geschlechtern lebhaft, wie lackiert glänzend. Der Seitenrand der Flügeldecken ist blau oder grün, die Punktierung von Kopf und Halsschild etwas feiner, aber runziger, die Flügeldecken sind kaum gekörnt, sondern sehr fein, aber deutlich verworren runzig punktiert, die primären Gruben nicht angedeutet. Länge 25–27 mm.

(Chaetocarabus.)

intricatus L. In den Wäldern des ganzen Gebietes unter Baumrinden oder in faulem Holz.

var. angustatus Haury. Schässburg (c. a.).

(Mesocarabus.)

catenulatus Scop. Königstein, Nagygyűmäs, Egyeskö (Balánbánya, c. a.) Scheint ausschliesslich in Kalkgebirgen zu leben.

(Platycarabus.)

Fabricii Panz. Rodnagel. Bielz.

var. malachiticus Thoms. Rodnagel. (Bielz, c. a.); Kelemengebirge (Müller).

(Hydrocarabus.)

variolosus Fbr. Durch das ganze Gebiet verbreitet, an saumigen Stellen.

var. costulifer Fleischer. Biharer Komitat (Fleischer).

(Chrysocarabus.)

auronitens F.

var. Escheri Pall. In allen Gebirgen unter Baumrinden und Steinen.

a. funestus Csiki. Parungul.

var. laevipennis Seidl. Rodnagelbirge, Marosgebirge, Görgénygeb., Kronstadter Gebirge.

a. opacus Haury. Zusammen mit dem vorigen.

(Tomocarabus.)

convexus F. Hátszeg, Schiedtal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Mediasch, Schässburg, Olábfalu, Hargita, Sächsisch-Regen, Marosgeb. (Bielz); Mezőfele (Maros-Tordar Kom.), Szamosujvár, Rotenturm (Ormay); Detunata (Mallász); Bukszá, Dees (c. a.).

var. Merkli Hopffg. Kerzergebirge, Kronstadt, Hosszufalu, S-Bieren (Bielz)

a. gracilior Géh. Siebenbürgen.

(Callistocarabus.)

marginalis F. Hermannstadt, Grossau, Marosgebirge (Bielz).

Bielz kannte die Varietät *decorus* Seidl, nicht; es ist wahrscheinlich, dass *C. marginalis* F. bei uns nicht, sondern nur die Varietät vorkommt.

var. decorus Seidlitz. Rátosnya (Birtliher); Vargyastal. (In einem Helixgehäuse, Deubel.)

(*Limnocarabns.*)

clathratus L. Heldsdorf (Bielz); Kis-somlyó (Csik, Méhely.)

(*Carabns* s. str.)

granulatus L. Durch das ganze Gebiet bis in die Gebirge verbreitet.

a. **rubripes** Géh. (*rufofemoratus* Letz.). Zusammen mit der Stammform.

a. **forticosus** Kr. Kronstädter Gebirge, Ober-Tömös (Deubel); Schässburg (c. a.).

var. **interstitialis** Duft. Dees (c. a.).

cancellatus Illig.

Bielz führt die Stammform fast für ganz Siebenbürgen, Deubel vom Königstein an; ich habe dieselbe noch nicht gesehen und bin der Ansicht, dass dieselbe bei uns gar nicht vorkommt. Bei dieser sind die Tuberkeln der Primärreihen flach und schwach entwickelt, die Zwischenräume der Tuberkelreihen und Rippen ausserordentlich fein granuliert, matt; erstes Fühlerglied rot, Beine schwarz (Stammform); ebenso fehlt uns a. **rufipes** Kr. und **assimilis** Duft., **boonensis** Géh., **tuberculatus** Schm. Die Varietät **biharius** Reitter gleicht der Varietät subgraniger Reitter, nur besitzt sie rotes erstes Fühlerglied und nur die Beine sind schwarz.

var. **Mühlfeldi** Géh. Nagybagymás, Kelemergebirge, Schulergebirge (Holdhaus).

var. **biharius** Reitter. Schässburg (c. a.); Hätzeger Tal (Deubel).

a. **pseudo tuberculatus** Lapong. Schässburg, Kronstadt, Csukás (c. a.)

var. **pseudo graniger** Reitter. Rodnagelb. (c. a.).

var. **subgraniger** Reitter. Die häufigste Art: Torockó, Retjezat (Malomvizi), Pilis (Nagyenyel), Kronstadt, Rosenauer Gebirge, Schässburg (c. a.).

var. **graniger** Palliard. Torockó, Retjezat, Balánbánya (c. a.).

var. **seythicus** Schm. (*pseudoseythicus*-Lapongé). Kronstadt, Balánbánya, Borszék (c. a.); Rodnagelb. (Holdhaus).

a. **transsylvanicus**. Schulergebirge, Csukás, Schässburg (c. a.).

Carabus cancellatus a. **transsylvanicus**. Diese Varietät steht, was Grösse, Gestalt, Färbung und grobe Runzelung der Flügeldecken-Intervalle anbetrifft, am nächsten dem **seythicus** Schm., von dem sie sich nur durch etwas glänzende, hell kupferrote Färbung unterscheidet.

var. **bucsecsianus** Born. Kronstadt, Schulergebirge, Bucsecs (c. a.).

var. **nigricornis** Dej. Torockó, Baassen, Pilis (Nagyenyel), Schässburg (c. a.).

Ulrichi Germ. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **Leuckarti** Petri. Mit der Stammform, auch vom Schuler- und Rodnagelb. bekannt (Deubel).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei uns nur die kräftiger skulptierte Form der var. **Leuckarti** vorkommt, die in der Regel nicht, wie Reitter Bestimmungstabelle der Carabini) angibt, grösser oder robuster als die Stammform ist, sondern durch breitere, stärkere Rippen und kräftigere Körner der Tuberkelreihen ausgezeichnet ist.

var. **fastuosus** Pall. Nagyág (Bielz).

arvensis Herbst (*nigrinus* Westh.). Branisch-Wald (Hermannstadt), Surul, Bucsecs,

Schulergebirge, Tesla, Marosgebirge, Kuhhorn, Borgoer Pass (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay).

var. **carpathus** Born. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Deubel); Rodnagelb., Nagybagymás, Schässburg (c. a.).

obsoletus Sturm. Rodnagelb. (Ganglbauer, Waldregion des Koronjis, eine Form, die zwischen dem typischen **obsoletus** und der Varietät **euchromus** Pall. in der Mitte steht.

var. **Csikii** Mallász. Wahrscheinlich hat Mallász die von Ganglbauer im Rodnagelb. gesammelte Zwischenform als var. **Csikii** beschrieben. Hierher gehören wahrscheinlich die Bielz'schen Fundorte des **obsoletus**: Kapnikbánya, Lajos-Gebirge, Görgény, Marosgeb., Gyergyó (Bielz).

var. **Uhligi** Holdhaus. Nagybagymás, Kelemergebirge (Holdhaus); Rátosnya (Müller).

var. **euchromus** Pall. Schietal, Götzenberg, Präsbe, Fogarascher Gebirge, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstädter Geb., Kronstadt, Piatra-mare (Bielz); Szurdokpass (c. a.).

a. **Bielzi** Birtbler. Zibins-Gebirge (Bielz, c. a.).

var. **procerus** Bielz. (Nagybagymás Birtbl.). Zalatna, Nagyág, Déva (Bielz); Karlsburg (c. a.).

a. **Pruneri** Mall. Detunata.

var. **fossulifer** Fleischer. Biharer Gebirge (Fleischer); Nagyenyel (Kollegiawald, c. a.).

(*Morphocarabns.*)

Scheidleri Panz.

Scheidleri var. **Kollari** Palliard. In meiner Sammlung befindet sich ein Exemplar dieser Varietät, das ich im Tauschwege von Kelecsényi in Tapolcsán erhielt und aus Dees stammen soll. Da ich der Fundortsangabe nicht trane, habe ich die Varietät nicht in unser Verzeichnis gesetzt.

var. **Méhelyanus** Csiki. Nagybagymás, Kelemer (Holdhaus).

var. **comptus** Dej. Retjezat (Csiki); Torockó (c. a.).

Ich besitze zwei Exemplare aus Torockó, das eine (Männchen) besitzt nur vier Primär-Intervalle, muss also ein **comptus** sein, doch Erweiterungen der Fühlerglieder kaum bemerkbar, das zweite (Weibchen) ist entschieden **Hampei** mit fünf Primär-Intervallen. Ich habe den Fundort Torockó daher als fraglich auch zu **comptus** gesetzt.

a. **Hopffgarteni** Kr. Dees. (Nach einem von Kelecsényi stammenden, in meiner Sammlung befindlichen Exemplar.)

var. **Rothi** Dej. Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neulorf b. H., Holzmengen, Leschkirch, Girelsau, Talmesch, Porumbach, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Agnetheln, Meliasch, Schässburg (Bielz); Talmescher Geb. (c. a.).

- a. *villosus* Csiki.
 a. *ignoscus* Csiki.
 a. *varistriatus* Kr.
 a. *quadricatenatus* Kr.
 a. *latestriatus* Kr. } Zusammen mit
 der Stammform.
- var. *Hampei* Küst. *auro-ericus* Kr., Zoppai Kr., *marginatus* Kr., *Marusii* Bielz, Váscsényi, Nyárád, S. Regen, Tekeny, Záh, Gyék, Nagyenyed, Zalán, Karlsburg, Nagyág, Déva (Bielz); Torozsó (c. a.).
- a. *dacius* Bielz. (*dacius* Csiki). Dees, Csákygöb, Magyar Lajos, Oláh-Laposbánya, Cibbes, Rodna (Bielz); Naszó (c. a.); Szamosújvár (Csiki).
- Dacius* Bielz ist den Fundortsangaben nach entschieden identisch mit *dacius* Csiki, daher ist Bielz als Autor anzuführen.
- a. *validus* Csiki. Nagyág (Csiki).
 a. *diffinis* Csiki (*comptus* Friv.?) Bihar-gebirge, Gyalu, Hudegszamos (Bielz); Klausenburg (Csiki).
 a. *spectabilis* Csiki. Rodnagebirge (Csiki, c. a.).
 a. *incompus* Kraatz. Kronstadt, Tömöser Pass, Krizba (Bielz); Előpatak, Nussbach (Bielz, c. a.); Csukás, Schullergelbge (c. a.); Telek, Udvarhely (Csiki).
 a. *elegantissimus* Csiki. Kronstadt (Zinne, Baroth (Csiki).
- Ernst Csiki, Kustos am ung. National-Museum, hat „Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Morphocaraben“ (Annales Mus. hung. IV. 1906) die in Ungarn vorkommenden Morphocaraben in 6 selbständige Arten eingeteilt, von denen 3 Arten in Siebenbürgen vertreten sind, und zwar:
1. *Carabus comptus* Dej. Retjezat.
 (var. *Hopfgarteni* Kr. soll nur auf einer Bergkuppe der Szörényer Alpen vorkommen.)
 2. *Carabus Rothi* Dej. Hermannstädter, Grosskokler und Fogarascher Komitat.
 a. *villosus* Csiki.
 a. *ignoscus* Csiki.
 a. *varistriatus* Kr.
 a. *quadricatenatus* Kr.
 a. *latestriatus* Kr.
 3. *Carabus Hampei* Kuster. Mezöség, Mieresch- und Klenkokeltal.
- var. *validus* Csiki. Nagyág.
 var. *dacius* Bielz. Szamosztal (Szamosújvár, Naszó I).
 var. *diffinis*. Csiki. Kolozsvár, Gyalu, Hudegszamos.
- Comptus* Friv. ist identisch mit *diffinis* Csiki und wenn *Hampei* zur Art erhoben wird, kein Hindernis vorhanden, den Varietatsnamen *comptus* Friv. beizubehalten.
- var. *spectabilis* Csiki. Rodnagebirge.
 var. *incompus* Kr. Keresztényhavas, Krizba, Tesla, Tömös, Telek, Nussbach, Udvarhely, Előpatak.
 a. *elegantissimus* Csiki. Kronstadt (Zinne, Baroth)]

(Trachycarabus.)

scabriuusculus Ol. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Hargita, Csiker Gebirge, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bükszáll (c. a.); Nagybagmäs (Deubel).

var. *Lippi* Dej. Hätzeg, Déva, Piski, Broos, Mühlbach, Gross-Schenk, Schässburg, Oláhfal, Záh, Klausenburg, Gyalu (Bielz); Hermannstadt, Salzbürg, Szamosújvár (Ormay); Puj b. Hätzeg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Rodnageb., Alsó-Rákos, Kronstadt, Rotenturm (Deubel).

var. *costulatus*. Retjezat (c. a.).

C. scabriuusculus var. *costulatus*. Diese Varietät hat die Größe der Stammform und unterscheidet sich von derselben dadurch, dass die Flügeldecken wie bei v. *Lippi* deutlich punktiertgestreift und die innern Zwischenräume in der Basishälfte fast glatt sind; den zweiten und sechsten Zwischenraum bilden in der Basishälfte nur schwach unterbrochene, glatte, etwas über die übrigen Zwischenräume erhabene Rippen, der vierte, achte und zwölfte Zwischenraum sind deutliche Kettenstreifen mit ziemlich tiefen Grübchen.

var. *minutus* Motsch. Rotenturm (c. a.); Kronstädter Gebirge (Deubel).

(Deutero-carabus.)

montivagus Pall. Déva, Birtihalm, Mediasch, Persanyer Gebirge (Bielz); Stolzenburg, Seiste (Ormay).

Wahrscheinlich kommt die Stammform bei uns gar nicht zur Entwicklung, sondern nur die Varietät *blandus*.

var. *blandus* Friv. Bihar Gebirge (Retjezat); Schässburg (c. a.); Vargyastal, Kronstadt (Deubel).

(Ortho-carabus.)

concolor F.

var. *transylvanicus* Dej. In allen höheren Gebirgen Siebenbürgens, namentlich oberhalb der Baumregion.

(Carpathophilus.)

Linnei Panz. In allen Gebirgen, auch in Wäldern unseres Berglandes, z. B. in Schässburg.

Eine auffallende Bildung findet sich bei einem sonst ganz normalen, 20 mm langen, aus Schässburg stammenden Exemplar (Weibchen): Beide Fühler desselben sind 13 gliedrig, das 11. Glied ist fast so lang als das 10. und normal, das 12. ist nur $\frac{1}{2}$ so lang als das 11., aber ebenso dick, das 13. doppelt so lang als das 12. und nur halb so dick und etwas gebogen, das 12. und 13. zusammen sind so lang als das 11. Man erhält von der ganzen Bildung der Fühler nicht den Eindruck der Abnormalität.

var. *Macalrei* Dej. Kerzer Gebirge (Bielz); Negoi, Königstein, Buseers, Schullergelbge, Bodzaer Geb., Retjezat, Rodnagebirge (Deubel).

var. *Ludovicus* Csiki. Rotenturm (Csiki).

var. *5-costatus* n. v. Schässburg. (In Wäldern unter Baumrinden und Laub, c. a.); Kronstadt (col. Deubel).

Die neue Varietät verdient wegen einiger wesentlicher Abweichungen von unseren Gebirgsformen Erwähnung und einen besonderen Namen. Das Hals-

schild ist schmaler und länger, der Seitenrand seiner ganzen Länge nach stärker aufgebogen, die Hinterecken viel weniger nach abwärts gebogen, so dass der Hinterrand stärker angerandet erscheint. Die Flügeldecken besitzen die grösste Breite nicht hinter, sondern in oder vor der Mitte, in den Zwischenräumen der Grübchenreihen, deren Grübchen je drei Kiellinien unterbrechen, befinden sich fünf gut entwickelte, nicht unterbrochene Kiellinien. Während der Halsschild in der Regel nach hinten deutlich ausgekehrt verengt ist, besitzt ein Exemplar einen beinahe quadratischen Halsschild, der nach hinten kaum bemerkbar verengt erscheint (a. quadratocollis).

a. **quadratocollis** m. Schässburg (c. a.).
(Phricocarabns.)

glabratus Payk. Götzenberg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Rodzaer Pass, Gross-Schenk, S.-Regen, Kuhhorn, Klausenburg, Gyeke (Bielz).

var. **punctatocostatus** Haury. Kerzer Geb. (Bielz).

var. **extensus** Kr. (breviusculus Kr.). Rotenturm, Bucsecs, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **angustus** n. v. Schässburg, Rotenturm, Kronstadt, Borszék (c. a.)

Carabus glabratus var. **angustus** (Männchen und Weibchen). Von der Stammform, namentlich aber der Varietät **extensus**, durch schlankeren, schmalen Körper, von der ersteren auch durch den lebhaften Glanz der Flügeldecken verschieden. Manche Stücke sind so schmal, dass sie auf den ersten Blick an *C. violaceus* var. *Méhelyi* oder var. *macilentus* m. erinnern, von welchen sie jedoch sicher durch breiteren gewölbteren, am Hinterrande nur schwach angerandeten Halsschild mit breiter aufgebogenem Seitenrande, besonders aber durch den Besitz von nur zwei Borsten auf der Oberkante des zweiten Lippentastergliedes unterschieden werden kann. Ein besonders schmales Exemplar (Männchen) aus dem Rotenturm besitzt auf dem zweiten Lippentastergliede drei Borsten. In der Penisform kann ich keinen Unterschied konstatieren. Von v. subglabratus Reitter unterscheidet sich diese Varietät durch feinere, verworrene Körnelung der Flügeldecken, keine Spur von gereihten Körnern, und höchstens auf der Spitze mit einigen grösseren Körnchen und Grübchen, ebenso breit aufgebogenem Seitenrand des Halsschildes wie bei der Stammform.

Nebriinae.

6. Leistus Frölich.

ferrugineus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

rufescens F. Schässburg (am Kokelufer unter Blättern im Ufergebüsch, Bielz, c. a.); Ujszékely (an der Kokel), Rodnagerbirge (c. a.).

(Pogonophorus.)

rufomarginatus Duft. Deva, Seliste, Präsbe, Gross-Schenk (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (Wittenberg, Wiesenberg, c. a.); Kronstadt (Scheeser).

nitidus Duft. Präsbe, Fogarascher Geb., Kronstadt (Bielz); Hätzeger Gebirge (Deubel).

(Oreobius.)

gracilis Fuss. Bucsecs (Bielz, Deubel, c. a.); Paringulgebirge, Retjezat (c. a.).

(Leistidius.)

piceus Fröl. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge (Waldregion); Kuhhorn (Ganglbauer).

alpicola Fuss. Frecker-, Bulea-Jäser, Bucsecs (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Präsbe (c. a.); Pietrosul (Müller).

7. Nebria Latr.

(Nebria Dan.)

livida L. An Flussufern. Hermannstadt, Harbach (Leschkirch), Altufer (Rotenturm, Kerz, Fogarasch, Bielz); Schässburg (Kokel, c. a.); Alsó-Rákos, Honigberg (Altufer, Deubel).

picipornis F. Rotenturm (Altufer), Kronstadt (Bielz); Kerz (Altufer, c. a.).

Jokischi Sturm. Hätzeg (Deubel, vidit Ganglbauer).

var. **nigricornis** Villa. Schieltal (Skok), Paringul, Gurariu, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Hosszufalu, Rodna (Bielz); Schanta (Ormay).

Gyllenhali Schönh. Paringul, Piatra alba (Zibinsgebirge), Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Hosszufalu (Bielz); Papolcz, Rodzaer Gebirge, Kovászna (Méhely); Rodnagerb. (Deubel).

Das Vorkommen der *N. Gyllenhali* auf dem Paringul und Kerzer Gebirge scheint mir zweifelhaft, da ich vom Kerzer Gebirge nur *N. Heegeri* besitze; ebenso zweifelhaft sind Bucsecs, Fogarascher und Zibins-Gebirge.

Heegeri Dej. Hätzeger Gebirge (Bielz); Retjezat, Kerzer Gebirge (Bulea, c. a.); Bucsecs, Zernerschter Geb. (Deubel); Ratosnya (Müller).

(Helobia.)

brevicollis F. (cursor Bedel). Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Marpol, Rotenturm, Fogarascher Geb., Schässburg (Bielz); Kerz (c. a.).

(Alpacus.)

carpathica Bielz. Paringul, Zibins-Jäser, Kristest (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota).

Fussi Bielz. Dees, Sátor (Stoikafalva); Magyar-Lapos, Oláhlaposbánya, Kapnikbánya, Czibles, Rodnagerbirge (Bielz).

Reichi Dej. Paringul, Gurariu, Steffeste, Galbina, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge (Bielz); Präsbe, Bistra (Mühlbacher Gebirge, c. a.); Präsbe (Deubel).

var. **bissenica** Bielz. Surul, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz).

transsylvanica Germar. Paringul, Verfu lui Petru (Mühlbacher Gebirge), Surian, Zibinsgebirge, Zibinsjäser, Steffeste, Negovan, Sterpu, Galbina, Surul, Frecker Jäser, Negoi, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Königstein, Bu-

cseecs, Piatra-mare, Kelemen-Gebirge, Kuhhorn.
Soll auf dem Schulergebirge nicht vorkommen (Deubel).

- a. *Ormayi* Ganglb. Mit der Stammform.
a. *alpigrada* Csiki. Karpathen.

Notiophilinae.

8. *Notiophilus Duméril.*

Da Bielz die zwei dem *N. aquaticus* und *palustris* ähnlichen Arten, *N. pusillus* Watterh. und *hypocrita* Putz nicht kannte, bleiben die von ihm für die zwei ersten Arten angeführten Fundorte am besten ans.

pusillus Watterh. Schässburg, Karlsburg, Unterkerz, Hätzszeg, Hermannstadt, Bükszád (c. a.).

aquaticus L. Schuler-Gebirge, Buceacs, Retezat (c. a.); Rodnagelirge, Nagy-hagymás (Deubel).

palustris Duft. Paringul, Előpatak, Schässburg, Balánbánya (c. a.).

hypocrita Putz. (laticollis Petri) Rotenturm, Bükszád, Tordaer Schlucht, Schässburg (c. a.); Negoi, Paringul, Rodnagelirge, Nagy-hagymás (Deubel).

rufipes Curt. Hätzszeg, Kronstadt, Előpatak (Bielz); Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.).

biguttatus F. In Wäldern durch das ganze Gebiet, in den Gebirgen bis oberhalb der Waldregion.

Omophroninae.

9. *Omophron Latr.*

In den Letten und im Sande an Flusssufern.

limbatum F. Hammersdorf, Rotenturm, Kerz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Alsó-Rákos, Hätzszeg (c. a.); Rosenau (Deubel).

Elaphrinae.

10. *Blethisa Bonelli.*

multipunctata L. Reussener Teiche, Klausenburg, Gyeke (Bielz).

11. *Elaphrus Fabr.*

An Gewässern.

uliginosus F. Hermannstadt, Hammersdorf, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Distritz, Gyeke, Záh (Bielz); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

coupreus Duft. Szombat, Kronstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg (Bielz).

riparius L. Hermannstadt, Rotenturm, Szombat, Kronstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz).

Ulrichii Redtenb. Szombat, Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Alsó-Rákos, Naszód, Tordaer Schlucht (c. a.).

aureus Müll. Hätzszeg, Reussener Teiche, Rotenturm, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Héviz, Schässburg, Sächsisch-Regen, Klausenburg, Dees (Bielz); Alsó-Rákos, Naszód, Unterkerz (c. a.); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay).

Lorocerinae.

12. *Lorocera Latr.*

piliornis F. Hätzszeg, Götzenberg, Kronstadt, Schuler-Gebirge (?), Bodzaer Pass (Bielz); Rodnagelirge (c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel).

Scaritinae.

13. *Clivina Latr.*

In der Erde grabende Tiere.

fossor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

collaris Hbst. Wie der vorige verbreitet.

14. *Dyschirius Bonelli.*

Die Arten leben, wie die der vorigen Gattung, grösstenteils an Gewässern.

digitatus Dej. Schässburg, Naszód (c. a.); Alsó-Rákos, Honigberg (Deubel).

latipennis Seidl. Rotenturm, (Altuf, Seidlitz).

arenosus Steph. thoracicus Bielz. Rotenturm, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Nach Dr. Fleischer lebt diese Art auf Salzboden; daher scheint ein Teil der Fundorte, welche Bielz für diese Art anführt, nicht zuverlässig und eher auf *D. latipennis* Seidl. zu beziehen, wenigstens mit Bezug auf Rotenturm, Szombat und Fogarasch.

strumosus Er. Marosujvár, Torda (Auf Salzboden, c. a.).

politus Dej. Kronstadt, Marienburg (Bielz); Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); S.-Regen (Müller).

nitidus Dej. Dobra, Hermannstadt, Rotenturm, Porosost, Kronstadt, Marienburg b. Kr. (Bielz); Hammersdorf, Nagy-enyed (Ormay); Karlsburg, Unterkerz, Nussbach, Schässburg (c. a.).

Bonellii Putz. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel).

Lafertei Putz. (semistriatus Schaum nec Dej. nec Heer.). Karlsburg, Unterkerz, Schässburg, Rotenturm (Bielz, c. a.); Altuf (Deubel).

slmills Petri. Schässburg (Koke'ufer, c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer).

Die Art hat wohl die grösste Aehnlichkeit mit *D. intermedius* Putz., von dem sie sich nur durch feinere gegen die Spitze und die Seiten der Flügeldecke fast ganz erloschene Punkstreifen unterscheidet.

tensilellis Mars. (Fleischeri Deville) Torda (Salzboden, c. a.).

angustatus Ahr. Benzencz b. Broos (Bielz); Nagyenyel, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Honigberg (Altuer, Deubel).

aeneus Dej. Dobra. Unter-Kerz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Frecker Geb., Nagyenyel (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Honigberg (Altuer, Deubel).

substriatus Duft. Dobra, Déva, Schässburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Karlsburg, Rotenturm (c. a.).

ruficornis Putz. Karlsburg (Mieresch. Bielz, c. a.); Unter-Kerz, Bistra (am Mühlbach), Schässburg (Koke'ufer, c. a.).

salinus Schaum. Déva. Salzburg, Nussbach (?), Eidisch, Zsabenitza (S.-Regen, Bielz); Marosujvár, Torda, Klausenburg (Umgebung, c. a.).

intermedius Putz. Nussbach, Rotenturm (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Altuer, Deubel).

globosus Hb.-t. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rotenturm, Fogarasch (Bielz); Remete (Nagyenyel), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge (alpin, Ganglbauer); Balánlány, Schuler-Gebirge, Csukás, Dees, Unter-Kerz, Tordaer Schlucht, Paringul, Schässburg, Borszék (c. a.).

rufipes Dej. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyel (Ormay); Baassen (Hutweide, c. a.); Hätzeg, Honigberg (Altuer, Deubel).

laeviusculus Putz. Törzburg (Bielz); Schässburg (c. a.).

? **luficola** Chand. Déva (Salzboden, c. a.).

rotundipennis Chd. Gross-Scheuern (Bielz).

Broscinae.

15. Broscus Panz.

cephalotes L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Bembidiinae.

16. Asaphidion Gozis.

(Tachypus Lap.)

An Gewässern und feuchten Orten.

caraboides Schrank. Hätzeg, Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Fogarasch, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Remete (Nagyenyel, Ormay); Schässburg, Nagyenyel, Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pallipes Duft. Hätzeg, Seliste, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Bursecs (c. a.); Nagyenyel, Kakova (Ormay).

flavipes L. Hätzeg, Salzburg, Talmesch, Porcest, Nussbach, Kronstadt, Törzburg, Előpaták, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Pilis (Nagyenyel, c. a.).

17. Bembidium Latr.

(Bracteon.)

striatum F. Hätzeg, Girelsau, Rotenturm, Marienburg b. Kr. (Bielz); St. Annensee. Unter-Kerz (Altuer, c. a.); Kelenengebirge (Müller).

foraminosum Sturm. Hätzeg, Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.); Honigberg (Deubel).

velox L. Hätzeg, Rotenturm, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

littorale Oliv. Rotenturm, Unter-Kerz, Kronstadt, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hammersdorf, Remete (Nagyenyel, Ormay); Karlsburg (c. a.); Honigberg (Alt. Deubel).

(Pogonidium.)

laticolle Duft. Rotenturm, Birtihalm, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Koke', c. a.).

(Chloridium)

splendidum Sturm. Birtihalm, Dees (Bielz); Schässburg (Koke'), Klausenburg (c. a.); Honigberg (Alt. Deubel).

(Neja.)

pygmaeum F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Klausenburg (Bielz).

var. **bitunulatum** Bielz. Hätzeg, Rotenturm, Fogarasch, Törzburg, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Remete, Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Talinberg, Deubel); Karlsburg, Schässburg, Nagyenyel (c. a.).

(Metallina.)

lampros Hbst. Durch das ganze Gebiet bis in die Gebirge.

var. **properaus** Steph. (velox Er., 14-striatum Thoms.). Mit der Stammform.

(Princidium.)

punctulatum Drap. Surul, Ober-Sebes, Hosszufalu (Bielz); Talmesch (Ormay); Rotenturm, St. Annensee, Naszói, Klausenburg, Unter-Kerz (c. a.); Honigberg (Alt. Deubel).

(Testedium.)

bipunctatum L. Neudorf b. H., Götzenberg, Fogarascher Gebirge (Bielz); Retjezat, Paringul, Kerzer Geb., Frecker Gebirge, Rodnagebirge (c. a.).

(Notaphus.)

dentellum Thbg. Klausenburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Baroth Mchely); Nussbach, Marosujvár (c. a.); Honigberg (Deubel)

varium Oló. Kronstadt, Nussbach (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Kakova (Ormay); Honigberg (Deubel), Marosujvár, Unter-Kerz (c. a.).

adustum Schaum. Salzburg, Rotenturm, Fogarasch, Gross-Schenk, Nussbach, S. Regen (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyel (Ormay); Honigberg (Deubel); Schässburg (Kokei), Unter-Kerz (Alt, c. a.)

(Plataphodes.)

Fellmanni Mannh. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Busecs (c. a.).

(Plataphus.)

prasinum Duft. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge (Bielz)

Hier scheint ein Irrtum vorzuliegen, da meine Exemplare von denselben Örtlichkeiten entschieden B. Fellmanni Mannh. sind, das Vorkommen des B. prasinum Duft. erscheint also sehr zweifelhaft.

(Periphus.)

lasciolatum Duft. Hätzeg, Gurariu (Bielz); Alsó-Rákos, Borszék, Rotenturm, Betjezat (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

cocruleum Serv. Remete (Nagyenyel), Gyergyó-Tölgyes (Ormay)

tricolor F. Hätzeg, Gurariu, Zood, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Marosgebirge, Borgóer Pass (Temeu, Bielz); Rotenturm, Kakova, Remete (Nagyenyel), Scheshely, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Balánbánya, Ilyamika (Naszól, c. a.).

atrococruleum S. eph. Borgóer Pass (Bielz); Kerzer Gebirge, Bulea (Ormay).

Das Vorkommen dieser dem westlichen Europa angehörigen Art bei uns scheint mir noch der Bestätigung zu bedürfen.

tibiale Duft. Gurariu, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Schässburg, Ilyamika, Betjezat, Bistra, Balánbánya, Csukás, Szurduk-Pass (c. a.); Rodnagelirge (Ginlatier)

fulvipes Sturm. Csáti-Gorbó, Borgóer Pass (Bielz)

testaceum Duft. Hätzeg, Hermannstadt, Rotenturm, Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., Reps, Mchely, Schässburg, S. Regen, Dees (Bielz); Nagyenyel (Ormay); Bistritz, Klausenburg, Ilyamika (Naszól), Nussbach (c. a.)

fluviale Dej. Rotenturm, Fogarasch, Gross-Schenk (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Marienburg b. Kr. (c. a.).

Andreae Fr. Hätzeg, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S. Regen, Gyeke (Bielz); Schauta, Resinar, Remete (Ormay); Rodnagelirge (Ganglbauer); Balánbánya (c. a.).

var. distinguendum Duv. Reps (Bielz); Ilyamika (Naszól, c. a.).

var. Bualli Duv. Rodnagelirge (c. a.); Dees (Deubel)

var. femoratum S. u. m. Hätzeg, Gurariu, Zood, Marienburg bei Kr., Előpatak, Schässburg (Bielz); Kerzer Gebirge, Remete, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Déva, Ilyamika (Naszól), Unter-Kerz (c. a.)

ustulatum L. Hätzeg, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Detunata (Mallász); Szurduk-Pass (c. a.).

rupestre L. Hätzeg, Szeliste, Gurariu, Bistritz (Bielz).

lunatum Duft. Kerz, Szombat (Bielz); Schässburg, Ujszékely (Kokei, c. a.); Honigberg (Altner, Deubel)

bisignatum Men. Siebenbürgen (Bielz).

modestum F. Am Ufer stehender und fließender Gewässer durch das ganze Hügel- und Bergland.

deorum Panz. Gurariu, Götzenberg, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Remete (Ormay); Alsó-Rákos, Balánbánya, Schässburg, Dees, Ilyamika (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

var. alpinum Dej. Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelirge, Szurduk-Pass (c. a.)

dalmatinum Dej. Hermannstadt, Pils (Nagyenyel), Tordaa Schlucht, Schässburg, Előpatak, Alsó-Rákos (c. a.); Rosenau (Busecs, subalpin), Vargyastal (Deubel).

brunniceorne Dej. Schässburg (Schleifengraben, c. a.); Ilyamika (vidi); Predeal (Deubel)

Milleri Duv. Götzenberg, Előpatak (Bielz); Schässburg (Schleifengraben, c. a.).

a. brunneum. Schässburg (c. a.).

B. Milleri Duv. a. brunneum m. Die meisten Exemplare aus Schässburg haben ganz braune Flügeldecken, oft auch braunen Halsschild, es besitzt dann nur der Kopf eine schwärzliche Färbung, nicht selten wird auch dieser braun mit metallischem Schimmer, so dass der ganze Körper braun ist mit hellern Beinen, Tastern und ersten Fühlergliedern; für diese Abänderung schlage ich den Namen brunneum vor.

Stephensi Crotch. Schässburg, Ilyamika (Naszól, c. a.); Kronstadt (Deubel).

monticola Sturm. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Vargyastal (Deubel); Detunata (Mallász).

transsylvanicum Bielz. Dees, Laposer Geb., Bistritz, Fogarasch (Bielz); Jaul (Bistr., c. a.).

Bielz führt als Fundort auch Schässburg an; da er aber B. brunniceorne nicht angibt, so liegt hier wahrscheinlich eine Verwechslung mit letzterer Art vor; ebenso wird es mit dem Fundorte Fogarasch sein.

var. cardionotum Putz. Zusammen mit der Stammform.

(Synaeostictus.)

ruficornis Sturm. Götzenberg (Bielz); Nagy-Hagymás (Deubel).

Schässburg als Fundort ist zu streichen.

Millerianum Heyd. Kerzer Gebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.); Rodnagab. (Ganglbauer); Hátzeg, Kronstadt (Deubel); Sebeshely (Broos, Ormay); Detunata (Mallász).**atroviolaceum** Duft. (stomoides Dej.). Kerzer Gebirge, Csukás, Rodnagabirge, Paringul, Szováta (c. a.).**decoratum** Duft. Gurariu, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

(Pseudolimnaeum.)

viridimicans Dan. Kerzer Gebirge (Ganglbauer); Bucsecs (Busten), Rodnagabirge (Deubel).

(Talanus.)

aspericollis Germ. Baassen (Bielz).

(Emphanes.)

minimum F. Dobra, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Marosujvár, Malomviz (Hátzeg, c. a.); Hammersdorf (Ormay).var. **rivulare** Dej. Klausenburg (c. a.).

(Testediolum.)

glaciale Heer. Zibinsjäser, Surul, Frecker Jäser, Kerzer Gebirge, Arpascher Geb., Bucsecs, Kuhlhorn (Bielz); Frecker Geb. (Serbota), Paringul (c. a.).

(Lopha.)

quadriguttatum F. (quadripustulatum Serv.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Baassen, Schässburg, Maros-Ujvár, Bodnagabirge (c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).**quadrinaculatum** L. Hátzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Zood, Kronstadt, Nussbach, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Paringul, Nagyenyed, Rotenturm (c. a.).**humerales** Sturm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).**tenellum** Er. Hátzeg, Fogarasch, Törzburg, Marienburg b. Kr., Héviz (Bielz); Ilvamika (Naszód), Nagyenyed, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Alt- ufer), Dees (Deubel); Hammersdorf (Ormay).a. **triste** Schilsky. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).**Schuppeli** Dej. Schässburg, Hermannstadt (c. a.); Balánbánya (Méhely); Rodnagabirge (Deubel).

(Trepades.)

Doris Gyll. Zood, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Ormay).**articulatum** Gyllh. Hátzeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Déva, Marosujvár, Baassen, Ilvamika (Naszód, c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay).**octomaculatum** Goeze. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Halvelagen (Weiher), Schässburg (Schleifengraben, c. a.).

(Diplocampa.)

assimile Gyllh. Schässb. (Atelshill, c. a.); Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).var. **fasciatum** m. Unter-Kerz, Klausenburg (Stadtteiche, c. a.).B. *assimile* v. *fasciatum*. Kopf und Halsschild matt erzgrün. Flügeldecken hellbraun, mit gelber schiefer Querbinde hinter der Mitte, welche vom Seitenrande bis zum dritten Streifen reicht, während die runde gelbe Makel der Stammform vom Seitenrande bis etwa zum fünften Streifen reicht.

(Philoctenus.)

guttula F. Hermannstadt, Kronstadt, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kleinpold, Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Bembidium obtusum F., welche Art Bielz für Schässburg anführt, ist irrtümlich in unser Verzeichnis gekommen, also zu streichen, obwohl ihr Vorkommen bei uns nicht ausgeschlossen ist.

Mannerheimi Salhb. Hermannstadt, Schässburg (c. a.).**biguttatum** F. Neudorf b. H., S.-Regen, Záh (Bielz); Honigberg (Altfluss), Marosujvár (c. a.); Hermannstadt, Talmesch, Szamosujvár (Ormay); Detunata (Mallász).**inoptatum** Schaum. (biguttatum Reichenb.). Reys, Schässburg, Dees (c. a.); Szamosujvár (Méhely).**lunulatum** Fourer. (guttula Redtenb.) Karlsburg, Marosujvár, Déva, Schässburg, Tordaer Schlucht, Dees (c. a.); Mező-Sámsond (Méhely).18. *Tachys Stephens.***bistriatus** Duft. Hátzeg, Dobra, Salzburg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Törzburg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (c. a.); Rodnagabirge (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).a. **rufulus** Rey. Schässburg (c. a.).**micros** Fisch. (gregarius Chaud.). Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Szováta (c. a.).**scutellaris** Steph. Szamosfalva (Bielz)var. **laticollis** n. v. Déva, Torda (c. a.).T. *scutellaris* v. *laticollis*. Länge 2–2,3 mm. Ausser durch geringere Grösse unterscheiden sich unsere Tiere von zwei aus Eisleben stammenden Exemplaren meiner Sammlung durch breiteren, an den Seiten vorn stärker gerundeten, nach hinten stärker verengten, gewölbteren und glänzenderen Halsschild mit durchwegs ziemlich deutlicher Mittelfurche und seichtem obsoletem Quereindruck hinter dem Vorderrande; vor den Hinterwinkeln sind die Seiten kaum ausgebuchtet und diese selbst stumpfwinklig infolge der beiderseitigen Abschrägung des Hinterrandes. Die Färbung der Flügeldecken ist im allgemeinen dunkler, bei den meisten Exemplaren sind dieselben ganz brann.

(Tachyura.)

parvulus Dej. Nagyg, Neudorf bei H. (Bielz); Alsó-Bákos, Baassen, Bük-szád (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

var. *curvimanus* Wolf Schässburg, Nagyenyed (c. a.).

quadrisingatus Duft. Hätzeg, Zool, Talmesch, Porcesest, Kerzer Gebirge, Mediasch, Dees (Bielz), Rotenturm, Unterkerz (c. a.); Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

sexstriatus Duft.

var. *politus* n. var. Rotenturm, Baassen, Schässburg (c. a.).

T. *sexstriatus* var. *politus*. Ich habe diese Art früher für Varietät *basimaculatus* Cheor. (*tetragnathus* Reitter, *diabrychus* Schaum nec Kolenati) gehalten, welche demnach aus unserm Verzeichnis zu streichen ist. Sie besitzt die Färbung und Zeichnung der Varietät *basimaculatus* Cheor., unterscheidet sich aber von dieser, sowie von der Stammform durch die wie bei T. *quadrisingatus* Duft. kräftig punktierten, an der Basis und vor der Spitze abgekürzten, stark vertieften drei Streifen der Flügeldecken, der vierte Streifen ist nur angedeutet.

var. *crux* Putz. Rodnagelirge (Bielz); Rotenturm (c. a.).

19. *Tachyta Kirby.*

nana Gyll. Durch das ganze Gebiet unter Baumrinden.

Trechinae.

Trechl.

20. *Perileptus Schaum.*

Am Ufer von Flüssen.

areolatus Creutz. Déva, Rotenturm, Repts, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Unterkerz, Alsó-Rákös, Rodnagelirge (c. a.); Bistritz, Kronstadt, Balánbánya (Deubel).

21. *Thalassophilus Wollaston.*

longleornis Sturm. Klausenburg (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.).

22. *Trechus Clairv.*

(*Trechoblemus*.)

micros Hbst. Neudorf b. H., Fogarasch (Bielz); Rodnagelirge (Ganglbauer); Malomvitz (Lanka negru, Deubel).

(*Lasiotrechus*.)

discus F. Rotenturm, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, Matosgebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Ujszékely (c. a.); Vargyas (Deubel); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

(*Trechus s. str.*)

quadristriatus Schrnk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **obtus** Er. Kerzer Gebirge (Bielz).

nigrinus Putz. Szurul (Bielz).

rubens F. Präsbe (Bielz), Zibingelirge (Ormay); Előpatak, Szováta, Schässburg (c. a.); Obertömös (Deubel); Rodnagelirge (Ganglbauer).

amplicollis (sculptus Schm.) Fairm. Előpatak (c. a.); Rodnagelirge (Bielz).

subnotatus Dej.

var. **cardioiderus** Putz. (palpis Dej.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borgoer Pass, Rodnagelirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Faj bei Hätzeg, Schulergebirge, Csukás (c. a.); Rotenturm, György (Ormay).

latus Putz. Götzenberg, Präsbe, Surul (Bielz); Kerzer Gebirge, Malomvitz, Retjezat, Paringul, Schässburg (Wolkendorfer Grund, Schowesgraben), Balánbánya, Borsék, Rodnagelirge (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel); Schanta, Porkovieza, György (Ormay).

fontinalis Rybinski. Rodnagelirge (c. a.).

Diese Art ist dem Tr. *latus* Putz sehr ähnlich, aber leicht von ihm zu unterscheiden durch das verdickte erste Glied der Hintertarsen.

insclitus K. Daniel. Oestliche Karpathen. **plicatulus** Mill. Rodnagelirge (c. a., teste Ganglbauer).

Dejeani Putz. Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea, c. a.); Mühlbacher Gebirge, Zibingelirge, Surul, Königstein, Kelemengelirge (Bielz).

Tr. *dejeani* Putz wird im Rodnagelirge von Tr. *plicatulus* Mill. vertreten.

banaticus Dej. Retjezat? (Deubel).

Bielz hat diese Art mit Tr. *Dejeani* Putz verwechselt, wie er Tr. *plicatulus* Mill. mit Tr. *Dejeani* verwechselte. Tr. *banaticus* Dej. ist eine noch nicht sicher geklärte Art aus den Banater Bergen.

striatulus Putz. Rodnagelirge (c. a., Ganglbauer).

Tr. *striatulus* Putz, *pulchellus* Putz und *carpathicus* Rybinski mit var. *breviusculus* Dan., von denen die beiden letzteren Bielz unbekannt waren, sind einander nahe verwandt, die letztere Art mit Tr. *striatulus* Putz oder eher mit Tr. *pulchellus* zusammengefallen worden, daher führe ich für dieselben nur die neuern, mir bekannten Fundorte an.

marginalis Schaum. Hätzeg (Piatra Sipo-tulin, Bielz); Malomvitz, Retjezat, Bucecs, Schuler-Gebirge (c. a.); Rosenauer Geb. (Deubel); Schanta, Präsbe, Porkovieza, Kerzer Gebirge (Ormay).

rhilensis Kaufmann. Sielenbürgen.

pulchellus Putz. Paringulgebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Geb. (Glashütte), Borsék, Rodnagelirge (c. a.).

carpathicus Rybinski. Balánbánya, Schuler-Gebirge, Bucecs, Rodnagelirge (c. a.).

var. **breviusculus** Dan. Csukás, Rodnagelirge? (c. a.).

Ormayi Ganglb. Rotenturm, Bülös (c. a.); Schuler-Gebirge, Bodzaer Gebirge, Zernester Gebirge, Vargyastal (Deubel).

Bielz führt auch an Tr. *Perthyi* Heer von Resmar, Surul und Gergénygebirge und Tr. *longhi* Com. von Csáki-Görbő, die bei uns sicher nicht vorkommen; ebenso Tr. *rotundipennis* Duft (Präsbe, Fogarascher, Kerzer Gebirge, Tr. *eroticus* Dej. Fogarasch und Tr. *rotundatus* Dej. (Kerzer Gebirge).

procerus Putz. Surul, Frecker Gebirge, Negoi, Kerzer Gebirge, Arpascher, Fogarascher, Rodnagelirge (Bielz); Bucecs, Plaju foi (Zernest, Deubel).

- corpulentus** Wse. Präsbe (Bielz).
subterraneus Mill. Rodnagebirge (Bielz);
 Roren (jenseits der Grenze in der Bukowina, Deubel).
ruthenus Reiter. Rodnagebirge (Kuhhorn, c. a.).
Kimakoviczi Ganglb. Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Buleatal, an der Grenze und oberhalb der Baumregion, c. a.).

23. *Anophthalmus Sturm.*

(Duvalius.)

- pseudoparoecus** Csiki. Höhle bei Zalutna (Preszaka, c. a.).
Sziladyi Csiki. Höhle bei St. György im Erzgebirge (c. a.).
Dleneri Csiki. Bucsecs (Deubel, Csiki 1910);
 Rovantani Lapok, XVII. 5—8. füz. 1910.
Mallászi Csiki. Detunata.
Deubelianus Ganglb. Retjezat (Zenoga-See, c. a.).
Deubelianus Csiki. Königstein (Valea Vle-
 duci a lui Tamas, Deubel).
gracilis n. sp. Kerzer Gebirge (Butianu, Lakutz, c. a.).

Anophthalmus gracilis. Long. 3.2 mm. Nitidus, testaceus, glaber. A. Deubelianus Csiki proximus, sed magnitudine minore, striis septem elytrorum imprimis distinctis. Caput rotundatum, temporibus parum convexis, sulcis frontalibus usque ad stricturam capitis extensis, arcuatis, profundis; Oculi, pigmento non infecti, rotundi. Antennae breves, apicem versus incrassatae, articulo secundo quarto haud brevior. Prothorax capite vix lator, subcordatus, latitudine maxima brevior, lateribus basin versus leviter arcuatis, ante basin rectis, acutis, margine laterali subtiliter reflexo, dorso medio sulcato, intra angulos posticos vix excavatus. Elytra subparallela, lateribus medio parum rotundato ampliatis, humeris convexis, apice conjunctim rotundata, striis septem punctatis, duobus internis profundis, externis subtilioribus, instructa, stria tertia foveolis tribus, primo pone basin, secundo in medio, tertio ante apicem impressa.

Die neue Art steht entschieden dem mir unbekannten A. Deubelianus Csiki am nächsten, unterscheidet sich jedoch von demselben durch geringere Grösse (3.2 mm gegen 4.3 mm), deutliche sieben Punktstreifen der Flügeldecken, gleichlanges zweites und viertes Fühlerglied, der Beschreibung nach abweichende Kopfform und kurze Fühler. Sie nähert sich einigermaßen auch dem Trehus Kimakoviczi Ganglb., von dem sie durch geringere Grösse, pigmentlose Augen, wesentlich schmäleren Kopf und Halsschild und schmäler abgesetzten Seitenrand des letzteren abweicht. Von A. Deubeli Ganglb. unterscheidet sie sich durch geringere Grösse, weniger gleichbreite Gestalt, wesentlich schmäleren Kopf und Halsschild, kürzere Fühler, stärker convex gerundete Schultern usw.

Csiki gibt nicht an, ob bei A. Deubelianus die Spitze der Flügeldecken einzeln oder zusammen abgerundet ist, da er sie mit A. Deubeli vergleicht, muss ich ersteres annehmen, und dann wäre dieses ein weiteres gutes Unterscheidungsmerkmal, da sie bei der neuen Art zusammen abgerundet sind.

- Merkli** Friv. Malomviz (Hätszeg, Lunka negru); Paringulgebirge (Karsia, c. a.).
dacicus Friv.
 var. **malomvicensis** Ganglb. Malomviz (Hätszeg, Lunka negru, c. a.).
Dietl Ganglb. Zibinsgebirge (Vurfu mare, Csiki).
oavifuga Ganglb. Paringulgebirge (Baumgrenze, c. a.).

- Budae** Kenderesy. Höhle bei Ponoriclu (Hätszeg, c. a.).

Ganglbauer gibt die Grösse des A. Budae Kend. mit 5 mm an; mein Exemplar hat nur eine Länge von 4.6 mm.

Bielz führt auch A. Redtenbacheri Friv. aus einer Höhle bei Nagyenyed Remete an, doch dürfte diese Art bei uns nicht vorkommen, und eher A. Sziladyi Csiki oder eine neue Art in dieser Höhle leben.

- Bielzi** Seidl. Fogarascher Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
 var. **transsylvanicus** Csiki. (pilosellus Ganglbauer, Miller). Schuler-Gebirge, Csukás, Vargyastal (in der Umgebung der Almascher Höhle, c. a.); Rodnageb., Bucsecs, Flintschhöhle bei Rosenau, Nagyagymás (Deubel). Am Csukás fand ich zwei Exemplare unter den Wurzeln eines Eichenstumpfes.
 var. **pilosellus** Mill. Rodnagebirge (Szaka, Deubel, 1 Exemplar).

24. *Epaphius Samouelle.*

- secalis** Payk. Petrozsény, Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú, Klausenburg (Bielz).

Patrobi.

25. *Patrobus Stephens.*

- excavatus** Payk. Schiellal, Zalutna, Mediasch, Fogarasch, Kronstadt, Bükszád. Ojtoz-Pass, Oláhfalú, Rohna-Gebirge (Kuhhorn, Bielz); Malomviz, Előpaták, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altner, Deubel); Hermannstadt, Torda, Gyógy (Ormay).
quadrifidus Mill. Kerzer Gebirge, Bucsecs, Schuler-Gebirge, Tömöser Pass, Piatra mare, Csukás, Tesla, Dongókő, Bodzaer Pass, Rodnagebirge (Bielz).

26. *Deltomerus Motsch.*

- carpathicus** Mill. Rodnagebirge (Bielz).

Pogoninae.

Leben ausschliesslich auf Salzboden.

27. *Pogonus Dej.*

- luridipennis** Germ. Szamosfalva, Kolos, Zabenica (S.-Regen, Bielz); Marosujvár, Déva (c. a.); Torda (Ormay).
iridipennis Nic. Déva, Salzburg, Szamosfalva, Kolos, Zabenica (Bielz); Marosujvár, Torda (c. a.).
chalcus Marsh. Persány (Bielz).
riparius Dej. Déva, Salzburg, Szamosfalva, Eidisch, Zabenica (Bielz); Szováta (c. a.).
persicus Chd.
 var. **peisonis** Ganglb. Déva, Baassen, Marosujvár (c. a.).
 (Pogonistes.)
depreus Motsch. Torda (c. a.).

Panagaeinae.

28. *Panagaeus Latr.*

- crux major** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. **Schaumi**. Schässburg, Előpatak (c. a.).
 a. **trimaculatus** Dej. Fogarasch, Schässburg (Bielz)
bipustulatus F. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Reschmar, Szehste, Rotenturm, Salzburg, Szamosujvár (Ormay)

Chlaeniinae.

29. *Chlaenius Bonelli*.

- An den Ufern der Gewässer und feuchten Orten.
 (Chlaenites)
spoliatus Rossi. Salzburg b. H., Reussener Teiche, Girelsau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).
 (Dinodes.)
decipiens DuRoi (azureus Duft) Altufer bei Fogarasch (Bielz)
 (Chlaenius i. sp.)
festivus F. Déva, Fogarasch, Mediasch, Gyeke (Bielz); Szamosujvár (Ormay).
vestitus Payk. (viridipunctatus Goeze.). Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf bei H., Leschkirch, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, S.-Regen, Schässburg, Dees, Gyeke (Bielz); Ober-Kerz, Rotenturm, Reimete (Nagyenyel), Szamosujvár (Ormay).
nitidulus Schrnk. Am Ufer süsser Gewässer durch das ganze Berg- und Hügelland.
nigricornis F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Gross-Schenk, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Balánbánya (Deubel); Pókafalva (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay).
tristis Schall. Déva, Reussener Teiche, Gyeke (Bielz); Hermannstadt, Dálnok (Háromszék, Ormay).

30. *Callistus Bonelli*.

- lunatus** F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Oodinae.

31. *Oodes Bonelli*.

- helopioides** F. Hermannstadt, Kronstadt, Marosgeburge, Bistritz, Záh (Bielz).
gracilis Villa Rodna (Bielz); Schässburg (Röhricht im Atelsloch, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Licininae.

32. *Badister Dej.*

- unipustulatus** Bon. Hätzeg, Záh (Bielz); Reys, Nagyenyel, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
bipustulatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. **binotatus** Fischer. Karlsburg (c. a.).
sodalis Duft Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hosszufalu, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt, Honigberg (Altufer, Deubel).
 (Baudia.)
peltatus Panz. Kronstadt (Bielz); Honigberg (Altufer, Deubel).

33. *Licinus Latreille*.

- (Neorescius.)
Hoffmannsegg Panz. Schieltal, Götzenberg, Präshe, Porcest, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Königstein, Buceses, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Sachs. Regen, Marosgebirge (Bielz); Zalatna (Präszaka), Bistra, Csukás, Bülös, Annensee, Retezat, Schässburg, Schuler-Gebirge (c. a.); Schanta (Ormay).
 (Licinus s. str.)
cassideus F. Déva, Fogarasch, Marosgebirge, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Hätzeg, Puj (c. a.).
depressus Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Amblystominae.

34. *Amblystomus Erichs.*

- metallescens** Dej. Hermannstadt (Ormay).

Harpalinae.

Daptinl.

35. *Daptus Fischer*.

- vittatus** Fisch. Déva (c. a.).
 a. **Komineckii** Bielz. Déva, Eidisch (Birther), Zsabenitz (Bielz)

36. *Ophonus Stephens*.

(Ophonus s. str.)

- obscurus** F. (columbinus Germ.). Salzburg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Záh (Bielz); Alsó-Rákos, Pilis (Nagyenyel, c. a.).
sabulicola Panz. Déva, Birtalm, Mediasch, Schässburg, Klausenburg, S.-Regen (Bielz).

diffinis Dej. Előpatak (Bielz).

Das Vorkommen des *O. diffinis* Dej. in Siebenbürgen dürfte nicht genügend verbürgt sein. (Tachyphonus.)

rupicola Sturm. Mühlbach, Neudorf b. H., Götzenberg, Rotenturm, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Klausenburg (c. a.).

punctatulus Duft. (latcollis Mannh.). Kronstadt, Bükszád, Marosgebirge, Bistritz, Gross-Scheuern, Mediasch, Hargita, Oláhfalú (Bielz); Déva, Schässburg (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

cordatus Duft. Präsbe, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

puncticollis Payk. Paringul, Götzenberg, Kerz, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Reps, Pilis (bei Nagyenyed, c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Magyar-Bükkös, Remete (b. Nagyenyed, Ormay).

brevicollis Serv. Paringul, Kerzer Geb., Záh (Bielz); Schässburg (c. a.).

var. **parallelus** Dej. Hammersdorf (Bielz).

azureus F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **coeruleipennis** Mén. Rotenturm (Ormay).

cribricollis Dej. Kronstadt (Bielz).

signaticornis Duft. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.).

(Parophonus.)

mendax Rossi. Déva, Hunyád (Bielz).

(Pseudophonus.)

maculicornis Duft. Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay).

var. **complanatus** Dej. Hátszeg, Birtihalm, Mediasch, Schässburg (Kokelufer, Bielz); Honigberg (Altufér, Deubel).

(Pardileus.)

griseus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pubescens Müll. Ebenso.

(Harpalophonus.)

calceatus Duft. Gross-Scheuern, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Kakova (Ormay).

hospes Sturm. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

var. **sturmi** Dej. Hátszeg, Déva, Salzburg, Fogarasch, Hosszufalu, Borszék, Záh (Bielz); Marosujvár (c. a.).

37. Harpalus Latreille.

aeneus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **confusus** Dej. Schässburg, Borszék (Bielz); Déva, Nussbach (c. a.); Rotenturm, Ober-Kerz, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. **semipunctatus** Dej. Schässburg (c. a.).

var. **limbopunctatus** Fuss. Hargita, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szakadát, Ober-Kerz, Rotenturm, Remete, Szamosujvár (Ormay); Oláh-

falu, Rodna, Schuler-Gebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **interstitialis** Gredl. Déva (c. a.).

(Lasioharpalus.)

distinguendus Duft. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auf Feldern.

smaragdinus Duft. Déva, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Hargita, S.-Regen, Záh (Bielz).

cupreus Dej. Déva, Salzburg, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

dimidiatus Rossi. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

(Harpaloxys.)

rufus Brüggen. Rotenturm, Kronstadt, Reps (Bielz); Torda, Gyéres (c. a.).

atratus Latr. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Hátszeg, Szurduk-Pass, Déva, Torda, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay).

var. **subsinuatus** Duft. Tordaer Schlucht (c. a.).

pygmaeus Dej. Déva (c. a.); Salzburg (Ormay).

(Amblystus.)

latus L. Hermannstadt, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen, Borszék, Záh (Bielz); Déva, Nagyenyed, Rodnagebirge (c. a.); Michelsberg, Rotenturm, Ober-Kerz, Szamosujvár (Ormay).

luteicornis Duft. Déva, Hermannstadt, Resinar, Kronstadt (Bielz); Klausenburg, Schässburg (c. a.); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay).

quadripunctatus Dej. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Szurduk-Pass, Bistra, Rodna-Gebirge (c. a.); Hammersdorf, Schanta (Ormay).

rubripes Duft. Gross-Scheuern, Präsbe, Rotenturm, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Előpatak, Karlsburg, Pilis (Nagyenyed), Oláhfalú (c. a.).

var. **sobrinus** Dej. Kronstadt (Bielz).

(Harpaloderus.)

honestus Duft. Karlsburg, Hátszeg, Szurduk-Pass, Schässburg, Borszék, Tordaer Schlucht, Déva, Nussbach (c. a.); Zernest, Honigberg (Altufér, Deubel).

Da Bielz *H. honestus* Duft. und *H. rufitarsis* Duft. nicht von einander trennen konnte, sind seine Fundortangaben nicht verwendbar.

rufitarsis Duft. Karlsburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

neglectus Serv. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

(Harpalobius.)

fuscipalpis Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz).

Fröhlichii Sturm. Hermannstadt (Alter Berg, Bielz).

autumnalis Duft. Zood, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Tordaer Schlucht (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Ober-Kerz, Grossau (Ormay); Kronstadt (Deubel).

- hirtipes** Panz. Hargita, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz).
zabroides Dej. Torda (Deubel).
servus Duft. Déva, Kronstadt, Dees (Bielz).
 Retzeat (c. a.).
flavicornis Dej. Schässburg (Bielz); Karlsburg (c. a.).
tardus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
modestus Dej. Záh (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
anxius Duft. Hátzeg, Déva, Gross-Scheuern, Záh, Gyeke (Bielz); Karlsburg, Pils (Nagyenyei), Nagyenyei (c. a.).
taciturnus Dej. Siebenbürgen.
 Siehe Catalogus coleopterorum Europae etc. Heyden etc. 1906, col. 68.
serripes Quens. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 (Aetophilus.)
picipennis Duft. Déva, Gross-Scheuern, Rossin, Marienburg b. Kr., Gyeke (Bielz); Karlsburg, Hermannstadt, Orlat, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 (Microderes.)
scaritides Sturm. Klausenburg (Bielz).

Aenpalpini.

38. *Trichotichus Morawitz.*

- laevicollis** Duft. (satyrus Strm.). In unsern Gebirgen.

39. *Stenolophus Dej.*

- teutonus** Schm. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Reussener Teiche, Gross-Schenk, Héiz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Pils (Nagyenyei), Déva (c. a.); Hammersdorf, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay).
Skrimschiranus Steph. Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Marosujvár (c. a.).
 a **affinis** Bach. Marosujvár, Puj (Hátzeg, c. a.).
discophorus Fisch. Kronstadt, Klausenburg (Bielz), Hosszufalu, Schässburg (Kokelufer, c. a.).
 var. **flavusculus** Motsch. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).
Steveni Kryn. Hammersdorf (Bachufer), Reussener Teiche, Klausenburg, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
mixtus Hbst. Hermannstadt, Schässburg, Záh (Bielz), Hátzeg (Deubel).
 var. **Ziegleri** Panz. Schässburg (c. a.).

40. *Aenpalpus Dej.*

- flavicollis** Strm. Dobra, Hammersdorf, Rotenturm, Fogarasz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Kronstadt (Deubel); Torda.

- brunnipes** Sturm. Dobra (Bielz).
interstitialis Reitter. Déva (c. a.).
suturalis Dej. Szamosujvár (Ormay).
meridionalis L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
dorsalis F. Fogarasz (Altufér, Bielz); Kronstadt (Deubel).
luteatus Duft. Kronstadt.
exiguus Dej. Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

41. *Anthraeus Molschulsky.*

- longicornis** Schaum. Marosujvár (c. a.).
consputus Duft. Honigberg (Altfluss, Deubel).

42. *Bradycellus Erichs.*

- harpalinus** Serv. Seli Ital (Bielz), Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Schulergebirge, Rohmgebirge (Deubel).
collaris Payk. Schässburg, Berthalm (Bielz); Baassen, Borszék (c. a.), Rohmgebirge, Nagyhazmász (Deubel).

43. *Dichirotrichus Due.*

- pubeseens** Payk. Mühlbach, Salzburg, Szamosfalva, Kronstadt, Torda, Dees-Akna, Szováta (c. a.); Hermannstadt (Ormay), N.-Eihsch.
 var. **ustulatus** Dej. Salzburg, Szamosfalva (Bielz).
obsoletus Dej. Grossschenk (Bielz).

Das Vorkommen dieser dem südlichsten Europa angehörigen Art dürfte kaum wahrscheinlich sein, jedenfalls aber weiterer Belege bedürfen.

Anisodactylini.

44. *Diachromus Erichs.*

- germanus** L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

45. *Anisodactylus Dejéan.*

- (Hexatrichus.)
poeciloides Steph. Torda (Bielz, c. a.); Kronstadt (Deubel).
 (Anisodactylus s. str.)
binotatus F. Durch das ganze Gebiet.
 var. **spureaticornis** Dej. Wie die Stammform.
nemorivagus Duft. Durch das ganze Gebiet.
signatus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Zabrinae.

46. *Zabrus Clairville.*

- tenebrioides** Goeze. Hermannstadt, Salzburg, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

Amarinae.

47. *Amara Bonelli*.

(Triena.)

fulvipes Serv. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Szamosujvár (Ormay).**concinna** Zimm. (amabilis Hampe). Salzburg, S.-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Ormay).**tricuspidata** Dej. Freck, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Malomviz, Rotenturm, Petrozsény, Ponor (Hátszeg, c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).**plebeja** Gyllh. Kronstadt (Bielz); Petrozsény, Schässburg (auf Grasrispen), Nieder-Eidisch (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

(Amara s. str.)

similata Gyllh. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Nagyenyed, Borszék (c. a.); Hermannstadt (Ormay).**ovata** F. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Retjezat, Rodnaggeb. (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm, Schanta (Ormay).a. **adamantina** Kolenati. Schässburg (c. a.).**saphyrea** Dej. Déva (Bielz).**montivaga** Sturm. Präsbe, Kronstädter Geb. (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Borszék (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Szeliste (Ormay); Schuler-Gebirge (Deubel).**nitida** Sturm. Hátszeg, Präsbe, Reps, S.-Regen (Bielz); Retjezat, Rotenturm, Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).**communis** Panz. Durch das ganze Gebiet.**convexior** Steph. Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Kronstadt, Zernest, Tusnád (Deubel).**lunicollis** Schölte. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rodnaggebirge (c. a.); Porumbacher Gebirge, Nagyág (Ormay).**Schimperi** Wenck. Bucsecs, Rodnaggebirge (c. a.); Vale vinului (Rodnaggebirge, Ganglbauer).**curta** Dej. Schieltal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Heltau, Fogarasch, Nussbach (Bielz); Karlsburg, Rodnaggebirge, Alsó-Rákös (c. a.); Gyergó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel); Detunata (Mallász).**aenea** Degeer. Durch das ganze Gebiet.**spreta** Dej. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schanta, Gyergó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).**famelica** Zimm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnaggebirge, Marosujvár (c. a.).**eurynota** Panz. (vulgaris F.). Hermannstadt, Schässburg, Rodna, Záh (Bielz); Karls-

burg, Baassen (c. a.); Ober-Kerz, Miriszlo (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).

familiaris Duft. Durch das ganze Gebiet.**anthobia** Villa Déva (c. a.).**lucida** Duft. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Marosujvár (c. a.).**tibialis** Payk. Gross-Scheuern, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Borszék (c. a.).

(Celia.)

ingenua Duft. Déva, Hermannstadt, Sächsisch-Regen, Záh (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.).**cursitans** Zimm. Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.).**municipalis** Mill. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergó-Tölgyes (Ormay); Hátszeg (Deubel); Schässburg (c. a.).**misella** Mill. Zibinsgebirge, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Geb., Bucsecs, Piatra mare, Csukás (Bielz); Rodnaggebirge (Ganglbauer, c. a.).**erratica** Duft. Hermannstadt, Borszék, Dees (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Paringul (c. a.); Bucsecs, Nagybagymás (Deubel); Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnaggebirge (Ganglbauer).**Quenseli** Schönh. Bucsecs (Deubel, c. a.).**bifrons** Gyll. (livida F.). Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Reps, Klausenburg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Karlsburg, Reps (c. a.).

(Acrodon.)

brunnea Gyll. Kronstadt (Bielz).

(Bradytus.)

apricaria Payk. Hermannstadt, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Dees, Záh (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Bistritz (c. a.); Salzburg, Nagyenyed (Ormay).**fulva** Dej. Hermannstadt, Zood, Mediasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hammersdorf, Miriszlo (Unterweissenburger Komitat, Ormay); S.-Regen, Bistritz.**consularis** Duft. Hermannstadt, Götzenberg, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (c. a.).

(Cyrtotonotus.)

aulica Panz. Csib, Götzenberg, Mediasch, Schässburg, Nussbach, Krizha, Kelemengebirge, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz, Előpatak, Klausenburg, Rodnaggebirge (c. a.); Vargyastal (Deubel); Hermannstadt, Hammersdorf, Bistra (Ormay).**convexiuscula** Marsh. Hosszufalu, Záh (Bielz).

(Leirides.)

nobilis Duft. Kronstadt (Bielz).

(Percosia.)

equestris Duft. Unter-Kerz (Bielz), Schassburg, Bistra, Balánkány, Klausenburg, Pilis (Nagyenyed), Rodnagelberge (c. a.).

Pterostichinae.

Stomini.

48. *Stomis Clairville*.

pumicatus Panz. Im Gebirge und im Bergland verbreitet.

Pterostichini.

49. *Abax Bonelli*.

ater Villa L. (striola F.). In den Wäldern des ganzen Gebietes.

Nach Seidlitz (F. transs.) soll bei uns nur die dem südlichen Europa eigentümliche Varietät A. v. inferior Seidl. vorkommen.

var. **inferior** Seidl. Bistra, Schässburg (c. a.).

parallelus Duft. Durch das ganze Gebiet.

carinatus Duft. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzungen, Götzenberg, Porumbak, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gebirge, Nussbach, Reps, Schassburg, Oláhfalú, Marosgebirge, Dees (Bielz); Rotenturm, Szamosújvár (Ormay); Detunata (Mallász).

var. **latus** Dej. Siebenbürgen (Hätzeg? Bielz).

var. **porcatus** Duft. Hätzeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Abacopercus.)

Schuppeli Pall. Déva, Detunata, Gya'u S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.).

var. **Rendschmidtii** Germ. Retjezat, Holzungen, Girelsau, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Busecs, Tesla, Dongökő, Bozauer Pass, Birtalm, Schassburg, S.-Regen (Bielz), Hermannstadt, Zalatna (Präsche, Töröczkő, Reps, Nagyenyed, Rotenturm, Klausenburg (c. a.); Hammersdorf, Rakovicza, Präsche, Déva (Ormay), Detunata (Mallász).

50. *Molops Bonelli*.

robustus Dej. Siebenbürgen (Bielz).

elatus F. Götzenberg, Präsche, Fogarasch, Talmesch (Bielz).

Nussbach und Oláhfalú als Fundorte des *M. elatus* F. sind zu streichen; ob *M. elatus* überhaupt bei uns vorkommt, ist noch zu erweisen, da er vom ähnlichen *M. alpestris* Dej. sicher nur durch die Penisform unterschieden werden kann und Ormay vom Götzenberg den *M. alpestris* Dej. nachweist.

alpestris Dej. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay); Szurduk-Pass (c. a.).

7 ovipunnis Chd. Kronstadt (Bielz).

Deubel hat *Molops ovipennis* Chd. bei Kronstadt nie gesammelt; ebensowenig ist die Varietät wieder gesammelt worden, so dass das Vorkommen dieser Art bei uns sehr fraglich erscheint.

? var. **medius** Chd. Kerzer Gebirge (Bielz). **piceus** Panz. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **montanus** Heer. Kerzer Gebirge (Bielz). **orthogonius** Chd. Siebenbürgen (Bielz).

51. *Pterostichus Bonelli*.

(Adelosia.)

macer Marsh. Hätzeg, Csiker Gebirge (Bielz); Baassen (c. a.); Hermannstadt, Salzbürg, Szakadát (Ormay).

(Poecilus Bon.)

Koyi Germ. Kronstädter Gebirge (Bielz); Transsylvania (c. a.).

marginalis Dej. Malomviz, Retjezat, Bistra, Rodnagelberge, Tordauer Schlucht (c. a.); Bálványos bei Torja (Méhely).

a. **Szepigletti** Csiki. Rodnagelberge (c. a.); Nagybagmäs, Busecs, Königstein, Schulergebirge (Deubel).

lepidus Leske. Schietal, Hätzeg, Präsche, Surul, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Königstein, Hosszufalu, Tartlau, Nussbach, Bükszád, Gross-Schenk, Schässburg, Oláhfalú, Hargita, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Ratosnya, Szurduk-Pass, Bistra (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

cupreus L. (cursorius Heer.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **affinis** Sturm. Mit der Stammform. a. **erythropus** Fald. Mit der Stammform.

coeruleus L. Hätzeg, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Klausenburg, Schassburg, Borszós, Rodnagelb., Petrozény, Bükszád (c. a.).

striatopunctatus Duft. subcoeruleus Schaumnec Quens.). Dobra, Rotenturm, Reussener Triche, Fogarasch, Schässburg, Dees (Bielz); Karlsburg, Ujszékely b. Sch. (c. a.).

Pt. subcoeruleus Quens., welcher im Kaukasus vorkommt, ist bei uns nicht nachgewiesen, und die Angaben Bielz's beziehen sich auf *striatopunctatus* Duft. der an Flussufern nicht selten ist.

(Pediur.)

inaequalis Marsh. Götzenberg (Bielz); Schässburg unter Weidenrinde, (c. a.); Várhegy (Deubel).

(Lagarus.)

vernalis Panz. (bimpressus Fuss.). Hätzeg, Hermannstadt, Dobra, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Héviz, Kronstadt, Nussbach, Marienburg b. Kr., Bükszád, S.-Regen, Záh, Schässburg (Bielz); Szurduk-Pass, Reps, Retjezat, Nagyenyed, Pilis (b. Nagyenyed, c. a.); Rotenturm, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. **cursor** Dej. Marosujvár (c. a.); Kis-zsék (Méhely).

(Lyperosomus.)

aterrimus Herbst. Gross-Schenk, Sächs.-Regen, Csiker Gebirge (Bielz).

elongatus Duft. Klausenburg (Bielz).

(Bothriopterus.)

oblongopunctatus Fbr. In den Wäldern des ganzen Gebietes verbreitet.

angustatus Duft. Retjezat, Zibinsgebirge, Zood (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay).

(Platysma.)

niger Schall. Hätzeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Nussbach, Repts, Mediasch, O'ähfalu, Borszék, S.-Regen, Záh (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Rodnagelbirge (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Präsbe, Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).

Pt. niger v. distinguendus Heer. ist aus unserm Verzeichnis zu streichen, obgleich ich zwischen zwei Exemplaren des distinguendus aus Uralsk und unserem Pt. niger keinen wesentlichen Unterschied zu entdecken vermag.

(Omaeaus.)

vulgaris L. Schieltal, Hätzeg, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Marienburg, Nussbach, Mediasch (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Torda (c. a.); Hermannstadt, Ober-Kerz (Ormay); Detunata (Mallász).

(Pseudomasens.)

nigrita F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Tömöspass, Bükszád, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Vidra (Aranyos-Tal), Záh (Bielz); Paringul, Pilis (Nagyenyed), Klausenburg (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

anthracinus Illig. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarascher Geb., Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg (Bielz); Retjezat, Klausenburg (c. a.); Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

gracilis Dej. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); **minor** Gyllh. Déva, Hermannstadt (J. W.), Gross-Scheuern, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).

(Argutor.)

interstinctus Sturm. Hätzeg, Gross-Scheuern, Nussbach, Schässburg, Oláh-falu, Záh (Bielz); Schässburg, Pilis (Nagyenyed), Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Stolzenburg, Kakova, Dálnok (Háromszék, Ormay).

strennuus Panz. Hätzeg, Präsbe, Gross-Schenk, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Szurduk-Pass, Klausenburg, (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm,

Talmesch, Arpascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Porumbaker Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

diligens Sturm. Hätzeg (Bielz); Csukás, Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Borszék, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg (Ormay).

(Orites.)

negligens Sturm. S.-Regen (Bielz).

Da Pt. negligens bis jetzt nur vom Biesen-gebirge bekannt geworden ist, und die Bielz-sche Angabe durch neuere Funde bis jetzt noch nicht bestätigt worden ist, scheint das Vorkommen dieser Art bei uns nicht ausser allem Zweifel.

(Pseudorthomus.)

unctulatus Duft. Vistea mare, Kronstädter Gebirge, Schuler-Gebirge, Kelenengebirge (Bielz); Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.); Schanta, Porkovicza, Präsbe, Porumbaker Gebirge, Arpascher Gebirge (Ormay).

subsinuatus Dej. Besmeu, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Bielz).

Bielz führt auch Pt. subsinuatus Dej. von zahlreichen Funden an, an denen später nur Pt. unctulatus Duft. nachgewiesen worden ist, was das Vorkommen dieser Art bei uns sehr in Frage stellt.

(Haptoderus.)

brevis Duft. Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat, Szurduk-Pass (c. a.).

Bielzi Fuss. (festinans Chd.). Bihargeb. (Muncesl mare bei Rekickel).

(Steropus.)

rufitarsis Dej. Rodnagelbirge (Deubel, c. a., Ganglb.), Detunata (Mallász), Schanta, Porkovicza, Bistra, Arpascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Porumbaker Gebirge (Ormay).

var. **Deubeli** Ganglb. Schuler-Gebirge, Csukás, Balánbánya, Borszék, Rodnagelbirge, Bistra (c. a.); Detunata (Mallász).

var. **tenuimarginatus** Chd. Negovan, Präsbe, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Piatra mare, Tesla, Dougókő, Bozauer Pass, Rodnagelbirge (Bielz); Paringulgebirge, Retjezat (c. a.).

aethiops Panz. Surul, Kronstädter Geb., Schuler-Gebirge, Cibbes, Rodnagelbirge (Bielz).

Das Vorkommen des Pt. aethiops Panz. scheint mir sehr fraglich, da das Tier seit Bielz nicht mehr gesammelt worden ist.

madidus F. Marosgebirge, Rodnagelbirge (Kuhhorn, Bielz).

Aus demselben Grunde ist auch das Vorkommen des Pt. madidus bei uns nicht wahrscheinlich.

cophosioides Dej. Déva (Bielz).

(Cophosus.)

cylindricus Hbst. Hermannstadt (Bielz).

(Pterostichus s. str.)

melas Creutz. Holzmengen, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Mediasch, Schässburg, Reps, Olábfalu, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Tordaer Schlucht, Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Schanta, Remete (Nagyenyel); Szamosujvár (Ormay)

var. **hungaricus** Dej. (transylvanicus Chaud.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Porcest, Surul, Pietra mare, Csukás, Tesla, Dongókó, Bozauer Pass (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Remete, Szamosujvár (Ormay); Bistra, Schässburg, Balánbánya, Olábfalu, Retjezat, Nagyenyel, Torockó, Tordaer Schlucht (c. a.); Detunata (Mallász); Schuler-Geb., Nagybágyás (Deubel)

Die siebenbürgischen Stücke des *Pt. hungaricus* Dej. sind kleiner und gedrungener als vier Exemplare, welche ich aus Ungarn besitze, auch ist der Halsschild bei den siebenbürgischen Stücken nach hinten in der Regel nicht viel stärker als nach vorne verengt; in der Form der Hinterbrust-Episternen, die Seiditz als Unterschied hervorhebt, finde ich keinen bemerkbaren Unterschied.

Kokeili Mill. Fogarascher Gebirge, Rohagebirge (Kuhhorn, Bielz).

(Petrophilus.)

foveolatus Duft. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Buceacs, Predal, Marosgebirge, Rohagebirge (Bielz); Schulergebirge (c. a.)

var. **interruptus** Bielz. Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodnagelberge (Ganglbauer, c. a.); Detunata (Mallász).

Findeli Dej. In sämtlichen höheren Randgebirgen.

(Cheporus.)

transversalis Duft.

var. **Etelkai** Ormay. Retjezat, Detunata, Aranyostal (Skerisora, Bielz); Paringul, Nagyenyel (c. a.).

Ich habe die Bielz'schen Fundorte des *Pt. transversalis* Duft. auch zu Etelkai gezogen, da es mir zweifellos scheint, dass sie sich auf die Varietät beziehen. Um so mehr wundert es mich, dass Ormay den *Pt. transversalis* von Remete anführt, das unweit Nagyenyel liegt, woher mir *Pt. Etelkai* vorliegt.

(Oreophilus.)

maurus Duft. Paringul, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge (Bulea), Kronstädter Gebirge, Buceacs (Bielz).

a. **erythromerus** Ganglb. (maurus Strm.)

Zusammen mit der Stammform

(Bryobius.)

Jurinei Panz.

var. **Heydeni** Dej. Retjezat, Besineu, Galbana, Präsbe, Surul, Frecker Gebirge (Negoi), Kerzer, Arascher, Fogarascher, Kronstädter Gebirge, Buceacs, Pietra mare (Bielz); Malomvizi, Bistra, Paringulgebirge, Rodnagelberge (c. a.); Schanta, Porkovicza (Ormay)

(Calopterus.)

fossulatus Quens. Retjezat, Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz).

var. **Welensi** Drap. (Klugi Dej.) In allen höheren Gebirgen.

var. **marginatus** n. v. Rodnagelberge (c. a.).

Im Rodnagelberge kommt eine Form des *Pt. fossulatus* Quens. vor, welche deutlich gerandete Flügeldeckenbasis besitzt, wodurch sie dem *Pt. variolatus* Dej. noch ähnlicher wird, von dem sie sich nur durch kürzere Basalgrüben des Halsschildes und seichterem Quereindruck vor der Basis desselben zu unterscheiden scheint. Ich schlage für diese Varietät den Namen *marginatus* vor. Oft besitzt sie wie die Varietät *Welensi* Drap. zwei Basalgrüben auf der Halsschildbasis.

52. *Sphodrus Clairv.*

leucophthalmus L. Déva, Hammersdorf, Gross-Schenkern, Holzmengen, Girdelsau, Kronstadt, Hosszufalu, Krizba, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

53. *Laemostenus Bonelli.*

(Cryptotrichus.)

janthinus Duft.

var. **coeruleus** Dej. Hermannstadt, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (Ormay).

(Laemostenus.)

venustus Clairv. Schässburg (Breite, Witeberg, am Fusse, unter der Rinde, im morschen Holze hohler Eichen im Herbste und im ersten Frühjahr); Ruzsad (Ormay).

(Pristonychus.)

punctatus Dej. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Méhely).

terricola Hbst. (inaequalis Panz.). Hermannstadt, Bithalm, Kronstadt, Hosszufalu, Krizba (Bielz).

Nachdem diese Art seit Bielz nicht mehr gesammelt wurde, gewinnt es fast den Anschein, als ob hier eine Verwechslung mit *L. punctatus* Dej. vorliege, der dem *L. terricola* sehr ähnlich ist.

54. *Platyderus Schaum.*

ruficollis Marsh. Hammersdorf, Mediasch (Bielz); Torockó (Ormay).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese dem Westen Europas angehörige Art nur irrtümlich in unser Verzeichnis gekommen ist, da *Pt. rufus* Duft. früher nur als Varietät des *Pl. ruficollis* Marsh. angesehen wurde.

rufus Duft. Schieltal, Präsbe, Porcest, Surul, Kerzer Gebirge, Königstein, Schässburg, Borszék (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Csukás, Zalatna (c. a.); Déva, Hammersdorf, Götzenberg, Ruzsad (Ormay); Bistritz (Prof. Müller).

55. *Calathus Bonelli*.

fuscipes Goeze. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **latus** Serv. (punctipennis Germ.). Detunata (Mallász).

erratus Sahlb. Hätzeg, Götzenberg, Präsbe, Porcest, Kronstadt, Tömös-Pass, Bükszád, Oláhfalú, Marosgebirge, Borszék (Bielz); Schuler-Gebirge, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Detunata (Mallász).

ambiguus Payk. Gross-Scheuern, Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Borszék (Bielz); Rotenturm, Intra-Gald, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

metallicus Dej. In den höheren Gebirgen.

mollis Marsh. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

melanocephalus L. Im ganzen Gebiete verbreitet.

var. **alpinus** Dej. Petrozsény, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Präsbe (Ormay).

var. **noricus** Dan. Bucsecs (c. a.).

micropterus Duft. Surul, Zibinsgebirge, Steffeste, Bucsecs (Bielz); Paringul, Retjezat, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Nagygyémás, Pietrosul (Kelemengeb., Deubel).

56. *Dolichus Schall*.

halensis Schall. Déva, Kasanest, Vácza (Bad), Piski, Hermannstadt, Neulorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

57. *Synuchus*.

nivalis Panz. Retjezat, Schiellal, Déva, Götzenberg, Surul, Bükszád, Gyalu (Hidegszamos, Bielz); Schässburg, Borszék, Csukás (c. a.); Bistra, Kerzer Gebirge (Ormay); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

58. *Olisthopus Dejean*.

Sturmi Duft. Mühlbach (Rekita), Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

rotundatus Duft. Déva, Hermannstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg (c. a.).

59. *Agonum Bonelli*.

(Anchomenus.)

ruficorne Goeze. An den Ufern süßes Gewässer und an feuchten Stellen durch das ganze Gebiet.

(Anchus.)

obscurum Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen, Bánffy-Hunyad, Záh (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Platynus.)

scrobiculatum F. Götzenberg, Zood, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz); Malomváz (c. a.).

banaticum Friv. Retjezat, Zenoga-See, Vale Valeriaska (c. a.).

glaciale Reitter. Negoi, Kerzer Gebirge, Vister-Tal, Fogarascher, Kronstädter, Schuler-Gebirge, Piatra mare (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a.).

(Limodromus.)

assimile Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge in Wäldern.

(Batenus.)

livens Gyllh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(Agonum s. str.)

quadripunctatum Dej. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

impressum Panz. Schanta (Ormay)

Schässburg als Fundort des A. impressum ist zu streichen.

sempunctatum L. Hätzeg, Retjezat, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Bucsecs, Hosszufalu, Tartlau, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, Marosgebirge (Bielz); Szurdok-Pass, Annen-See, Borszék, Nussbach, Frecker Geb. (Serbota), Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

viridicupreum Goeze. Honigberg (Altufér, Deubel).

var. **austriacum** F. Präsbe, Girelsau, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Klausenburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Honigberg (Altufér, Deubel).

marginatum L. Hätzeg, Salzburg, Rotenturm, Hammersdorf, Szombal, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

Mülleri Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland.

a. **tibiale** Heer. Dees, Naszól, Klausenburg (c. a.); Balánbánya (Deubel).

a. **amethystinum** n. a. Paringulgebirge (c. a.).

A. Mülleri a. amethystinum: O'ersie ganz blaugrün gefärbt bis auf den schmal bronzefarbenen Seitenrand des Halsschildes und den breit bronzefarbenen Seitenrand der Flügeldecken.

gracilipes Duft. Petrozsény (Paringul, Bielz).

Ist aus der Reihe der bei Schässburg bis jetzt aufgefundenen Käfer zu streichen.

versutum Gyll. Gross-Scheuern, Marpod, Búkszád (Bielz); Götzenberg (Ormay); Honigberg (Altufcr, Deubcl).

viduum Panz. Retjezat, Schciltal, Neudorf b. H., Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Annon See, Schassburg, Oláhfaln, Marosgebirge (Bielz); Paringul, Klausenburg, Dees, Szurduk-Pass (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay).

var. **moestum** Duft. Hermannstadt, Kronstadt, Záh, Gyeke (Bielz); Retjezat, Paringul (c. a.).

m. **emarginatum** Gyll. Klausenburg (c. a.). (Euophylus.)

antennarium Duft. Retjezat, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Hammersdorf, Rotenturm (Ormay).

Ormay führt auch *A. scitulum* Dej. von Hermannstadt und Baumgarten an, was wahrscheinlich auf Irrtum beruht, da die Art der westeuropäischen Fauna angehört.

micans Nicol. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Ujszékely (Kokel), Dees (c. a.); Honigberg (Deubcl).

fuliginosum Panz. Gross-Scheuern (Bielz); Retjezat, Klausenburg (c. a.).

pioeum L. Gross-Scheuern (Bielz).

gracile Gyll. Kronstadt (Gesprenz, Deubcl, Méhely).

Thoreyi Dej. Záh (Bielz).

var. **puellum** Dej. Gross-Scheuern (Bielz). (Idiochroma, Clibanarius.)

dorsalis Pontopp. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge.

Lebiinae.

60. *Lebia Latreille.*

(Lamprias.)

cyanocephala L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Predeal, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Puj (Hätzeg), Malomváz, Baassen, Schassburg, Rodnagcbirge (c. a.); Salzburg, Hammersdorf, Rotenturm, Stolzenburg (Ormay).

chlorocephala Hoffm. Wie der vorige verbreitet.

(*Lebia* s. str.)

crux minor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

trimaculata Vill. Déva, Klausenburg (Bielz); Felső-Orbó (Ormay).

marginata Geoffr. Déva, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz (Altufcr auf Weidengebüsch), Schässburg (Kokel, c. a.); Rosenau (auf Weide, Deubcl).

humeralis Dej. S.-Regen (Bielz); Schässburg (Scherkes, Gr.-Alischer Reg., c. a.).

scapularis Geoffr. (nec. Fourcr.). Mediasch (Bielz).

61. *Llonychus Wissmann.*

quadrillum Duft. Rotenturm, S.-Regen, Dees (Bielz); Petrosény, Nagyenyed (c. a.); Altufcr (Deubcl).

var. **major** Mill. Siebenbürgen (Bielz).

62. *Metabletus Schmidt-Goebel.*

obscoreguttatus Duft. Hermannstadt, Neudorf b. H., Birtbalm, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (c. a.).

pallipes Dej. Hätzeg, Déva, Hermannstadt, Oláhfaln, Gyeke (Bielz).

truncatellus L. Hätzeg, Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Zalatna, Reys, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubcl).

63. *Microlestes Schmidt-Goebel.*

(*Blechnus* Motsch.)

minutus Goeze. (glabratus Duft.). Hätzeg, Schciltal, Dusch, Kerzer Gebirge, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubcl, Méhely).

maurus Sturm. Schässburg, Tordlaer Schlucht, Hätzeg (c. a.); Gyeke, Záh, Vururasa (Méhely); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubcl).

64. *Dromius Bonelli.*

longiceps Dej. Hermannstadt, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg (Bielz).

linearis Oliv. Hätzeg, Mediasch, Birtbalm, Schässburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Rotenturm, Borszék, Rodnagcb. (c. a.); Klausenburg (Müller).

agilis F. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Rotenturm, Kerzer, Arpascher-Gebirge (Bielz); Borszék, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubcl); Bistritz (Müller).

longulus Friv. Schässburg. (In morschem Zwetschken- und Lindenholz, auf Ahorn unter Moos, c. a.).

fenestratus F. Kronstadt, Csukás, Nagy-hagymás (Deubcl).

quadrinotatus Panz. Fogarasch (Bielz); Rotenturm, S.-Regen (Bielz); Baassen, Schässburg, Bacsacs (c. a.); Kronstadt (Deubcl); Hermannstadt (Ormay).

quadrinotatus Panz. Fogarasch (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Ormay).

quadrisingatus Dej. Schässburg (Siechhofberg unter der Rinde eines Apfelbaumes und unter Moos, c. a.); Hermannstadt (unter Weidenrinde, Ormay).

nigriventris Thoms. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hammersdorf, Kleinpold (Ormay).

65. *Demetrias Bonelli*.

(Aetophorus.)

imperialis Germ. Kronstadt, Klausenburg, Záh (Bielz).

(Demetrias s. str.)

monostigma Sam. Hátzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (Müller).*atricapillus* L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Hosszufalu (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Ponor bei Puj (Hátzeg, c. a.); Hátzeg, Rosenau (Deubel); Klausenburg (Müller).66. *Cymindis Latreille*.

(Cymindis s. str.)

humeralis Geoffr. Schieltal, Rotenturm, Porcest, Reps, Nussbach, Kronstadt, Ojtosz-Pass, Oláhfalú, Csik, Balánbánya, Marosgebirge, Klausenburg (Bielz); Puj (Hátzeg), Előpatak, Rodnagebirge, Schässburg (Fuchsloch im Moos, c. a.); Talmesch, Nagyg (Ormay); Detunata (Mallász).*axillaris* F. Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Hátzeg, Pilis (Nagynyed, c. a.); Klausenburg (Müller).*cingulata* Dej. Déva, Godinest, Mada, Gurariu, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Krizba, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Hargita, Oláhfalú, Keroly (Bielz); Balánbánya, Rotenturm, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Hermannstadt (Ormay).67. *Polystichus Bonelli*.*connexus* Geoffr. Klausenburg (Müller).

Oðacanthinae.

68. *Odacantha Paykull*.*melanura* L. Gross-Scheuern, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Lazaret, c. a.).

Dryptinae.

69. *Drypta Latreille*.*dentata* Rossi. Hátzeg, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm, Klausenburg (c. a.); Keisd, Várhegy (Deubel); S.-Regen (Müller).

Brachyninae.

70. *Brachinus Weber*.*crepitans* L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.*psophia* Serv. Hátzeg, Dobra, Déva, Mediasch, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Szamosujvár (Ormay).*immaculicornis* Dej. Dobra, Déva, Mediasch (Bielz).*explodens* Duft. Hátzeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Katona (Mezőség, Bielz).var. *strepens* Fisch. Klausenburg, Karlsburg, Schässburg (c. a.).var. *glabratus* Dej. Hátzeg, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel).71. *Aptnus Bonelli*.*bombarda* Illig. Klausenburg (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

III. Haliplidae.

72. *Haliplus Latreille*.*obliquus* F. (amoenus Oliv.) Hermannstadt, Neudorf b. H. (Bielz); Klausenburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).*variegatus* Sturm. Mezőség, Gyeke (Bielz).*fulvus* F. Hermannstadt, Sibó, Schässburg (Bielz); Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel, Gespreng).*flavicollis* Sturm. (impressus Er.?). Hátzeg, Neudorf b. H. (Bielz); Kronstadt (Deubel).*laminatus* Schall. (cinereus Aubé). Schässburg (Bielz); Lotriona (Rotenturm), Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).*ruficollis* Degeer. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Klausenburg, Schässburg, Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel); Maaren (rechtes Altufer, Ormay).var. *Heydeni* Wehncke. Schässburg (c. a.).*fulvicollis* Er. Schässburg, Mezőség (Záh, Gyeke, Bielz); Baassen (c. a.).*fluviatilis* Aubé. Neudorf b. H., Zood (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.).*lineatocollis* Marsh. Lotriona (Rotenturm, c. a.).73. *Cnemidotus Illig*.*impressus* Panz. (caesus Duft.) Hermannstadt, Poplaka b. H., Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Maaren (Altufer, Ormay).

der Flügeldecken, linienförmig auslaufende Spitze der Seitenflügel des Metathorax, tiefere und entferntere Punktierung und grösseren Glanz der Unterseite, durch die Färbung der Flügeldecken und durch gleiche Klauen der Vordertarsen des Männchens unterscheidet. Die Flügeldecken sind dunkelbraun, ein ziemlich breiter, gerader, an der Naht nicht nach hinten erweiterter Basalfleck, der die Naht nicht erreicht, aber mit dem vorne breit, hinten schmal und verwachsen gelben Seitenrande zusammenhängt, zwei Flecken auf der hintern Hälfte neben dem Seitenrande, von denen der vordere sich linienförmig nach hinten verlängert, der hintere punktförmig ist, wenig scharf abgegrenzt gelb. Auf dem Prosternum ist ein Höckerchen nicht bemerkbar, wohl aber eine halbkreisförmige, nach vorn offene, erhabene Linie, die Spitze des Hinterbrustflügels ist sehr kurz, schmal, linienförmig, während sie bei *H. palustris* ein schmales, aber doch deutliches Dreieck bildet. Die Klauen der Vordertarsen sind bei beiden Exemplaren gleich.

Ich habe die Art verglichen mit zahlreichen *H. palustris* aus Siebenbürgen, Norwegen und Böhmen, auch mit *H. marginatus* aus Steiermark, von dem er sich durch schmalere Gestalt, weniger feine und dichte Punktierung der Flügeldecken und deutlich aufgebogenen Seitenrand der Flügeldecken unterscheidet, während er ihm in Färbung und Glanz sehr ähnlich ist.

tristis Payk. Olálfalu, Nussbach (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely).

elongatulus Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz); Nagyenyed (Ormay).

marginatus Duft. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

planus F. Hermannstadt, Balánbánya, Záh (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Halvelagen b. Sch., Klausenburg, Előpatak (c. a.); Honigberg (Deubel); Maaren (Alt, Ormay); S.-Regen (Müller).

pubescens Gyll. Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Deubel).

morio Heer. (nivalis Heer.). Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

discretus Fairm. Bükszád, Schässburg. (In Tümpeln, c. a.).

nigrita F. Balánbánya, Torda (Bielz); Borszék, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

melanarius Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz); Paringulgebirge (c. a.).

ferrugineus Steph. Michelsberg, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

Noterinae.

80. *Noterus Clairville.*

crassicornis Müll. Hermannstadt, Unterk., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Klausenburg, Agostonfalva, Halvelagen bei Sch. (c. a.).

clavicornis Deg. Hätzeg, Hermannstadt, Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Maaren (Alt), Kakova (Ormay).

Laccophilinae.

81. *Laccophilus.*

variegatus Sturm. Dobra (Lapusnyak), Klausenburg (Bielz).

obscurus Panz. Fogarasch (Bielz); Baassen, Klausenburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); S.-Regen (Müller).

virescens Brahm (hyalinus Degeer). Hermannstadt, Thalheim, Nussbach, Előpatak, Hévíz, Mediasch, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Maaren (Alt), Kakova, Szamosujvár (Ormay).

Colymbetinae.

82. *Agabus Linné.*

(Gaurodytes.)

guttatus Payk. Gurariu, Götzenberg, Zood, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Törzburger Pass, Balánbánya, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Bistra, Malomviz (c. a.); Gyógy (Ormay).

biguttatus Oliv. Malomviz (c. a.).

var. **nitidus** F. (fontinalis Steph.). Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Balánbánya (Bielz).

bipustulatus L. In stehendem Süsswasser durch das ganze Gebiet, auch im Gebirge (Buteanu Lakuz und Frecker Gebirge Serbota, c. a.).

regalis Petri. Kerzer Gebirge (Buleasee), Borszék (Közhegy, c. a.).

Ormay führt *A. Solieri* autorum = *A. regalis* Petri auch vom Buteanu (Lakuz-Tümpel) an; ich habe in diesem nur *A. bipustulatus* L. in grosser Zahl gesammelt. Die Vereinigung unseres *A. regalis* mit *A. Solieri* v. Kiesenwetter Seidlitz vom Berge Kern in Illyrien, wie sie Dr. Holdhaus (Abh. K. k. Z. b. Gesellschaft, Wien, VI. 1) ohne weitere Begründung annimmt, kann ich nicht akzeptieren: Nach Kiesenwetter sind die Tiere aus Illyrien sehr klein und weichen im übrigen vom echten *A. Solieri* nicht ab. *A. regalis* aber besitzt die Grösse der norwegischen Tiere (9–10,5 mm.); dazu kommt noch ein Unterschied in der Skulptur der Oberseite, den ich in meiner Beschreibung nicht anführte: die eingeritzten Linien der Oberfläche bilden wesentlich breitere Maschen; der Verlauf der eingeritzten Linien wird dadurch vollkommen unregelmässig und die von ihnen eingeschlossenen Felder sind mehr weniger breit unregelmässig-polyedrisch, während bei *A. Solieri* die Linien unter einander mehr-weniger parallel verlaufen, an dem Vorder- und Hinterende zugespitzt sind und dadurch die längs-rissige, der des *A. bipustulatus* sich nähernde Skulptur erzeugen.

paludosus F. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Honigberg (Tümpel, Deubel).

uliginosus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz).

congener Payk. Mediasch, Bozauer Pass (Bistritz, Forduló, Bielz).

affinis Payk. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.).

(Scytodytes.)

Sturmi Gyll. Hermannstadt, Szombat (Bielz).
Eriglenus.)**undulatus** Schrk. (Hermann Bedel) Hermannstadt, Götzenberg, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalva, Csáki Gorbó (Salomon, Bielz); Klausenburg (c. a.).**labialis** Brahm (femorialis Payk.) Schelltal, Hammersdorf (Bielz); Honigberg (Tümpel am Altfluss, Deubel).

83. *Platambus Thomson.*

maculatus L. (inaequalis Panz.). Zood. Szombat, Fogarasch, Nussbach, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Malomviz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Ober-Kerz (Ormay); Hátszeg, Zernest, Vargyasbach (Deubel).

84. *Copelatus Erichs.*

ruficollis Schall. Hermannstadt, S.-Regen, Mediasch (Bielz); Maaren, Szamosujvár (Ormay); Honigberg (Deubel).

85. *Ilybius Erichs.*

fenestratus F. Hermannstadt, Schässburg, S. Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay); Honigberg (Deubel).**fuliginosus** F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Nussbach, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Klausenburg, Kronstadt (c. a.); Honigberg (Deubel).**subaeneus** Er. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg, Nussbach (c. a.).**ater** Degeer. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).**obscurus** Marsh. S.-Regen (Bielz)**guttiger** Gyllh. Prásbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

86. *Rhantus Lacordaire.*

Grapei Gyllh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Méhely).**punctatus** Geoffr. Hermannstadt, Neudorf b. H., Thalheim, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Ágostonfalva (c. a.).**notatus** F. (suturalis Lacord.). Hermannstadt, Girelsau, S.-Regen, Záh (Bielz); Klausenburg (c. a.).**adpersus** F. (bistriatus Bedel nec Bergström). Hermannstadt, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg, Brenndorf (Altflussufer in Tümpeln, Deubel).

Bielz führt Rh. bistriatus Bergstr. = adpersus F. an. Die Synonymie seines Rh. bistriatus mit Rh. adpersus F. beweist, dass seine Art der Rh. adpersus F. ist; demnach

ist Rh. bistriatus Bergström vor der Hand aus unserem Verzeichnis zu streichen.

exoletus Forst. Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Deubel).

87. *Colymbetes Clairville.*

fuscus L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Karlsburg, Baassen, Klausenburg (c. a.); Rotenturm (Ormay).

Dytiscinae.

88. *Hydaticus Leach.*

seminiger Deg. Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Kronstadt, Klausenburg (c. a.); Maaren (Altfer, Ormay).**transversalis** Pontopp. Mühlbach, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Nagyenyed, Mirásló, Kakova (Ormay); Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).**stagnalis** F. Burzenland (Brenndorf, Altfluss in Tümpeln, Deubel, c. a.).

89. *Graphoderes Thomson.*

austriacus Sturm. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz).**bilineatus** Deg. Brenndorf (Altfluss in Tümpeln, Deubel).**cinereus** L. Hermannstadt, Nussbach, Mediasch, Gyeke (Bielz); Nieder-Eidisch (c. a.); Maaren (Altfer), Salzburg, Szamosujvár (Ormay); Brenndorf, Honigberg (Altfer in Tümpeln, Deubel).**zonatus** Hoppe. Kronstadt (Gespreng, Méhely).

90. *Acilius Leach.*

sulcatus L. Hermannstadt, Salzburg, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Baassen (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

91. *Dytiscus L.*

marginalis L. Hermannstadt, Unter-Kerz, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszúfalva, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Pöplaka (Ormay).var. ♀ **conformis** Kunze. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).**dimidiatus** Bergstr. Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Honigberg (Deubel).**circumcinctus** Abr. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).**circumflexus** F. Hermannstadt, Girelsau (Bielz); Schässburg (c. a.); Altfluss (Deubel); Salzburg (Ormay).

92. *Cybister Curtis.*

laferimarginalis Deg. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (? Deubel), Mediasch, Záb, Gyeke (Bielz); Salzburg, Nagyenyed, Tinód (Unterweissenburger Komitat), Marosújvár, Miriszló, Szamosújvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

V. *Gyrinidae.*93. *Gyrinus Geoffroy.*

bicolor Payk. Hermannstadt, Mezőség (Záb, Bielz); Szamosújvár (Ormay).

colymbus Er. Halvelagen bei Sch. (c. a.).
distinctus Aub. Rotenturm (Lauterbach), Bükszád (c. a.).

var. *hungaricus* Seidl. Rotenturm, Bükszád (c. a.).

natator L. Schässburg, Héviz, Bükszád (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Da Bielz *G. colymbus* Er. und *distinctus* Aub. nicht bekannt waren, führe ich als Fundorte des *G. natator* L. nur jene an, die mir bekannt geworden sind.

94. *Orectochilus Lacord.*

villosus Müll. Fogarasch, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Vargyasbach (Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

VI. *Rhysodidae.*95. *Rhysodes Dalm.*

(*Omoglymnus*.)

Germari Ganglb. Alsó-Rákos (Tepe, Deubel).

(*Rhysodes* s. str.)

sulcatus F. (exaratus Dalm.). Kronstadt (Noa, Fichte, Mähely); Nussbach (Eiche b. Ameisen, Deubel).

Polyphaga.

Staphylinoiidea.

VII. *Staphylinidae.*

Piestinae.

Piestini.

96. *Siagonium Kirby.*

quadricorne Kirby. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea-See), Baassen, Schässburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

humerales Germ. Schässburg (c. a.).

97. *Thoracophorus Motsch.*

corticinus Motsch. Hermannstadt (Bielz); Baassen (Alter Nussbaum), Schässburg (Eichenholz, c. a.); Kronstadt (Götzentempel oberhalb der Flintschhöhle, alte Buche bei *Lasius brunneus*).

Oxytelinae.

Micropeplini.

98. *Micropeplus Latreille.*

laevipennis Epp. Rodnagebirge, Nagybagymás, Bucsecs, Schuler-Gebirge (aus Grasbüscheln gesiebt, Deubel); Schässburg (Hausgarten, wahrscheinlich aus Gesiebel vom Kerzer Gebirge stammend, 20. Februar 1910, c. a.).

staphylinoides Marsh. Neudorf b. H. (Bielz).

fulvus Er. Malomviz (Lunka negru, Bachufer unter Moos, c. a.).

porcatus F. S.-Regen (Bielz); Előpatak (in einem Tümpel, c. a.); Kronstadt (gesiebt und gekötschert, Deubel); S.-Regen (Müller).

Phloeocharini.

99. *Phloeocharis Mannerheim.*

subtilissima Mannh. Durch das ganze Gebiet verbreitet unter Baumrinde und Laub.

100. *Olistherus Heer.*

substriatus Gyllh. Negoi, Fogarascher Geb. (Bielz); Bucsecs, Bistra (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel); Porkovicza (Zoodtal, Ormay).

Proteinini.

101. *Metopsia Wollaston.*

(*Phoeobium* Er.)

clypeatum Müll. Schässburg (auf Pilzen, c. a.); Gyógy (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

102. *Megarathrus Stephens.*

depressus Payk. Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Schanta (Ormay).

affinis Müll. (sinuatocollis Kr.). Hermannstadt (Bielz); Koronjis (Rodnagebirge, c. a.); Bodzaer Gebirge, Zernest (Deubel).

denticollis Beck. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Bistra (c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

sinuatocollis Lac. Rodnagebirge, Schulergebirge, Bistra, Retjezat (c. a.).

hemipterus Illig. Hermannstadt (J. W.), Rotenturm (Bielz); Schässburg, Baassen, Karlshurg (Ompolytza, c. a.); Tusnád (Deubel); Bistritz (Müller).

103. *Protelnus Latreille*.

ovalis Steph. Kronstadt (Zinne), Buesecs (subalpin, Deubel).

brachypterus F. Mediasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Balánbánya (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Rosenau (Deubel).

limbatus Makl.

var. **oblongus** Petri. Schässburg, Ober-Kerz, Rotenturm, Búdös (c. a.).

macropterus Gyllh. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Schanta, Prásbe (Ormay); Bisfritz (Müller).

atomarius Er. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz).

Omalini.

104. *Anthobium Steph.*

(*Anthobium* s. str.)

anale Er. Zibinsgebirge (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

alpinum Heer. (montanum Er.). Resinar, Kerzer Gebirge (Bielz), Schuler-Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Schässburg, Kronstadt, Baassen, Borszék (c. a.).

palligerum Kiesenw. Alsó-Bákös, Schässburg, Oláhfalú (c. a.); Kronstadt (Deubel); Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).

longipenne Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú (Bielz), Frecker Gebirge (Serbota), Schulergebirge, Unter-Kerz, Retjezat, Bistra, Balánbánya (c. a.); Götzenberg (Ormay); Detunata (Mallász).

(*Eusphalerum*).

ophtalmicus Payk. Zibinsgebirge, Säch.-Regen (Bielz); Kerzer Gebirge, Rodnagebirge (c. a.); Buesecs (subalpin, Deubel).

sorbi Gyllh. Michelsberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Bisfritz (Müller).

Marshami Fauv. Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay).

torquatium Marsh. Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay).

Das Vorkommen dieser dem Westen Europas angehörigen Arten, *A. torquatium* Marsh. und *obsoletum* Er., bedarf jedenfalls weiterer Festigung.

limbatum Er. Kronstadt (Bielz); Schanta, Resinar (Ormay), Schuler-Gebirge, Rosenau (Deubel).

abdominale Grav. Fogarasch, Kronstadt? (Bielz).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

primulae Steph. Girelsau, Zood, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Schässburg, Schuler-Gebirge (c. a.); Götzenberg (Ormay).

obsoletum Er. Zibinsgebirge (Bielz).

minutum F. Zibinsgebirge, Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

florale Panz. Götzenberg, Fogarasch (Bielz); Zibinsgebirge (Klamm), Retjezat, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

105. *Acrulia Thomson*.

inflata Gyll. In unsern Gebirgen verbreitet.

106. *Acrolecha Thomson*.

striata Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (einigemale im Flug gefangen, dann aus Holzabfällen, Rinden etc. gesiebt, am 20. Februar siebte ich eine grössere Anzahl aus verwesenden Pflanzenstoffen im Hausgarten). Puj (Hátszeg, c. a.).

107. *Phyllodrepa Thomson*.

(*Phyllodrepa* s. str.)

floralis Payk. (*rufipes* Fauv. ex parte, *maculicornis* Heer.) Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Frecker Gebirge, S.-Regen (Bielz), Schulergebirge, Balánbánya, Előpatak, Szováta, Schässburg (Kokel, Geniste, c. a.); Kronstadt (Deubel); Schanta (Ormay).

var. **nigra** Grav. Zibinsgebirge (Bielz).

salicis Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

melanocephala F. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und in altem Eichenholz, in Nestern der *Lasius fuliginosus* und *brunneus*, c. a.); Rosenau (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

(*Dropephila*.)

ioptera Steph. Szurdok-Pass (unter Rotbuchenrinde, Mai 1910, c. a.).

seabriuseula Kr. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge (Deubel).

linearis Zetterst. Bistra (wahrscheinlich unter Tannenrinde, c. a.).

(*Hapalaraea*.)

pygmaea Gyll. Schässburg (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.; Csukás, Rotenturm (Deubel)).

(*Analcera*.)

distincticornis Baudi. Schässburg (zwei Exemplare, das eine gekötchert, das andere unter der Rinde eines alten Eichenstumpfes, c. a.).

Die Art ist zwar nur aus dem südlichen Gallien und Piemont bekannt; da jedoch die Beschreibung genau auf die vorliegenden Exemplare passt, dürfte kaum eine Verwechslung vorliegen. Dr. Bernhauer sah das eine der beiden Exemplare und bestätigte meine Determination.

108. *Omallum Gravenhorst.*

- rivulare** Payk. Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Rotenturm, Hátzeg (c. a.); Hermannstadt, Michelsberg, Heltau, Zood, Grosspold (Ormay).
- funebre** Fauv. Rodnagelbirge (Hochalpin, aus Grashbüscheln gesiebt, Deubel).
- oxyacanthae** Grav. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagelbirge (Deubel, Ganglbauer); Bucsecs (Deubel).
- caesum** Grav. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Schuler-Gebirge, Malomviz, Torockó, Hátzeg, Rotenturm, Unter-Kerz, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Zood, Schanta, Gyógy (Ormay); S.-Regen (Müller).
- excavatum** Steph. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Unter-Kerz, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Csukás, Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay); Rodnagelbirge (Ganglbauer).
- validum** Kr. Bucsecs (alpin, Deubel).
- ferrugineum** Kr. Rotenturm, Bistra (c. a.).
- Lokayi** Fleischer. Bucsecs (Deubel, c. a.: in einem Jahre aus trockenem Reisig bei der Schutzhütte in grosser Anzahl, später nicht mehr gesammelt).

109. *Phloeonomus Heer.*

(Xylostiba.)

- monilicornis** Gyll. Kronstadt (Deubel); Rodnagelbirge (Ganglbauer, unter der losen, feuchten Rinde von Bergahorn).

(Phloeostiba.)

- planus** Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Ratosnya (unter Erlenrinde), Bistra, Schässburg (am ausfliessenden Saft und unter Buchenrinde oft in grosser Zahl, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

- japonicus** Zett. Bistra (1 Exemplar, c. a.).

(Phloeonomus s. str.)

- pusillus** Grav. Hermannstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt, Zernest (c. a.).

- minus** Er. Schässburg (unter Eichenrinde oder aus Eichenholz, 11. April, c. a.).

110. *Xylodromus Heer.*

- affinis** Gerh. (cephalotes Epp.). Oláhfalú (Bad Honrod, c. a.).

- concinus** Marsh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Breite in altem Eichenholz, c. a.); Hátzeg (Deubel).

- depressus** Grav. (deplanatus Gyllh.) Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Reys, Oláhfalú, Schässburg (Lindenholz, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Ratosnya (Müller).

- testaceus** Er. Hermannstadt (Bielz); Hátzeg (c. a.); Wolkendorf bei Kr. (Deubel).

111. *Philorinum Kraatz.*

- sordidum** Steph.

var. **Hopffgarteni** Epp. Siebenbürgen (Eppelsheim-Hopfgarten).

112. *Phyllodrepoidea Ganglbauer.*

- crenata** Grav. Kerzer Gebirge (Bielz).

113. *Lathrimaeum Erichson.*

- melanocephalum** Ill. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (einmal an Rinderknochen, c. a.); Schuler-Gebirge, Bucsecs (Deubel, subalpin); Präsbe (Ormay).

- atrocephalum** Gyll. Kronstadt (Bielz); Schässburg (unter Laub, sehr häufig, c. a.); Hermannstadt, Heltau, Gyógy (Ormay).

- unicolor** Marsh. Zibinsgebirge (Bielz).

L. **unicolor** Marsh., dem westlichen Europa angehörig, dürfte irrthümlich in unser Verzeichnis gekommen sein.

114. *Olophrum Erichs.*

- boreale** Payk. Schässburg (einmal gesammelt, c. a.).

- assimile** Payk. Kronstadt (Bielz); Baassen, Schässburg (Kokelufer unter Blättern in Weidengebüsch, c. a.); Hermannstadt, Szamosújvár (Ormay).

- alpinum** Heer. Hátzeg-Gebirge (subalpin, Deubel).

115. *Arpedium Erichs.*

- quadrum** Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Giespreng, Deubel).

116. *Acidota Mannerh.*

- crenata** F. Ober-Sebes, Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Schuler-Gebirge, Nagybagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

- cruentata** Mannh. Schässburg (7. November, Atelshill, Kokelufer im Geniste, c. a.).

117. *Amphichroum Kraatz.*

- canaliculatum** Erichs. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Malomviz, Szováta (c. a.); Bucsecs, Schuler-Gebirge, Nagybagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

- hirtellum** Heer. Kronstadt (Ritivoi. 1 ♂, c. a.).

118. *Lesteva Latreille.*

- pubescens** Mannh. Rotenturm, Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Csukás (c. a.); Bucsecs (Deubel); Hermannstadt, Heltau, Vidra (Erzgebirge), Remete (Nagyenyed, Ormay).

- longelytrata** Goeze. Bieler F., maura Er.)
Durch das ganze Berg- und Gebirgs-
land an Flussufern.
punctata Er. Zibinsgebirge (Bielz); Ba-
lúnbánya (c. a.); Präsbe (Ormay).

119. *Geodromicus Redtenb.*

- plagiatus** F. Baassen (Bielz); Vargyas in
der Nähe der Almascher Höhle,
Deubel)
a **nigrita** Müll. Unter-Kerz, Tordaer
Schlucht (c. a.).
suturalis a. **concolor** Luzé. Grosses Exem-
plar). Schässburg (Kokelufer, c. a.).
puncticollis Wse. (corlicollis Petri). Schäss-
burg (Kokelufer, einmal unter Kukurutz-
stroh im Frühjahr gesammelt)

120. *Anthophagus Gravenh.*

Die Arten leben auf Blüten und Nadelholz, doch
werden einige auch unter Steinen auf Alpenwiesen
gesammelt.

(*Anthophagus* l. sp.)

- bicornis** Block. Präsbe, Kerzer Gebirge,
Marosgebirge (Bielz); Kronstadt, Zern-
est (Deubel); Retjezat, Bucsecs (c.
a.); Schanta (Ormay); Detunata (Mal-
lász).
alpinus Payk. Szurul, Zibins-, Kerzer-,
Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodna-
gebirge (c. a.); Detunata (Mallász).
sudeticus Kiesenw. Zibinsgebirge, Negoi,
Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat, Pa-
ringul, Frecker Gebirge (Serbota, c.
a.); Bucsecs (Deubel).
alpestris Heer. Surul, Zibinsgebirge, Präsbe,
Fogarasch, Fogarascher, Kerzer Geb.
(Bielz); Retjezat, Paringul, Bistra, Bor-
szék, Rodnagebirge, Bucsecs, Schuler-
Gebirge, Schässburg (c. a.); Detunata
(Mallász).
abbreviatus F. Kronstadt (Bielz); Csukás,
Bülös, Schässburg (c. a.); Bistritz,
Schuler-, Fogarascher Gebirge (Deubel).
a. **fascifer** Reitter. Schässburg (c. a.).
melanocephalus Heer. Zibins-, Fogarascher
Gebirge (Bielz).

A. melanocephalus Heer dürfte wohl bei uns
nicht vorkommen; wahrscheinlich liegt hier eine
Verwechslung mit *A. omalinus* Zett. vor, den
Bielz nicht anführt.

- omalinus** Zett. Bucsecs, Schuler-Gebirge
(c. a.); Paringul, Hätzeger Gebirge,
Nagyhagymás (Deubel).

(*Phaganthus*.)

- caraboides** L. Zibinsgebirge, Hosszufalu,
Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf
Weidenblüten, wohl durch das ganze
Gebiet verbreitet).

- praeustus** Müll. Zernest (Plaju foi, Deubel)

121. *Endectus Redtenb.*

- Giraudi** Redtenb. Bucsecs (Alpin und sub-
alpin gesiebt, Deubel).

122. *Coryphlodes Bernhauer.*

- Deubeli** Bernh. Rodnagebirge, Bucsecs (aus
Grasbüscheln gesiebt, Deubel).

123. *Niphetodes Müll.*

Die Arten werden aus Grasbüscheln gesiebt.

(*Niphetodes* s. str.)

- Redtenbacheri** Müll. Rodnagebirge (Koronjis,
c. a.), Kuhlhorn, Deubel).
Spaethi Ganglb. Rodnagebirge (Kuhlhorn, c.
a., Deubel).
Eppelsheimi Ganglb. Rodnagebirge (Kuh-
horn, Koronjis, c. a., Saka, Deubel).
(*Hypsonothrus*.)
Deubeli Ganglb. Rodnagebirge (Kuhlhorn),
Bucsecs (Deubel, c. a.); Kerzer Ge-
birge (Vunelare, c. a.).

Oxytelini.

124. *Syntomulum Curtis.*

- aeneum** Müll. Rotenturm, Bülös, Frecker
Gebirge (c. a.); Rodnagebirge (Deu-
bel).

125. *Deleaster Erichs.*

An Flussufern im Geniste.

- dichrous** Grav. Kronstadt (Bielz). Unter-
Kerz, Schässburg (c. a.); Hermanns-
stadt, Rotenturm (Ormay).
var. **Leachi** Curt. Michelsberg, Zood, Ro-
tenturm, Ober-Schebesch, Porcseszt,
Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu
(Bielz); Unter-Kerz, Schässburg, Alsó-
Rákos (c. a.).

126. *Coprophilus Latreille.*

- striatulus** F. Gross-Schenern, Gross-Schenk,
S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel);
Schässburg (c. a.).

127. *Acrognathus Er.*

- mandibularis** Gyll. Honigberg (Altufer, Deu-
bel).

128. *Planeustomus Duval.*

- Kahri** Kraatz. Siebenbürgen. (Lebt auf
sumpfigen Wiesen, gräbt in der Erde,
schwärmt gegen Sonnenuntergang).
palpalis Er. Honigberg (Altufer, Deubel).

129. *Ancyrophorus Kraatz.*

- longipennis** Fairm. Bucsecs (Subalpin, Deu-
bel).
omalinus Er. Csukás (Bachufer unter
Steinen, c. a.).

130. *Thinobius Kiesenw.*

(*Thinophilus*.)

- linearis** Kr. Honigberg (Altufer, Deubel).

131. *Trogophloeus Mannerh.*

(*Thinodromus*.)

dilatatus Er. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (c. a.); Rodnagelbirge (Valea vinului), Alsó-Rákos (Deubel).

hirticollis Rey. Rotenturm (Altufcr unter Steinen, c. a.); Honigberg, Alsó-Rákos (Deubel).

(*Carpalimus*.)

arcuatus Steph. Gross-Schenk (Bielz); Unter-Kerz, Alsó-Rákos (Altufcr, c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

(*Trogophloeus* s. str.)

bilineatus Steph. An den Ufern süßcr Gewässer durch das ganze Berg- und Hügelland.

rivularis Motsch. Schässburg (c. a.); Bistritz, Honigberg (Deubel).

(*Boopinus*.)

memnonius Er. Honigberg (Altufcr, Deubel).
politus Kiesenw. Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

(*Taeniosoma*.)

elongatus Er. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Kokclufcr, häufig, c. a.); Talmesch (Ormay).

impressus Lec. Baroth (Méhely); Honigberg (Altufcr, Deubel).

corticinus Grav. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Talmesch (Ormay).

punctatellus Er. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.).

pusillus. Schässburg (Fuchsloch, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

subtilis Er. Schässburg (Kokclufcr, c. a.).

(*Troginus*.)

exiguus Er. Karlsburg (Bielz); Schässburg (Kokclufcr, c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

132. *Haploderus Stephens.*

caelatus Grav. Hátszeg, Götzenberg, Präshe, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Bistritz (Müller).

caesus Er. Neudorf b. H. (Bielz); Karlsburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

133. *Oxytelus Gravenh.*

Die Arten leben unter faulenden Pflanzen- und Tierstoffen, oft in Exkrementen.

(*Oxytelus* s. str.)

rugosus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

opacus Kr. Fogarasch (Bielz).

rugifrons Hlochh. Hátszeg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Oláhfalú (c. a.).

insecatus Grav. Hermannstadt, Holzmengen, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (3. April, auf Kohlblättern),

Marosujvár (c. a.); Schuler-Gebirge, Altufcr (Deubel).

fulvipes Er. Rotenturm (unter Blättern, c. a.).

(*Tanyraerus*.)

laqueatus Marsh. (uteipennis Er.). Salzburg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rodnagelbirge, Borszék, Bucsecs (c. a.); Paringul, Schulergebirge (Deubel).

(*Caccoporus*.)

piceus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(*Epomotylus*.)

sculptus Grav. Kronstadt, Schässburg, Záh (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Déva (c. a.).

(*Anotylus*.)

inustus Grav. Schässburg (Fuchsloch am ausfliessenden Saftc einer Buche, Witeberg, c. a.).

sculpturatus Grav. Kronstadt, Rotenturm, Zalatna (Präszaka), Schässburg (c. a.).

politus Er. Schässburg (Fuchsloch in 1 Exemplar, c. a.).

nitidulus Grav. Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Schässburg, Torockó, Naszól, Rodnagelbirge (c. a.).

intricatus Er. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

complanatus Er. Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

clypeonitens Pand. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Zalatna (Präszaka), Schässburg, Karlsburg (c. a.).

tetracarinatus Block. Hermannstadt, Holzmengen, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Schässburg, Oláhfalú, Gyeke (Bielz); Gyógy (Ormay); Paringul (Deubel).

hamatus Fairm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenauer Geb., Rodnagelbirge (Deubel).

134. *Platystethus Mannh.*

Die Arten dieser Gattung leben ähnlich wie die der vorigen.

(*Ptyctocraerus*.)

arenarius Geoffr. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

laevis Kiesenw. Rodnagelbirge. (Oberhalb der Baumregion aus Grasbüscheln gesiebt, Deubel).

(*Platystethus* s. str.)

cornutus Grav. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **alutaceus** Thoms. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

capito Heer. Karlsburg, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Schulergebirge, Honigberg (Altufcr, Deubel).

nodifrons Sahlb. Rodnagelbirge (Deubel).

nitens Sahlb. Unter-Kerz, Schässburg, Torda, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

135. *Bledius Mannh.*

Die Arten dieser Gattung graben Gänge in der Erde, besonders in der Nähe der Gewässer.

(*Bledius* s. str.)

furcatus Ol. (aurus Germ.) Déva (Bielz).

tricornis Hbst. Salzburg, Schässburg (Bielz); Torda, Marosujvár, Baassen (c. a.); Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nieder-Eulisch (Müller).

unicornis Germ. Déva, Salzburg (Bielz); Torda, Baassen, Szováta (c. a.)

(*Elbidus*.)

bicornis Germ. Salzburg (Bielz); Torda (c. a.)

(*Blediodes*.)

littoralis Heer. Kronstadt, Tartlau (Bielz).

pallipes Grav. Hermannstadt, Sachs.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Altufer (Deubel).

longulus Er. Schässburg (c. a.).

opacus Block. Hermannstadt, Birtihalm, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos (c. a.).

altricapillus Germ. Hätzeg, Schässburg (Kokelufer in feuchten Letten, c. a.).

var. **nanus** Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kulterberg, Waltrand in lehmig-sandiger Erde, c. a.).

fracticornis Payk. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Előpatak (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

procerulus Er. Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel)

crassicollis Luc. Birtihalm (Bielz); Baroth (Méhely)

cubicollis Heer. Hermannstadt, Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).

dissimilis Er. Hermannstadt, Tartlau (Bielz); Karlsburg, Schässburg (Kokelufer, c. a.).

var. **nigricans** Er. Schässburg (c. a.).

errallcus Er. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Schässburg (Kulterberg zusammen mit *B. nanus* Er., c. a.); Kronstadt (Deubel)

(*Hesperophilus*.)

subterraneus Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Altufer (Deubel)

arenarius Payk. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

fossor Heer. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.).

Oxyporini.

Oxyporini.

136. *Oxyporus Fbr.*

Die Arten leben auf Hutpilzen.

rufus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

maxillosus F. Hätzeg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Bistra, Csukás (c. a.).

var. **angularis** Gebl. Csukás (c. a.).

var. **Schönherri** Mannh. Csukás (c. a.).

Steninae.

Stenini.

137. *Stenus Latr.*

(*Stenus* s. str.)

biguttatus L. Im ganzen Berg- und Hügelland an den Ufern der süßen Gewässer.

var. **bipustulatus** Thoms. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay)

bipunctatus Er. Wie der vorige verbreitet, auch am Annen-See bei Tusnád.

longipes Heer. Déva, Zalatna, Héviz, Schässburg, Baassen, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **carinifrons**. Schässburg (Kokel, c. a.)

Stenus longipes var. *carinifrons*.

Die Taster dieser Varietät sind ähnlich gefärbt wie die des *Stenus biguttatus* L., das erste Glied ist ganz, das zweite in der Wurzelhälfte gelb, das dritte an der Wurzel sehr schmal, etwas heller. Die ausgehöhlte Stirne ist kräftig gekielt. Bei einem Weibchen ist der Körper bläulichschwarz ohne Metallschimmer, während ein Männchen aus *Melania* lebhaften Schimmer besonders auf dem Abdomen besitzt. Die Varietät gehört entschieden zu *St. longipes*, da sie den schlanken Körper dieser Art besitzt; auch die gelbrote Makel auf den Flügeldecken stimmt nach Grösse und Lage genau mit der bei *St. longipes* überein, ebenso die Punktierung des Abdomens, welche bis zur Spitze desselben kräftiger und tiefer ist als bei *St. biguttatus*, auf welche diese Varietät nach der Tasterfärbung und Körperform gedeutet werden konnte. Auch die männlichen Geschlechtszeichnungen an den hintern Ventralsegmenten stimmen mit denen des *St. longipes* überein.

guttula Mull. Hätzeg, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Szurdok-Pass, Reys (c. a.).

stigmula Er. Schässburg (c. a.); Brennendorf (Priesterhügel am Altufer, Deubel).

bimaculatus Gyll. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Klausenburg

Juno Payk. Hermannstadt (Bielz). Kronstadt (Giespreng, Deubel)

aler Mannh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

clavicornis Scop. Schässburg, Reys, Nussbach, Kronstadt, Zab (Bielz); Tordaer Schlucht, Petrozsény, Rotenturm, Baassen (c. a.)

providus Er. Kronstadt, Bükszád, Schässburg (Bielz); Baassen, Karlsburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Heltau, Rotenturm, Kleinpold (Ormay).

scrutator Er. Kronstadt, Schässburg, Oláhfalu (Bielz).

Rogeri Kr. Rodnagebirge (Valea vinului). Oláhfalu (c. a.).

silvester Er. Rodna-Gebirge, Tordaer Schlucht, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (Müller).

proditor Er. Gyógy (Bad, Ormay).

asphaltinus Er. Talmesch (Bielz); Schässburg (c. a.).

fossulatus Er. Kronstadt, Bükszád (Bielz); Zalatna, Topánfalva, Schässburg, (Schleifengraben, c. a.).

gracilipes Kr. Kerzer Gebirge, Retjezat (c. a.); Vargyasbach (Deubel).

aterrimus Er. Schässburg (bei Formicaru), Gross-Alisch b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm (Ormay).

alpicola Fauv. Csukás, Bucsecs, Königstein (Deubel) (Nestus.)

ruralis Er. Fogarasch (Bielz); Nussbach, Unter-Kerz, Nagyenyed (c. a.).

buphthalmus Grav. Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz, Unter-Kerz, Alsó-Rákos (Tepe), Schässburg (Kokeluf, c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay); Maros-Gebirge (Müller).

incrassatus Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel); Unter-Kerz (c. a.).

canaliculatus Gyll. Hermannstadt (Bielz).

morio Grav. Fogarasch, Schässburg (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

trivialis Kr. Nagyenyed (c. a.).

melanarius Steph. Kronstadt (Gespreng, Méhely); St. Annen-See (c. a.).

atratus Er. Oláhfalu (Bielz); Nagyenyed (c. a.).

subdepressus Rey. Unter-Kerz (c. a.).

melanopus Marsh. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay).

foraminosus Er. Schässburg (Bielz).

nanus Steph. Schässburg, Rotenturm (c. a.); Nagyhagymás, Schuler-Gebirge, Rodnagebirge (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

circularis Grav. Hätzeg, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Balánbánya, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

vafellus Er. Gross-Scheuern (Bielz); Unter-Kerz (c. a.).

cautus Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Ober-Kerz (c. a.).

fuscipes Grav. Hermannstadt (Bielz); Honigberg, Brenndorf (Altuf, Deubel).

Argus Grav. Honigberg (Altuf, Deubel).

humilis Er. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **phyllobates** Pennecke. Hätzeger Gebirge, Rodnagebirge (Deubel).

carbonarius Gyll. Nussbach (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay). (Tesnus.)

eumerus Kiesenw. Schässburg, Paringul, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

opticus Grav. Hermannstadt (Bielz).

crassus Steph. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Tordaer Schlucht, Unter-Kerz (Klosterweiher, c. a.).

formicetorum Mannh. Schässburg (c. a.).

nigritulus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

brunnipes Steph. Hätzeg, Rodnagebirge (c. a.). (Hypostenus.)

latifrons Er. Mezöség (Záh, Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

tarsalis Ljungh. Petrozsény (c. a.); Hätzeg (Deubel).

similis Hbst. Hätzeg, Neudorf bei H., Schässburg, Reys, Héviz (Bielz); Schuler-Gebirge, Unter-Kerz, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Detunata (Mallász).

solutus Er. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

cicindeloides Schall. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Schuler-Gebirge, Baassen, Marosujvár (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Michelsberg, Talmesch, Rotenturm (Ormay).

fornicatus Steph. Kronstadt (Gespreng, Méhely); Honigberg (Altuf, Deubel). (Hemistenus.)

binotatus Ljungh. Holzmengen, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).

pallitarsis Steph. Holzmengen (Bielz); Brenndorf (Altuf), Kronstadt (Gespreng, Deubel).

picipes Steph. Hätzeg, Schässburg (Bielz).

bifoveolatus Gyll. Kronstadt (Deubel). (Parastenus.)

glacialis Heer. Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs, Paringul, Negoi (Deubel).

fuscicornis Er. Hermannstadt (c. a.).

Die Art wird wohl oft verwechselt werden mit *St. vafellus* Er. und *Argus* Grav., von denen sie leicht unterschieden werden kann durch tiefer gespaltenes viertes Tarsenglied und das gestreckte erste Glied der Hintertarsen, das deutlich länger ist als das Krallenglied.

geniculatus Grav. Hermannstadt (Bielz).

flavipalpis Thoms. Schässburg (c. a.).

transsilvanicus Bernh. Rodnagebirge (Saca, Deubel, c. a.); Bucsecs (c. a.).

palustris Er. Retjezat (Zenoga-See, c. a.); Kronstadt (Deubel). Hermannstadt (Deubel).

Schässburg und Héviz sind zu streichen.

impressus Germ. Hermannstadt (Belz).

Schässburg und Héviz sind zu streichen.

Erichsoni Rye. Hermannstadt, Kronstadt, Reps, S-Bereu (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg, Baassen, Balánbánya, Ratosnya, Rodnagelirge (c. a.).

montivagus Heer. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Práshe (Ormay); Bülös, Borszék, Csukás, Buesecs (c. a.); S-Bereu (Müller).

var. **coarcticollis** Epp. Frecker Gebirge (Serboti), Borszék, Ratosnya, Rodnagelirge (c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel).

var. **carpathicus** Ganglb. Schuler Gebirge, Alsó-Rákos, Balánbánya, Rosenauer Gebirge (c. a.); Nagy-Hagymás, Paringul, Rodnagelirge (Deubel).

obscuripes Ganglb. Rodnagelirge (Ganglbauer, Deubel, c. a.); Buesecs, Nagy-Hagymás (Deubel).

pallipes Grav. Előpatak (c. a.); Kronstadt (Giespreng), Honigberg (Altufer, Deubel); Rotenturm (Ormay).

Kolbei Gerh. Schässburg, Rotenturm, Borszék (c. a.); Várhegy (Deubel); Rodnagelirge (Ganglbauer).

Reitteri Weis. Rodnagelirge Szaka, Putredu, aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.; Buesecs (Deubel).

138. *Dianous Samouelle*.

coerulescens Gyllh. Déva, Schässburg, S-Bereu (Bielz); Csukás, Szurdok-Pass, Paringul (c. a.); Rodnagelirge (Valea vinului), Törzburg, Hätzeg (Deubel).

Euaesthetinae.

Euaesthetini.

139. *Euaesthetus Leconte*.

bipunctatus Ljungh. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Breite, Witteberg, aus Grasbüscheln gesiebt), Unter-Kerz (Klosterweiher, aus Moos gesiebt, c. a.).

ruficapillus Lac. Kronstadt (Giespreng), Rodnagelirge (Alpin, Deubel).

laeviusculus Mannh. Schuler-Gebirge (Deubel).

Paederinae.

Paederini.

140. *Astenus Stephens*.

(*Sanius* Er.)

uniformis Duv. Rosenau (Umgebung der Flintschhöhle, Deubel).

filiformis Latr. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., S-Bereu, Záh (Bielz); Rotenturm, Karkova (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. **laticeps**. Előpatak, Schässburg (c. a.).

A. filiformis a. **laticeps** Länge 4½—6 mm. Zur Vergleichung lagen mir vor zwei Exemplare *Astenus filiformis* Latr. aus Berlin. Unsere Exemplare besitzen meistens einen breiten und grösseren Kopf mit flacheren Augen und in der Anlage rechtwinkligen, weniger breit abgerundeten Schläfen, wodurch diese parallel oder nahezu parallel zu einander verlaufen, während sie bei den Berliner Stücken deutlich nach hinten konvergieren. Die Flügeldecken sowie die ersten Hinterleibssegmente sind etwas weniger dicht und gröber, körnig punktiert, glänzender, fast wie bei *A. cribrellus* Baudi, der mir aus Margellan (von Reitter stammend) vorliegt, von dem unsere Art jedoch durch breiteren, robusteren Körper, längere Flügeldecken, namentlich aber grösseren Kopf und breiteren Halschild zu unterscheiden ist.

angustus Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Déva, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel). Wahrscheinlich über unser ganzes Hügel- und Bergland verbreitet.

var. **neglectus** Mark. Schässburg, Marienburg b. Sch., Borszék (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (bei Ameisen, Deubel).

immaculatus Saph. Hermannstadt, Előpatak (Bielz); Schässburg (c. a.).

141. *Paederus Fabr.*

(*Paederidus*.)

ruficollis F. (*sanguineollis* Steph.). Hermannstadt, Holzneuen, Kerz, Arpascher Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Héviz, Schässburg, Mediasch, Marosgebirge, Práshe (Bielz); Karlsburg, Hätzeg, Nagyenyed, Petrozsény, Előpatak (c. a.); Rotenturm, Talmesch, Remete, Gyergyó-Tölgyes, Szamosújvár (Ormay).

gemellus Kr. Hätzeg, Arpascher Gebirge, Dees (Bielz); Petrozsény, Unter-Kerz, Héviz, Schässburg, Naszód, Ilvamika b. Naszód (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Paederus* s. str.)

riparius L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Marienburg bei Kr. (Bielz); Heltau (Ormay); Kronstadt (Giespreng, Deubel).

fuscipes Curt. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Sächsbereu, Dees (Bielz); Schässburg, Marosújvár, Petrozsény (c. a.); Rodnagelirge (Alpin), Schuler-Gebirge (Deubel).

limnophilus Er. Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Porcsent, Marienburg b. Kr., Bükszál, Mediasch, Schässburg (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Ilvamika (bei Naszód, c. a.); Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).

littoralis Grav. (gregarius Fauv., vulgaris Mill.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

brevipennis Lac. Gross-Scheuern, Rotenturm, Záh, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Törzburg (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

142. *Stilicus Serville.*

angustatus Geoffr. (fragilis Grav.). Hátszeg, Ober-Sehes, Reps, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel); Hermannstadt (Ormay).

subtilis Er. Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Karlsburg, Reps (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).

rufipes Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Balánbánya, Ober-Kerz, Előpatak, Karlsburg (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt (Deubel).

similis Er. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen, Záh (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Rotenturm, Hermannstadt (Ormay).

orbiculatus Payk. Hermannstadt, Holzungen, Marienburg bei Kr., Büksszád (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm (Ormay).

Erichsoni Fauv. Hermannstadt, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Rosenau, Zernest (Deubel).

143. *Scopaeus Kraatz.*

sulcicollis Steph. (cognatus Rey.). Kerzer Gebirge, Rotenturm (Ormay); Hátszeg, Schässburg, Baassen. (Auch in Maulwurfshäufen, in welchen die gelbe Ameise lebt).

minutus Er. (sulcicollis aut. et Ganglbauer). Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.).

minimus Er. Rotenturm, Ober-Kerz (Glashütte), Schässburg, Borszék (c. a.).

bicolor Baudi. Nagyenyed (c. a.).

gracilis Sperk. Schässburg, Búdös, Naszód (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

laevigatus Gyllh. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Unter-Kerz (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

144. *Lithocharis Lacord.*

ochracea Grav. Karlsburg, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Türkenhill, von Schilfrohr geklopft, Oktober, c. a.).

145. *Medon Stephens.*

(Medon s. str.)

castaneus Grav. Hermannstadt (Bielz).

brunneus Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Torockó, Búdös, Schässburg, Szováta (c. a.).

ferrugineus Er. (brachypennis m. olim, nitidus Petri). Schässburg (Scherkes, am Waldrande unter Blättern im ersten Frühjahr, einmal im Fuchsloch).

fuscus Mannh. Gross-Scheuern, Holzungen (Bielz); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); Kakova (Ormay).

rufiventris Nordm. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, c. a.).

(Chloeocharis.)

melanocephalus F. Hátszeg, Hermannstadt, Zood (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Marosujvár (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Pseudomedon.)

obsoletus Nordm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokelufer, in Geniste, 6. November, c. a.).

var. **obscurus** Er. Hermannstadt (Bielz).

146. *Lathrobium Gravenh.*

(Lobrathium.)

multipunctatum Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Rotenturm (Ormay).

(Platydomene.)

sodale Kr. Siebenbürgen (Katalog. col. Europa, 1906).

L. angusticollis Lac. ist aus dem Verzeichnisse siebenb. Käfer zu streichen.

picipes Er. Kerzer Gebirge (Ormay).

(Tartaropus.)

quadratum Payk. Déva, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

terminatum Grav. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Ivánika (Naszód, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); Hermannstadt (Ormay).

angustatum Lac. Gross-Scheuern (Bielz); Rodnagebirge, Honigberg (Altufcr, Deubel).

Nach Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa) soll diese Art nur im Westen von Europa bis Wien vorkommen; daher sind die Angaben für das Vorkommen der Art bei uns zu überprüfen, zumal Bielz L. scutellare Nelm. nur als Varietät des L. angustatum aufasst.

scutellare Nordm. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

(Lathrobium s. str.)

rufipenne Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz).

Büksszád als Fundort des L. rufipenne Gyllh. ist irrümlich aufgenommen worden.

elongatum L. Zibinsgebirge, Krizba, S.-Regen, Mezöség (Záh, Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

- geminum** Kr. (boreale Thoms. nec. Hochh.).
Bükszáll (Bielz); Schässburg, Rodnag-
gebirge (c. a.); Honigberg (Altuf-
er, Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- ripicola** Czwal. Kronstadt, Zernest, Var-
gyastal (Deubel).
- laevipenne** Heer. Bükszáll (Bielz); Hát-szeg
(Krivaia), Rotenturm, Schässburg, Iva-
mika (Naszóll, c. a.); Rodnaggebirge,
Kronstadt (Deubel).
- castaneipenne** Kol. Kronstadt (Bielz); Ro-
tenturm, Schässburg (c. a.); Rodnag-
gebirge (Deubel); Geisterwald (Mé-
hely).
- fulvipenne** Grav. Hát-szeg, Präsche, Schäss-
burg, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deu-
bel); Hermannstadt (Ormay); Borszék
(c. a.).
- var. **Letzneri** Gerh. Honigberg (Altuf-
er, Deubel); Schässburg (c. a.).
- brunnipes** F. Déva, Kerzer Gebirge, Mező-
ség (Záh, Bielz); Hammersdorf,
Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deu-
bel); Hermannstadt (Ormay).
- foveatum** Steph. Honigberg (Altuf-
er, Deubel).
- filiforme** Grav. Honigberg (Altuf-
er, Deubel).
- longulum** Grav. Zibins-Gebirge (Bielz);
Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kron-
stadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
- var. **longipenne** Fairm. Rotenturm (c. a.);
Kronstadt (Deubel).
- dilufum** Er. Schässburg (c. a.).
- pallidum** Nordm. Schässburg (c. a.);
Geisterwald (Méhely); Várhegy (Deu-
bel).
- (Glyptomerus.)
- coecum** Friv. Rotenturm (Ormay); Karls-
burg (aus einem verpilzten, mochrigen
Buchenstumpf gesiebt, c. a.).

147. *Scimbalium* Erichs.

- anale** Nordm. Sielenbürgen (Katalog. Co-
leopt. Europae).

148. *Achenium* Curtis.

- humile** Nic. Hermannstadt, Mező-ék (Záh,
Bielz); Baassen, Karlsburg (c. a.);
Honigberg (Altuf-er, Várhegy (Deubel);
Szamosujvár (Ormay).

149. *Doliceon* Laporte.

- biguttatus** Lac. Déva (c. a.); Klausenburg
(Müller).

150. *Cryptobium* Mannh.

- fracticornis** Payk. Zibins-Gebirge, S.-Regen,
Mező-ék (Záh, Bielz); Hermannstadt,
Schässburg (Breite, auf sumpfigem
Boden aus Gras-üscheln gesiebt, c. a.);

- Rotenturm, Präsche (Ormay); Kronstadt
(Gespreng, Deubel); Rodnaggebirge
(Ganglhauer).
- var. **brevipenne** Muls. Schässburg (c. a.,
mit der Stammform).

Staphylininae.

Xantholinini.

151. *Leptaciurus* Erichs.

- batyehrus** Gyll. Hermannstadt, Mediasch,
S.-Regen (Bielz); Schässburg, Hát-szeg
(c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. **linearis** Grav. Kronstadt (Deubel)
- formicetorum** Maerk. Schässburg. (In den
Nestern der grossen braunen Ameise,
c. a.); Kronstadt (eben-so, Deubel).

152. *Xantholinus* Serville.

(Gyrohypnus.)

- punctulatus** Payk. Durch das ganze Berg-
und Hügelland verbreitet.
- var. **Thomsoni** Schwarz. Zusammen mit
der Stammform.
- angustatus** Steph. (ochraceus Gyll.). Her-
mannstadt, Repe, Schässburg, Mezőség
(Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay);
Kronstadt, Nagyhagymás, Rodnaggebirge
(Deubel).
- afratus** Heer. Kronstadt (bei Ameisen),
Rodnaggebirge (Deubel).
- (Xantholinus s. str.)
- relicuus** Grav. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- glaber** Nordm. Schässburg. (In alten Eichen
bei *Lasius brunneus*, c. a.).
- rufipennis** Er. Kerzer Gebirge (Bielz);
Honigberg (Altuf-er, Nussbach (Deubel).
- decorus** Er. Gross-Scheuern, Kerzer Ge-
birge, Sächsisch-Regen (Bielz); Hát-szeg,
Baassen, Schässburg. (In alten Eichen
bei *Lasius brunneus*, c. a.); Bistritz
(Müller).
- tricolor** F. Gross-Scheuern, Oláhfaul, S.-
Regen (Bielz); Mádoviz (Hát-szeg),
Schässburg, Ivamika (Naszóll, c. a.);
Hermannstadt, Kronstadt, Hát-szeg Zernest,
Al-ó-Bákos (Deubel); Michels-
berg, Heltan, Rotenturm, Präsche, Po-
rumbaker Gebirge (Ormay).
- crassicornis** Hochh. Schuler-Gebirge (Deu-
bel).
- procerus** Er. Hát-szeg (Bielz)
- validus** n. sp. Schässburg (Kokeluf-er, c. a.).

Xantholinus validus n. sp.

Nigro-piceus nitidus, palpis, antennarum ar-
ticulis tribus basalibus, pedibus, abdominis seg-
mentis ultimis, meso- et metasterno rufo-tes-
taceis, elytris pallide testaceis. Caput oviforme,
disperse subtiliter punctatum, medio laeve, striis
frontalibus inferioribus postice vix convergen-
tibus, oculis medio-cubitus. Prothorax capite an-
gustior, latitudine maxima sesqui longior, basin
versus conspicue angustatus, lateribus disperse
irregulariter punctatus. Elytra prothorace vix
breviora, vix latiora, nitida, disperse subtiliter

punctata. Abdomen modice nitidum, subtiliter coriaceum, valde disperse punctulatum.

Länge 10⁵—11⁵ mm. 2 specimina.

Etwa von der Gestalt und Grösse des *X. relucens*, aber durch vollkommen eiförmigen Kopf, feine und gleichartige Punktierung desselben und andere Merkmale leicht zu unterscheiden.

Der Kopf ist vollkommen eiförmig, nach hinten stark gerundet, erweitert, mit vollkommen abgerundeten und breiten Schläfen, die vorderen Stirnfurchen parallel, nur an der äussersten erlöschenden Spitze etwas nach innen gebogen, die hinteren Stirnfurchen vom innern Augenrande schief nach rückwärts gerichtet und etwas ausserhalb der Richtung der vorderen Stirnfurchen in einem Grübchen endigend; sehr zerstreut und fein punktiert mit breiter, glatter Mittellinie. Die Fühler schwarz, die drei ersten Glieder heller, das dritte etwas länger als das zweite, konisch, die folgenden Glieder quer, die vorletzten an der Spitze fast doppelt so breit als lang. Der Halsschild schmaler als der Kopf, fast um die Hälfte länger als breit, nach hinten deutlich, wenn auch nicht sehr stark verengt, mit breitem, glattem Mittelfeld, die Seiten verworren fein punktiert, die Punkte vorne zahlreicher als hinten in der Mitte sehr spärlich und von derselben Stärke, wie die des Konfes, separierte Mittelreihen kaum erkennbar. Flügeldecken fast von Halsschildlänge und kaum breiter als der Halsschild an der breitesten Stelle, glänzend zerstreut, feiner als der Halsschild und leicht punktiert. Schildchen glatt und dunkel. Hinterleib gewölbt, parallel, mässig, etwas fettig glänzend, fein chagrinirt mit sehr zerstreuten feinen Punkten, sehr fein, etwas absteilend behaart (bei seitlicher Ansicht deutlich erkennbar) mit einzelnen längeren Borsten am Seitenrande, an der Spitze und auf der Unterseite, eine einzelne Borste steht auf dem fünften sichtbaren Dorsalsegmente zu beiden Seiten der Scheibennitte vor dem Hinterrande. Tarsen nicht erweitert, sexuelle Unterschiede nicht bemerklich.

Ich hielt die Art bisher für *X. procerus* Er. Bei der Revision meiner Sammlung fiel mir der bedeutende Grössenunterschied zwischen meinen Exemplaren und den Angaben Erichson's auf und die Bemerkung bei Kraatz (Insekten Deutschlands, Staphylini, p. 637), dass *X. procerus* die „ansehnlichste europäische Art sei“. Später teilte mir Dr. Bernhauer, dem ich ein Stück vorlegte, mit, dass ihm das Tier unbekannt sei. Obgleich es nun schwer und unsicher ist, nach der Beschreibung Unterschiede aufzufinden, so glaube ich, ausser dem Grössenunterschiede, dem übrigens aus bekannten Gründen keine allzugrosse Bedeutung beigelegt werden darf, doch einige Unterschiede konstatieren zu können. Während die neue Art der Gestalt nach in die Nähe des *X. relucens* gehört, besitzt sie die Kopfform und Punktierung des *X. distans*. Die Färbung von Kopf und Halsschild ist dunkelbraun, bei *X. procerus* schwarz mit Metallschimmer, bei letzterem sind die Flügeldecken braunrot, bei der neuen Art hell gelbbraun, wie bei *X. relucens*. Die drei ersten Fühlerglieder sind bei beiden Exemplaren heller, bei *X. procerus* schwarz. Die Kopfpunktierung des letzteren scheint kräftiger zu sein als bei der neuen Art, bei der sie ebenso fein ist als bei *X. distans* und etwas feiner als bei *X. tricolor*; auch die Punktierung der Flügeldecken ist zerstreuter, feiner und seichter als bei *X. procerus*.

Ob der von Bielz aus Hätzeg angeführte *X. procerus* auch hieher gehört, kann vorläufig nicht entschieden werden, da mir Tiere aus dieser Gegend fehlen.

cribripennis Fauv. Schielfal (Bielz); Csukás (? c. a.).

distans Rey. Kronstadt (Bielz); Paringul, Zalata, Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge, Schuler-Gebirge, Schässburg, Alsó-Pákos (c. a.).

linearis Oliv. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *longiventris* Heer. Karlsburg, Unterkarz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

153. *Nudobius Thomson*.

lentus Grav. (Wingelmülleri Bern.). Kronstadt (Bielz); Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Hätzeg (Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Fichtenrinde); Negoj (Wingelmüller teste Bernhauer).

154. *Gauropterus Thomson*. (Eulissus Epp.)

fulgidus F. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Marosgebirge, Dees (Bielz); Paj (Hätzeg); Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); S.-Regen (Müller).

155. *Baptolinus Kraatz*.

pilicornis Payk. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Bozauer Pass (Bielz); Bistra, Paringul, Reljezat, Bucsecs (c. a.); Schanta, Präsbe, Zood (Ormay).

affinis Payk. In unsern Berg- und Gebirgswäldern unter der Rinde verschiedener Baumarten.

156. *Othius Stephens*.

punctulatus Goeze (*fulvipennis* F.). Gross-Scheuern, Mediasch, Kronstadt, Hosszufalu, Bozauer Pass, S.-Regen, Malomviz, Hermannstadt, Büdös, Schässburg (in Wäldern unter Laub, c. a.); Gölsenberg, Szamosújvár (Ormay).

laeviusculus Steph. Schässburg (c. a.).

melanocephalus Grav. Kronstadt (Bielz); Rodnagerge (c. a.).

lapidicola Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs, Rodnagerge (Deubel).

myrmecophilus Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

transylvanicus Ganglbauer. Rotenturm, Schuler-Gebirge, Csukás, Rosenauer Gebirge, Balánbánya (Egyeskő), Rodnagerge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

crassus Motsch. (*pallidus* Brancsik). Zibinsgebirge (Porkovicza), Kerzer Geb., Gyógy (Ormay); Malomviz, Topánfalva, Ratosnya, Borszék, Balánbánya, Büdös, Bucsecs (c. a.); Bucsecs, Rodnagerge (Ganglbauer).

Staphylinid.

157. *Actobius Fauvel.*

cinerascens Grav. Zibinsgebirge, Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

158. *Neobisnius Ganglbauer.*
(*Bisnius Thoms.*)

villosulus Steph. Schässburg (Kokelufer, im Geniste, c. a.); Kronstadt, Dees (Deubel).

procerulus Grav. Törzburg (Deubel)

var. *prolixus* Er. Zibinsgebirge, Fogarasch (Bielz); Rotenturm (Altfer unter Steinen), Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt, Bistritz, Rodnagelb. (Deubel).

159. *Hesperus Fauvel.*

rufipennis Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg. (In Eichenmulden, ein ♀ am ausfliessenden Eichensaft, ein ♂ im Moos am Fusse eines Ahornstammes).

160. *Philonthus Stephens.*

(*Philonthus s. str.*)

splendens F. Zibinsjäser, Negovan, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Dongókő. S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota), Klausenburg (Malomvölgy, c. a.); Nagy-hagymás (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

intermedius Lac. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Rinderdüngr), Klausenburg (c. a.).

laminatus Creutz. Götzberg, Kronstadt, Bodzaer Pass, Mediasch (Bielz); Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelb. (c. a.). Klausenburg (Müller)

laevicollis Lac. Neudorf b. H., Präsbe, Frecker Jäser, Kronstadt, Piatra mare, Bozauer Pass, Mediasch, Bistritz (Bielz); Hermannstadt, Frecker Geb. (Serbota), Ba'ánbánya, Bistra, Rodnagelb. (c. a.)

montivagus Heer. Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay); Retjezat, Patingul, Frecker Gebirge (Serbota), Buceses, Schässburg, Rodnagelb. (c. a.).

cyanipennis F. Fogarascher Geb., Königstein (Bielz); Szováta, Schässburg (Fuchslochgraben unter Blättern, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay); S.-Regen (Müller).

aeneus Rossi. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

chalcus Steph. Hermannstadt, Schässburg (Breite, unter Eichenrinde, c. a.); Kronstadt (Deubel).

addendus Sharp. Kronstadt Noa, Méhely); Klausenburg (c. a.)

carbonarius Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Nagyvenel (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely).

temporalis Rey. Kerzer Gebirge (Bulea), Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Szováta (c. a.).

atratus Grav. Déva, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Bükszá, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Bülös, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. *coerulescens* Lac. Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rotenturm, Ilvamika Naszód, c. a.).

Bodemeyeri Epp. Rodnagelb. (Deubel). *rotundicollis* Men. Dobra, Déva, Götzberg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

aerosus Kiesenw. Retjezat (2 Exemplare, c. a.).

Meine zwei Exemplare (♂ und ♀) besitzen bloss eine Länge von 75 (♂) — 95 (♀) mm.

ebeninus Grav. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auch im Rodnagelb.

corruscus Grav. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).

concinus Grav. Kronstadt, Olerkomana (Méhely); Karlsburg, Schässburg, Rodnagelb., Naszód (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel); Detunata (Mallász).

sanguinolentus Grav. Gross-Scheuern, Michelsberg, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg (c. a.).

immundus Gyll. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Baassen, Ilvamika (Naszód), Bükszá, Rotenturm, Muosujvár (c. a.).

debilis Grav. Kronstadt, Bükszá, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (unter verwesenden Pflanzenstoffen, 20. Februar), Frecker Gebirge (Leita, in Sägespänen beim Sägewerk), Dees, Rodnagelb., Naszód (c. a.); Detunata (Mallász).

decorus Grav. In den Wäldern des ganzen Gebietes.

luscipennis Mannh. (politus F.). Neudorf b. H., Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Kokelufer), Dees (Bielz); Klausenburg, Reys (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

Mannerheimi Fauv. (lucens Er.) Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Rodnagelb. (Deubel).

varius Gyll. Mediasch, Olálfalu (Bielz); Schässburg (Witeberg), Frecker Geb. (Serbota), Marosujvár, Tordaer

- Schlucht, Naszód (c. a.); Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).
- a. *bimaculatus* Grav. Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz).
- frigidus* Kiesenw. Retjezat, Paringul, Bucsecs (c. a.); Hátszeg (Deubel).
- marginatus* Stroem. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schuler-Gebirge, Mediasch (Bielz); Rotenturm, Szurduk-Pass (c. a.); Zoodgelirge (Porkovicza, Ormay); Marosgelirge (Müller).
- lepidus* Grav. Déva, Reys, Előpatak, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Alsó-Rákos, Rátosnya, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
- nifidulus* Grav. Déva (Bielz).
- longicornis* Steph. Kronstadt (Bielz).
- fenestratus* Fauv. (hipustulatus Woll.) Hermannstadt (Ormay).
- cruentatus* Gmel. Michelsberg, Mediasch, Borgeer Pass (Bielz); Oláhfalú, Szurdukpass, Paringul, Schässburg (c. a.); Detunata (Mallász); Bistritz (Müller).
- varians* Payk. Gross-Schenk, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Schässburg, Karlsburg, Ilvamika (Naszód), Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel).
- var. *agilis* Grav. Hermannstadt, Detunata (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel); Detunata (Mallász).
- albipes* Grav. Zibinsgebirge, Kronstadt, Bucsecs, Csukás, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Garten unter faulenden Pflanzenstoffen, c. a.); Hermannstadt (Ormay).
- var. *alpinus* Epp. Zoodgebirge, Kronstadt (Bielz).
- Denbel bezweifelt das Vorkommen dieser Varietät in Kronstadt.
- cephalotes* Grav. Hermannstadt, Holzmen-gen, Kronstadt (Bielz); Oláhfalú (c. a.); Almaser Höhle (in grosser Meuge, Deubel).
- timetarius* Grav. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Schuler-Gebirge, Mediasch, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Nagyenved, Rodnagebirge, Szurduk-Pass (c. a.); Baumgarten b. H., Kerzer Gebirge (Ormay).
- sordidus* Grav. Klausenburg (Bielz); Rotenturm (Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Marosgebirge (Müller).
- Scribae* Fauv. Talmesch (Bielz).
- fuscus* Grav. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg (Alt- ufer, Deubel).
- umbratilis* Grav. Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- corvinus* Er. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

- ventralis* Grav. Schielthal, Oláhfalú (Bielz); Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- discoidens* Grav. Déva, Bükszá, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Reme'te (Nagy-enyed, Ormay).
- quisquiliarius* Gyllh. Hermannstadt, Héviz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Nagyenved (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. *inquinatus* Steph. Gyógy (Ormay); Baróth (Méhely); Schässburg (c. a.).
- rufimanns* Er. Zibinsgebirge (Bielz).
- tumarius* Grav. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Knopf an feuchter Stelle, c. a.).
- virgo* Grav. Schässburg (c. a.).
- micans* Grav. Marosujvár (c. a.); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel).
- fulvipes* F. Hermannstadt, Schässburg (Kokelufer, nicht selten, Bielz); Marosujvár, Naszód, Ilvamika (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Hátszeg (Deubel); Detunata (Mallász); S.-Regen (Müller).
- punctus* Grav. Kronstadt (Bielz). (Rabigus.)
- tenuis* F. Hátszeg, Zood, Präbsbe, Nussbach, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Baassen, Schässburg (c. a.); Brenndorf (Alt- ufer, Deubel).
- pullus* Nordm. Déva, Nussbach, Oláhfalú (Bielz); Petrozsény, Puj (Hátszeg), Zalatna, Rotenturm, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Rodnagebirge, Hátszeg (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay). (Gabrius.)
- vernalis* Grav. Im ganzen Berg- und Hügel-land verbreitet.
- femoralis* Hochh. Balánbánya (Vigázókő, Méhely); Hátszeg (Deubel).
- exiguus* Nordm. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagebirge (Deubel).
- astutus* Er. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Szurduk-Pass (c. a.).
- nigritulus* Grav. Im ganzen Gebiete verbreitet.
- var. *trossulus* Nordm. Schässburg, Tor-daer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.).
- var. *piliger* Rey. Rodnagebirge (Deubel, c. a.).
- splendidulus* Grav. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- Philonthus thermanum Aubé, welcher von Bielz aus Bükszád angeführt wurde, ist zu streichen, da das betreffende Exemplar meiner Sammlung ein kleiner, unausgefärbter Philonthus splendidulus Grav. ist.
- ### 161. Staphylinus Linné.
- (Trichoderma.)
- pubescens* Deg. Götzenberg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Puj (Hátszeg), Kerzer Gebirge, Klausenburg, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

(Abemae.)

chloropterus Panz. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagelb, Kerzer Gebirge, Puj (Hätzeg), Klausenburg (c. a.).

(Platydracus.)

fulvipes Scop. Zibinsgebirge, Gurariu, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Balánbánya (c. a.).

stercorarius Oliv. Gross-Scheuern, Borgoer Pass, Kelemengebirge (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

chalconcephalus F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Fogarascher Gebirge (c. a.); Gölzenberg (Ormay); S.-Regen (Müller).

latebricola Grav. Schässburg (c. a.).

(Staphylinus s. str.)

caesareus Cederh. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

erythropterus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Göerius.)

olens Müll. Schietal, Zibinsgebirge, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

tenebricosus Grav. (brachyptera Fairm.). Hätzeg, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Nussbach, Kronstadt, Schässburg, Oláh-falu (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Präsbe (Ormay).

ophthalmicus Scop. Königstein (Bielz); Nagylak (Un erweis-enburger Komitat, Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

similis F. (nitens Fauv.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

macrocephalus Grav. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Rodnagelb, Balánbánya (Egyeskő, c. a.).

var. **Ormayi** Reiter. Präsbe, Schanta (Ormay); Schuler-Gebirge, Frecker Gebirge (Serboia). Bülös (c. a.); Pietrosul (Kelemengebirge), Busecs (Deubel).

var. **alpestris** Er. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

(Pseudecypus.)

brunnipes F. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

fuscatus Grav. Gölzenberg, Kronstadt, Busecs, Mediasch, Marosgebirge (Bielz); Heltau, Hermannstadt, Torockó, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagelb, Schässburg (c. a.).

mus Brüll. Surul (Bielz); Balánbánya, Schässburg (c. a.).

ploipennis F. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Königstein, Hosszufalu, Bükszád (Bielz); Nagyenied (Ormay); Torockó, Baassen, Schässburg, Tordaer Schlucht, Puj (Hätzeg), Klausenburg (c. a.); Detunata (Mallász); Marosgebirge Müll.).

aeneocephalus Dej. Talmesch, Kronstadt, Busecs, Dongókő, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Retjezat, Malomviz (c. a.); Marosgebirge (Müller).

fulvipennis Er. Hammersdorf, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Baassen, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

(Tasius.)

pedator Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Puj (Hätzeg, c. a.); Várbely (Müller).

(Oecypus.)

falcifer Nordm. Mediasch (Bielz).

globulifer Geoffr. (dentulus Block.). Hätzeg, Hermannstadt, Gölzenberg, Kronstadt, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Nagyenied (c. a.).

compressus Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Kerzer Gebirge, Schässburg (c. a.).

162. *Ontholestes Ganglb.*

(Leistotrophus Kr.)

tessellatus Geoffr. (nebulosus F.). Michelsberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Frecker Gebirge (Serboia), Balánbánya, Karlsburg, Schässburg (c. a.).

murinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

163. *Emus Curtis.*

hirtus L. Hätzeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Bistritz (Müller).

164. *Creophilus Mannh.*

maxillosus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **ciliaris** Steph. Hammersdorf (Bielz).

Quedlini.

165. *Quedius Stephens.*

(Ediquus.)

microps Grav. Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

Die Zahl der hintern Punkte des Scheitels scheint veränderlich und stimmt bei keinem meiner beiden Exemplare mit der Beschreibung überein. Bei dem einen Exemplar befindet sich zwischen dem hintern Augenrande und der Einschnürung des Halses fast in der Mitte nur ein grösserer Punkt, unmittelbar vor der Einschnürung ein fast ebenso grosser zweiter Punkt; bei dem andern Exemplar befinden sich zwischen dem hintern Augenrande und der Einschnürung die beiden normalen Punkte, aber unmittelbar vor der Einschnürung ebenfalls zwei fast gleich-grosse Punkte nebeneinander.

longicornis Kr. n. sp. Schässburg (c. a.; 1 ♂).

Quedius (Ediquus) longicornis Kr. Länge 12 Millimeter.

Dunkelbraun, der Kopf pechschwarz, die Flügeldecken, die hintern Ränder der Abdominalsegmente und die Hinterleibsspitze hell gelbbraun, die Beine und die beiden Wurzelglieder der Fühler rötlichbraun. Kopf gerundlich, vom Hals durch eine scharfe, vertiefte Linie abgeschnürt, die Augen fast nur von halber Schläfengänge, fein chagriniert, matt, ausserdem fein etwas undicht, auf der Stirnmitte erloschen und entfernter punktiert. Der hintere Supraorbitalpunkt befindet sich in der Mitte zwischen dem vorderen und der Einschnürung, der kleinere Scheitelpunkt nahe der Einschnürung, etwas nach innen gerückt, neben demselben und auf den Schläfen zahlreiche gröbere Punkte, der grosse Schläfenpunkt etwas vor der Mitte der Schläfen. Die Oberlippe ist tief ausgerandet, wie die Mundteile ausser den braunen Mandibeln hell rötlichgelb. Das dritte Fühlerglied ist um die Hälfte länger als das zweite, die fünf vorletzten nach gewisser Richtung schwach quer. Der Halsschild breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, fein chagriniert, matt, die Hinterecken vollkommen verrundet, neben demselben tief eingedrückt, ausser den normalen drei Rückenpunkten befinden sich je drei auf der Scheibe in einer zur dorsalen Punktreihe fast parallelen, aber etwas nach aussen gebogenen Reihe drei Diskalpunkte, von denen der dritte wesentlich weiter nach hinten gerückt ist als der hintere Dorsalpunkt, hierbei ist der vor dieser Reihe befindliche Marginalpunkt, welcher denselben Abstand vom Vorderrande besitzt, wie der in der Dorsalreihe mitgezählte Marginalpunkt, nicht mitgezählt. Ausserdem befindet sich noch ein Diskalpunkt im ersten Drittel in einiger Entfernung vom Seitenrande. Das dunkelbraune Schildchen ist glatt, die Flügeldecken so lang aber kaum so breit als der Halsschild, glänzend, nicht chagriniert, wenig dicht, kräftig punktiert und fein grau behaart, die Härchen etwas aufgerichtet, aber nach hinten geneigt. Der Hinterleib nach hinten nur schwach und allmählich verengt, glänzend, ebenso kräftig und nicht dichter als die Flügeldecken punktiert und fein grau niederliegend behaart. Das sechste Bauchsegment an der Spitze tief ausgerandet, die Vorderränder mässig erweitert.

Dr. Bernhauer, dem ich die Art vorlegte, determiniert dieselbe als *Qu. longicornis* Kr. mit dem Bemerkung, dass die Beschreibung des *Qu. longicornis* bei Ganglbauer nicht ganz stimme. Weil nun weder Kraatz (Insekten Deutschlands. I. Abt., II. Bd., p. 494) etwas von einer ausserhalb der Rückenreihe befindlichen Punktreihe das Mindeste erwähnt, noch Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa, II. Bd.), der ausdrücklich bemerkt, dass ausser den drei Rückenpunkten keine andere Punkte auf dem Halsschild vorhanden seien, so lasse ich obige Beschreibung stehen. Durch Vergleich eines später von Herrn Bickhardt in Frankfurt a. M. eingesendeten Exemplares des *Qu. longicornis* aus West-Deutschland habe ich mich von der Richtigkeit der Bernhauerschen Determination überzeugt.

(Microsaurus.)

brevis Er. Schässburg (Oktober, in einer alten Eiche bei *Lasius brunneus*; c. a.).

lateralis Grav. Kronstadt (? Deubel); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchsloch unter Laub, 2 Exemplare, c. a.).

brevicornis Thomson. Schässburg (in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen, 4 Exemplare; c. a.); Kronstadt (Alhely).

ochripennis Men. Hermannstadt (aus Pilzen, Ormay); Schässburg, Baassen, Reys, Kronstadt, Hammersdorf, Rothengebirge (c. a.).

fulgidus F. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

cruentus Oliv. Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen, Mezöszeg (Záh, Bielz); Baassen, Schässburg, Reys (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); S.-Regen (unter Weidenrinde, Müller).

var. **virens** Rottenbg. Bozauer Pass (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).

ventralis Arag. Schässburg (Breite, in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen, 3 Exemplare, c. a.).

mesomellus Marsh. Kronstadt (Bielz); Puj Hätzeg, Kriwadia (bei Hätzeg, Höhle), Zalana (Höhle bei Präszaka), Karlsburg (Höhle im Ompolyitzatal), Retjezat, Búdös, Schässburg (c. a.); Schanta (Ormay).

maurus Sahlb. Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm, Schässburg (in einer alten Eiche, c. a.).

xanthopus Er. Kronstadt, Tartlau (Bielz); Búdös, Schässburg (in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen), Bistra (c. a.).

scitus Grav. Schässburg (in einer alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eiche, 1 Exemplar, c. a.); Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

infuscatus Er. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz).

(Quedionuchus.)

cinctus Payk. Zibinsgebirge, Kronstadt, Teszla, Dongókő, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Malomviz, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

punctatellus Heer. (pediculus Fauv.). Kerzer Gebirge (Bielz); Schuler-Gebirge, Hätzeg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

laevigatus Gyll. Gölsenberg, Kerzer Geb., Bucsecs, S.-Regen, Borgoer Pass (Temu, Bielz); Retjezat, Bistra, Zalana, Schuler-Gebirge (c. a.); Schanta, Porumbacher Gebirge (Ormay); Zernest (Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer).

a. **resplendens** Thoms. Bistra, Búdös (c. a.).

(Quedius s. str.)

fuliginosus Grav. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

tristis Grav. Kronstadt (Bielz).

molochinus Grav. Zibinsgebirge (Bielz). Schässburg (Scherkes, Waldrand unter Laub, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

(Sauridus.)

ochropterus Er. Zibins-Jäser, Gölsenberg, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Retjezat,

- Frecker Gebirge (Serbota). Bucsecs, Borszék (c. a.); Paringul, Kelemen-gebirge (Deubel); Schanta, Zoolgeb., Kerzer Gebirge (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- a. **Kiesenwetteri** Ganglb. Paringul, Kerzer Gebirge (Bulea). Rodnagebirge (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).
- var. **obscuripennis** Bernh. Csukás, Schuler-Gebirge, Balánbánya, Malomviz, Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).
- dubius** Heer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- picipes** Mannh. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- transsylvanicus** Weise. Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Kerzer Gebirge (Bulea, Deubel).
- umbrinus** Er. Götzenberg, Kronstadt, S.-Regen, Borgoer Pass (Bielz); Malomviz, Balánbánya, Borszék, Előpatak, Schässburg (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).
- fumatus** Steph. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Hermannstadt, Szováta (c. a.).
- limbatus** Heer. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay).
- humeralis** Steph. Michelsberg (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- obliteratus** Erichs. Zibins-Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Heltau (Ormay); Hammersdorf, Torockzó, Büdös, Szováta, Hátszeg, Kronstadt, Raosnya, Schässburg (c. a.).
- maurorufus** Grav. Zibinsgebirge, Bucsecs, S.-Regen (Bielz); Borszék, Balánbánya, Schuler-Gebirge (c. a.).
- Quedius riparius Kell., welchen Bielz aus Oláhfalv auführt, ist durch einen Irrtum meinerseits in das Verzeichnis gelangt, daher zu streichen.
- plancus** Er. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Zoolgebirge (Porkovicza, Ormay).
- scintillans** Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.).
- (*Raphirus*.)
- pyrenaicus** Bris. Kronstadt (Bielz), Csukás, Balánbánya, Büdös, Bistra (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).
- auricomus** Kiesenw. (decoratus Petri). Frecker Gebirge (Serbota), Paringul (c. a.).
- Dr. Bernhauer hat meinen Qu. decoratus als Qu. auricomus Kiesenw. bestimmt, der bisher nur aus Kärnten und dem westlichen Europa bekannt war.
- cincticollis** Kr. Surul (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Bucsecs, Balánbánya, Schuler-Gebirge, Retjezat (c. a.).
- alpestris** Heer. Kronstadt, Dongókő (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea), Zool (Ormay);

- Paringul, Szurdukpass, Bucsecs, Rodnagebirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
- rufipes** Grav. Zibins-Gebirge, Tesla, Dongókő (Bielz); Arpascher Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- paradisianus** Heer. (monticola Er.). Frecker Gebirge, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Paringul, Malomviz, Bistra, Büdös, Rodnagebirge, Borszék, Bucsecs, Balánbánya (c. a.).
- collaris** Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Heltau (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- acuminatus** Hochh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay).
- picipennis** Heer. (altenuatus Gyll.). Schielthal, Zibinsgebirge, Unter-Kerz (Bielz); Balánbánya, Schässburg, Oláhfalv (c. a.); Rotenturm (Ormay).
- Scribae** Ganglb. Zalatna, Schässburg (Türkenhill), Rodnagebirge (c. a.).
- boops** Grav. Hermannstadt, Kerzer Geb., Kronstadt, Tesla, Bozauer Pass (Krazna, Bielz); Schanta, Gyógy (Ormay); Karlsburg, Unter-Kerz, Alsó-Rákös, Biassen, Schässburg, Zalatna, Balánbánya, Hátszeg (c. a.); Detunata (Mallász).
- var. **lilacicus** Kr. Rodna-Gebirge (Ganglbauer, c. a.).
- fulvicollis** Steph. Kerzer Gebirge (Bulea), Schuler-Gebirge, Malomviz, Paringul, Retjezat, Bucsecs, Borszék, Rodnageb. (c. a.).

166. Velleius Mannh.

- dilatatus** F. Klausenburg, Gyalu, S.-Regen, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Hangestein, im Muld einer von Hornissen bewohnten Eiche, Deubel).

167. Heterothops Stephens.

- praevia** Er. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- dissimilis** Grav. Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Kronstadt (Zinne, c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer).

168. Astrapaecus Gravenh.

- ulmi** Rossi. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

169. Euryporus Erichs.

- picipes** Payk. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed, Büdös (c. a.); Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

170. Acylophorus Nordm.

- glaberrimus** Herbst. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Atelshill, c. a.).

171. *Tanygnathus Erichs.*

terminalis Er. Unter-Kerz (Ufer des Klosterweihers, c. a.).

Tachyporinae.

Bolitoblini.

172. *Mycetoporus Mannh.*

(Ischnosoma.)

longicornis Mäkl. Schässburg (Siechhofberg, Gelber Berg, Witeberg, unter Laub, c. a.); Kronstadt (Deubel).

splendidus Grav. Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Unter-Kerz (c. a.).

(*Mycetoporus* s. str.)

orophilus Bernh. Rodnagelbirge (Kuhhorn, Deubel, c. a.).

piceolus Rey. Rodnagelbirge (Deubel).

Mulsanti Ganglb. Schuler-Gebirge (c. a.); Bucsecs, Nagybagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

Baudueri Rey. Baassen, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge (subalpin, Deubel).

a. *puncticollis* n. v. Hätzeg (c. a.).

Mycetoporus Baudueri a. *puncticollis*. Das von mir bei Hätzeg gesammelte Stück weicht vom normalen *Myc. Baudueri* nur durch den Besitz von je einem Diskalpunkte auf dem Halsschild ab. Dieser Punkt befindet sich hinter dem innern Vorderrandspitze etwas vor der Mitte des Halsschildes.

brunneus Marsh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

longulus Mannh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bimaculatus Lac. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

punctipennis Scriba. Siebenbürgen (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, II. 371).

forticornis Fauv. Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hätzeg (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

ambiguus Luze. Schässburg, Rotenturm (c. a.).

clavicornis Steph. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Bucsecs, Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

solidicornis Steph. Hätzeg (Deubel, c. a.).

angularis Rey. Hätzeg (Deubel), Rodnagelbirge (alpin, Deubel, c. a.?).

niger Fairm. Schulergebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

splendens Marsh. Balánbánya, Hätzeg, Rotenturm, Schässburg (c. a., aus Laub gesiebt); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

Märkeli Kr. Rosenau, Zernest (Deubel). *Wingelmülleri* Luze. Siebenbürgen (Katalog. col. Europa).

rufescens Steph. Kronstadt (Bielz); Rosenau (Deubel).

laevicollis Epp. Bucsecs (Deubel); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

punctus Gyll. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Szóváta (c. a.); Hätzeg, Nagybagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

173. *Bryoporus Kraatz.*

rugipennis Pand. Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagelbirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Bryoporus rugipennis a. *nigripennis*. Bei einigen Exemplaren ist nicht nur die Scheibe des Halsschildes, sondern auch die Flügeldecken dunkelbraun; ich schlage für diese Aberration den Namen *nigripennis* vor.

var. *nigripennis* n. a. Kerzer Gebirge, Rodnagelbirge (c. a.).

rufus Er. Bucsecs, Csukás, Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge, Nagybagymás, Hätzeg (Deubel).

cernuus Grav. Déva (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (Kälbertritt unter Laub, c. a.); Hätzeg (Deubel); Königstein (Mébely); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. *merdarius* Oliv. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

174. *Bolytobius Mannh.*

(*Carphacis*.)

striatus Oliv. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Fogarascher Gebirge (Müller).

(*Lordithon*.)

bicolor Grav. Csukás (Anfang Juli auf Baumpilzen in Mehrzahl, c. a., Deubel).

trimaculatus Payk. Hätzeg, Dusch, Kerzer Gebirge Kronstadt? (Bielz); Csukás (c. a.).

var. *Kraatzii* Pand. Siebenbürgen (Bielz).

trinotatus Er. Hätzeg, Zibinsgebirge, Fogarasch, Oláhfalu, Schässburg (Bielz); Kronstadt, Rodna (Deubel).

var. *discophorus* Rey. Schässburg (Fuchsloch, aus Baumschwämmen, c. a.).

exoletus Er. Schieltal, Hätzeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Oláhfalu, Csukás, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

thoracicus F. (*pygmaeus* F.). Hätzeg, Schieltal, Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen, Götzenberg (Bielz); Oláhfalu, Rodnagelbirge (c. a.).

var. *biguttatus* Steph. (*intrusus* Hampe). Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalu (Bielz); Bistra, Zalatna, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.).

(*Bolytobius* s. str.)

lumalutis L. Auf Schwämmen durch das ganze Gebiet verbreitet.

Bei einem Exemplar meiner Sammlung von der Bistra ist die Spitze der vier Fühlerwurzelglieder schwärzlich und die Tibien und Tarsen gebräunt.

pulchellus Mannh. Hermannstadt (Ormay)
speciosus Er. Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Retezat, Csukás, Rodnagelirge (c. a.); Nezon, Busecs, Gonosza-Bach (bei der Gonosza-Höhle, Deubel)

175. *Bryocharis Lacord.*

analis Payk. Zibinsgebirge (Bielz), Hätzeg (Deubel).
 var. **merdaria** Gyll. Rodnagelirge, Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).
inclinans Grav. Kronstadt (Bielz), Busecs (subalpin, Deubel).
formosa Grav. Zibinsgebirge, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (Fuchsloch unter Laub in Hecken, c. a.); Hammersdorf (Deubel).

176. *Conosoma Kraatz,* (*Conurus* Steph.)

litoreum L. Hermannstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).
pubescens Grav. Durch das ganze Gebiet unter Moos, Blättern, in modernem, mulligem Holz.
immaculatum Steph. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Előpatak, St. Annensee, Schässburg (c. a.).
pedicularius Grav. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet unter Laub und verwesenden Pflanzen.
bipunctatum Grav. Előpatak (in einem mulligen Weidenstamm in Mehrzahl, c. a.); Rosenau (Deubel).
bipustulatum Grav. Ober-Sebes (Bielz); Schässburg (im Moos alter Eichen, c. a.); Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Rosenau (Deubel).

177. *Lamprinus Heer.*

erythropterus Panz. Schässburg (Reissel, 25. Juli in Mehrzahl, c. a.)

178. *Lamprinodes Lutz.*

saginatus Grav. Reps (Bielz)

179. *Tachyporus Gravenh.*

Diese Arten leben unter Laub und verwesenden Pflanzen- und Tierstoffen, zuweilen trifft man sie auch auf Blüten.

nitidulus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
macropterus Steph. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz), Előpatak, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 var. **Abner** Sauley. Karlsburg (c. a.).
pusillus Grav. Hermannstadt, Reps, Schässburg, S.-Regen (Bielz), Unter-Kerz, Előpatak, Oláhfalú (c. a.); Kronstadt, Nagyhagyomás (Deubel).

transversalis Grav. Girelsau (Bielz)

ruficollis Grav. Schiellthal, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.)

aticeps Seph. Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

tersus Er. Reps, Schässburg (c. a.); Erösd-Altfluss, Deubel).

chrysomelinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **basalis** Epp. Kronstadt (Deubel).

hypnorum F. Wie der vorige verbreitet.
selulus Er. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Előpatak, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel); Hätzeg, Schässburg, Karlsburg (c. a.), Detunata (Mallász).

formosus Matth. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Dees (Méhely)

abdominalis F. Hermannstadt, Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Petrosény, Karlsburg, Előpatak, Reps, (c. a.); Kronstadt (Deubel).

obtusius L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

180. *Tachynus Gravenh.*

flavipes F. Zibinsgeb., Kronstadt, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay)

proximus Kr. Bodzaer Gebirge (subalpin, Deubel); Retezat, Rodnagelirge (c. a.).

humeralis Grav. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Busecs, Rodnagelirge (Deubel)

subterraneus L. Präsche (Bielz); Bodzaer Geb., Kronstadt (Deubel)

bipustulatus F. Neulorf b. H. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

pallipes Grav. Schiellthal, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Götzenberg (Ormay); Borsék, Csukás, Oláhfalú, Paringul, Rodnagelirge (c. a.).

fimetarius Grav. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Schuler-Gebirge (c. a.); Michelsberg (Ormay).

rufipes Deg.-er. Götzenberg, Kerzer Geb., Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Paringul, Oláhfalú, Rodnagelirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Detunata (Mallász).

laticollis Grav. Kronstadt (Bielz); Schanta (Ormay); Hermannstadt, Ba'ánbánya, Schässburg (c. a.); Detunata (Mallász).

marginellus F. Götzenberg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannst. (Ormay); Rodnagelirge (Deubel); Szováta (c. a.).

collaris Grav. Gross-Scheuern, Götzenberg, S.-Regen (Bielz); Paringul, Malomviz, Rotenturm, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

rufipennis Gyll. Zibinsgebirge (Bielz). (Drymoporus.)

elongatus Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Bucsecs (c. a.); Kronstadt, Rodnageb. (Deubel).

181. *Coproporus Kraatz.*

colchicus Kr. Rosenau (Deubel).

182. *Leucoparyphus Kraatz.*

silphoides L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Götzenberg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Déva (c. a.); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

Hypocyptini.

183. *Hypocyptus Mannh.*

longicornis Payk. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Büdös, Schässburg (aus Laub gesiebt, c. a.).

laeviusculus Mannh. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).

discoideus Er. Hermannstadt (Bielz); Baassen (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

seminulum. Zibinsgeb., Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (Altufcr, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Habrocerini.

184. *Habrocerus Erichs.*

capillaricornis Grav. Durch das ganze Gebiet in Buchenwäldern unter Laub.

Trychophyini.

185. *Trichophya Mannerh.*

pilicornis Gyll. Schässburg (Atelshill, im Walde unter Blättern und am Kokelfußer unter Geniste, 13. Mai und 17. November, c. a.).

Aleocharinae.

Dinopsini.

186. *Dinopsis Matthews.*

erosa Steph. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz).

Myllaenini.

187. *Myllaena Erichs.*

dubia Gravenh. Kronstadt? (Deubel).

intermedia Er. Szurdok-Pass, Csukás, Unter-Kerz, Schässburg (an feuchten Orten aus Moos und Pflanzenbüscheln gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

brevicornis Matth. Götzenberg, Präsbe, (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

minuta Grav. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen. Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.).

infuscata Kr. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm (wie *M. intermedia* gesammelt, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Pronomaeini.

188. *Pronomaea Erichs.*

rostrata Er. Ober-Kerz (Glashütte). Unter-Kerz, Déva, Karlsburg, Schässburg, Baassen, Szováta (c. a.).

Hygronomini.

189. *Hygronoma Erichs.*

dimidiata Grav. Dobra (Bielz); Előpatak (auf Schilfrohr, c. a.).

Oligotini.

190. *Oligota Mannh.*

(Holobus.)

flavicornis Lac. Präsbe (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

apicata Er. Kronstadt (Deubel); Schässburg (Langheltgraben, aus dem Moose eines Ahornstammes gesiebt, c. a.).

(*Oligota* s. str.)

granaria Er. Schässburg (Wahrscheinlich in einer alten Eiche bei *Lasius brunneus*, c. a.).

pusillima Grav. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Marosujvár (c. a., am 3. April auch auf Kohlstrünken gesammelt); Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).

Bolitocharini.

191. *Brachida Rey.*

exigua Heer. Rotenturm, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

192. *Encephalus Westwood.*

complicans Westw. Hermannstadt (auf Schwämmen, (Ormay); Schässburg (Türkenhill, aus Büscheln von Sumpfpflanzen gesiebt); Rodnageb., Schuler Gebirge (Deubel).

193. *Gyrophæna Mannerh.*

Die Arten leben auf Pilzen.

Gyrophæna clavifera Scriba ist *Atheta clavifera* Scriba, wird also in der Gattung *Atheta* (*Rhopalocera*) aufgeführt. *Gyroph. pulchella* Heer, welche Bielz von Gödöfalú anführt, ist zu streichen, da sie durch einen Irrtum meinerseits aufgenommen wurde.

(*Gyrophæna* s. str.)

affinis Sahlb. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Tordas-Schlucht, Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.)

nitidula Gyll. Präsbe (Bielz); Zalatna (Ompolyitzatal, Csukás (c. a.); Paringul (Deubel).

nana Payk. Präsbe, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

gentilis Er. Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Zalatna (Ompolyitzatal, Csukás, Büdös, Rodnagelirge (c. a.).

bihamata Thoms. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyógy Ormay); Schässburg, Zalatna (Ompolyitzatal, c. a.).

fasciata Marsh. Bodzaer Gebirge, Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).

laevipennis Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

lucidula Er. Präsbe (Bielz), Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Poweri Crotch. Schässburg (c. a.)

minima Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás (c. a.); Kronstadt (Deubel).

manca Er. Borszék (Bielz); Déva, Előpatak, Schässburg (c. a.); Tusnád (Deubel).

(*Phaenegyra*.)

strictula Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Ober-Kerz, Glashütte, c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Rosenau (Deubel).

polita Grav. Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Csukás (c. a.); Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).

boleti L. Kerzer Gebirge (Ormay), Frecker Gebirge (Serbota), Schulergebirge, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Bucecs (Deubel); Piatra mare (Méhely).

(*Agaricochara*.)

laevicollis Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

194. *Placusa Erichs.*

Die Arten leben unter Baumrinden.

(*Placusa* s. str.)

complanata Er. (*humilis* Er.), Kronstadt (Bielz), Schulergebirge (Deubel).

pumilio Grav. Schässburg (c. a.); Ober-Komana (Méhely).

atrata Sahlb. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

tachyporoides Waltl (*infima* Er.) Hermannstadt (unter Nadelholz-Rinde, Ormay); Bistra, Borszék, Schässburg (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

(*Calpusa*.)

adseita Er. Hermannstadt (Nadelholzrinde, Ormay).

195. *Cyphea Fauvel.*

curtula Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenau (Deubel).

196. *Thectura Thomson.*

cuspidata Er. Hermannstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (Oktober 1910 in grosser Zahl unter der Rinde verpilzter Weidenstümpfe am Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

197. *Homalota Mannh.*

plana Gyll. Marosujvár (unter Schwarzpappel-Rinde), Bistra, Klausenburg (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

198. *Silusa Erichs.*

(*Stenus*.)

rubra Er. Schässburg Fuchslotz, auf Pilzen, c. a.).

(*Silusa* s. str.)

rubiginosa Er. Mező-ég (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Szurdok-Pass (c. a.).

199. *Leptusa Kraatz.*

(*Leptusa* s. str.)

fuliginosa Aubé. Schässburg, Bistra (c. a.); Hátaszeg (Deubel).

angusta Aubé (*canalis* Gyll.) Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Präsbe, Kerzer Geb. (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Előpatak, Csukás, Unter-Kerz, Schulergebirge, Bucecs, Büdös, Annensec, Borszék, Rodnagelirge, Paringul (c. a.).

haemorrhoidalis Heer. Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Bistra, Rodnagelirge (c. a.); Bucecs (Deubel).

(*Pachygluta*.)

ruficollis Er. Frecker Gebirge (Serbota, t ♀, c. a.).

(*Pasilis*.)

carpathica Weise. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay), Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya (Egyeskő), Schulergebirge, Rodnagelirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

(Pisalia.)

eximia Kr. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagebirge (Bielz); Heltan, Schanta, Präsbe, Gyógy (Ormay); Frecker Geb. (Serbota), Búdös, Reps, Busecs, Borszék (c. a.).

alpicola Brancs. Kerzer Gebirge (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge, Borszék, Schuler-Gebirge (c. a.); Csukás, Nagybagymás (Deubel).

puellaris Hampe. Busecs, Königstein (Deubel); Rodnagebirge (c. a.).

flavicornis Brancs. Rodnagebirge (c. a.).

piceata Rey.

var. **Koronensis** Ganglb. Rodnagebirge (Korunjs, aber auch an andern Stellen, Ganglbauer, Deubel, c. a.).

200. *Euryusa Erichs.*

Die Arten leben bei Ameisen (*Lasius brunneus*) namentlich in alten Eichen.

castanoptera Kr. Csukás (c. a.).

optabilis Heer. Hätzeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

sinuata Er. Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Előpatak, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

brachelytra Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Szováta, Alsó-Rákos, Ratosnya, Rotenturm, Bistra, Präszaka (Zalatna), Hätzeg, Schässburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Gyógy (Ormay).

201. *Tachysida Rey.*

gracilis Er. Schässburg (Alte Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.).

202. *Phymatura Sahlberg.*

brevicollis Kr. Bistra (6 Exemplare, ♂♂ und ♀♀, c. a.).

Ich habe die Mundteile dieser Art mikroskopisch untersucht und gefunden, dass dieselben einige Abweichungen von denen der Gattung *Bolitochara* zeigen, welche wenigstens Ganglbauer in seinen „Käfern von Mitteleuropa“ II. Band, p. 266 nicht erwähnt, indem er bloss auf die nahe Verwandtschaft mit *Bolitochara* hinweist, ohne unter den unterscheidenden Merkmalen die Unterschiede im Bau der Mundteile zu erwähnen. Die Mandibeln sind nicht einfach, sondern zeigen hinter der Spitze, wenigstens bei der linken Mandibel, ein deutliches kleines Zähnchen. Das stiftförmige vierte Kiefertasterglied ist nicht halb so lang als das dritte, sondern hat $\frac{3}{4}$ der Länge desselben. Die Zunge erreicht die Spitze des zweiten Lippentastergliedes, die Paraglossen reichen bis zur Hälfte des zweiten Lippentastergliedes. Die Lippentasterglieder nehmen an Dicke allmählich etwas ab, die beiden ersten sind länger als dick und nahezu gleichlang, das dritte ist länger als das zweite und gegen die Spitze schwach verdickt.

Die geschlechtliche Auszeichnung besteht nicht nur in einem Körnchen vor dem Hinterrande des 7. Dorsalsegmentes, sondern auch das achte Dorsalsegment ist ausgezeichnet, indem der Hinterrand desselben in der Mitte schmal und wenig tief ausgerandet ist, und neben der

Ausrandung jederseits drei stumpfe kleine, aber deutliche Zähne stehen. Ich glaube kaum, dass wir es hier mit einer neuen Art zu tun haben, wohl aber dass diese Auszeichnung den früheren Beobachtern entgangen ist, weil das echte Dorsalsegment in der Regel fast vollständig unter das siebente zurückgezogen ist.

203. *Bolitochara Mannh.*

Die Arten leben auf Pilzen.

Reyi Sharp. Malomviz (Lunka negru, c. a.).

lucida Grav. Hätzeg Gebirge, Kronstadt (Bielz); Csukás, Előpatak, Búdös, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

Mulsanti Sharp. Búdös, Schässburg (Siechhofwald, c. a.).

lunulata Payk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

bella Märk. Kronstadt (Bielz); Hätzeg, Karlsburg, Retjezat, Rotenturm, Schässburg, Unter-Kerz, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

obliqua Er. Retjezat, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Geb., Kronstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Csukás, Búdös, Schässburg (c. a.).

varia Er. Kronstadt (Zinne, Deubel).

204. *Autalia Mannh.*

Die Arten leben auf Pilzen, auch in trockenem Rinderdünger, unter Laub.

impressa Oliv. Klausenburg (Bielz); Schässburg (in Pilzen, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

puncticollis Sharp. Kronstadt (Zinne, Deubel).

rivularis Grav. Harbachufer, Gross-Scheuern, Kronstadt, Maros-Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a., unter Laub).

Myrmedoniini.

205. *Falagria Mannh.*

Die Arten leben wie die vorigen.

(*Falagria* s. str.)

sulcata Payk. Hätzeg, Hermannstadt, S.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Naszód (c. a.); Kronstadt (Deubel).

splendens Kr. Schässburg (1 Exemplar, c. a.).

sulcatula Grav. Hätzeg, Hermannstadt, Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Anaulacaspis*.)

thoracica Curt. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Marosgeb. (Bielz); Unter-Kerz, Topánfalva (Erzgebirge), Rotenturm (c. a.); Gyógy (Ormay); Nagybagymás (Deubel).

nigra Grav. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

(Cardiola.)

obscura Grav. Hátzeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

206. *Borboropora Kraatz.*

(Pseudoscopaeus Weise.)

Reitteri Weise. Kerzer Gebirge (Glashütte).

207. *Tachyusa Erichs.*

Die Arten leben an den Ufern der Gewässer.
(Ischnopoda.)

umbratica Er. Gross-Scheuern (Bielz), Schässburg, Karlsburg, Baassen, Szováta, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

exarata Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Cathusia.)

scitula Er. Karlsburg, Schässburg (c. a.).
(Tachyusa s. str.)

objecta Rey. Karlsburg, Schässburg, Unter-Kerz (c. a.).

coarctata Er. Hátzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Bistritz, Kronstadt (Deubel).

nitella Fauv. (concinna Kraatz nec Heer, Ganglb.). Baassen (c. a.).

constricta Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Dees, Kronstadt (Deubel).

(Calusia.)

balteata Er. Hátzeg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

208. *Gnypeta Thomson.*

carbonaria Mannh. Kronstadt (Deubel)

ripicola Kiesenw. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

velata Er. Honigberg (Altufur, Deubel)

209. *Aleuonota Thomson.*

(Aleuonota s. str.)

africapilla Rey. (rufotestacea Kr.). Kronstadt (Bielz).

gracilentia Er. Rodnagerbirge (c. a.).

(Apime'a.)

macella Er. Honigberg (Altufur, Deubel).

210. *Atheta Thomson.* (Homalota Er.)

(Hydrosmeectina.)

subtilissima Kr. Honigberg (Altufur, Deubel).

(Hydrosmeecta.)

fluviatilis Kr. Unter-Kerz (c. a.).

(Oflacra.)

luteipes Er. Götzenberg, Präsbe (Bielz); Rotenturm (c. a.).

(Glossola Fowler-Alconota Rey.)

gregaria Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay, Deubel)

(Alconota Thoms.)

currax Kr. Puj (Hátzeg, c. a.); Rodnagerbirge, Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

cambrica Woll. Bistra (c. a.); Kronstadt (Deubel).

aegyptiaca Motsch. Ober-Tömösch (Deubel).

Im Catalogus Col. Europae, Heyden etc. 12. 195 ist diese Art als fragliches Synonym zu A. cambrica Woll. gestellt.

sulciformis Steph. Kronstadt (Bielz); Nagyhagynás (Deubel).

insecta Thoms. Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Rodnagerbirge, Vargyasufer (Deubel).

(Metaxya.)

terminalis Grav.

var. **grisca** Thoms. Schässburg (c. a.).

melanocera Thoms. Hermannstadt, Baumgarten b. H. (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

elongatula Grav. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Rodnagerbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

morio Heer. Kronstadt (Deubel).

hygrotopora Kr. Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Vargyasal, Zernest (Deubel).

gemina Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

islandica Kr. Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagerbirge (c. a.).

(Hygroecia.)

fallaciosa Sharp. Kronstadt, Schauergebirge (Bielz); Rodnagerbirge (determ. Eppelsheim, Deubel).

(Parameotica.)

fuliceps Thoms. Schässburg, Rodnagerbirge (c. a.).

(Dracica.)

vilis Er. Götzenberg, Präsbe (Bielz).

(Oreostika.)

bosnica Ganglb. Bucsecs (Deubel, c. a., determ. Ganglbauer); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Bielz kannte *Atheta bosnica* Ganglb. nicht, welche bei uns die *Atheta tibialis* Heer zu vertreten scheint; daher ist A. tibialis Heer vorläufig zu streichen.

(Taxicera.)

deplanata Grav. Marosujvár (c. a.)

(Dinaraea.)

angustata Gyll. Kronstadt, Altufur (Deubel).

aequata Er. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Marosujvár, Unter-Kerz (unter Baumrinde, c. a.); Tusnád (Deubel).

linearis Grav. Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg (unter Baumrinde, c. a.); Zernest (Deubel).

(Paenidia.)

nitella Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

(Alceanta.)
incana Er. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespren, Deubel).
 (Plataraea.)
melanocephala Heer. Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (alpin, Deubel).
brunnea F. Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
 (Ptychandra.)
hepatica Er. Bistra, Rotenturm (c. a., 2 ♂♂).
 (Bessobia.)
occulta Er. Kronstadt (Méhely, an einer Hausmauer); Hermannstadt, Schässburg (Kokelufer, c. a.).
fungivora? Thoms. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
excellens Kr. Schässburg, Rodnagebirge (♂ c. a.).
 (Anopleta.)
corvina Thoms. (excavata Er.). Götzenberg, Präshe (Bielz); Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).
arcana Er. Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).
 (Traumocia.)
picipes Thomson. Surul, Kronstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge, Bucsecs (Deubel).
angusticollis Thoms. (ravilla Kr.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.).
 (Philygra.)
palustris Kiesenw. Rotenturm, Präshe (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel); Malomviz (c. a.).
procera Kr. St. Annensee, Schässburg (Siechthofberg, c. a.).
 (Microdota.)
aegra Heer. Rodnagebirge (c. a.).
excisa Epp. Rotenturm (♂, c. a.).
mortuorum Thoms. Rotenturm (c. a.).
amicula Steph. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (auf Kohlstrünken, 30. April, c. a.).
subtilis Scriba. Schässburg (Fuchsloch am ausfliessenden Saft einer Euche, März, c. a.); Vargyastal (Deubel).
spatula Fauv. Rodnagebirge (c. a.).
paleola Er. Schässburg (Fuchsloch auf einem Pilz, c. a.); Gyógy (auf Pilzen, Ormay).
 (Rhopalocera.)
clavigera Scriba (Atelshill, Kokelufer in Geniste, 7. November, c. a.).
 (Alaobia.)
scapularis Sahlb. Kerzer Gebirge (Bielz).
 (Atheta s. str.)
subterranea Rey. Bucsecs (c. a.).
nigricornis Thoms. Rodnagebirge (Koronjis, c. a.).
 Atheta excavata Gyl., welche Bielz anführt, dürfte A. excavata Er. = A. corvina Thoms. sein, da erstere nur aus Schweden und England bekannt ist.

divisa Märk. Schulergebirge (c. a.); Honigberg (Allufer, Deubel).
basicornis Rey. Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, 7. Oktober, c. a.).
autumnalis Er. Karlsburg (Juli, c. a.).
oblita Er. Schässburg (Gross-Alischer Kupa, 4. Mai, c. a.); Kronstadt (Deubel).
coriaria Kr. Rodnagebirge (Deubel).
gagatina Baudi. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Heltau, Gyógy (Ormay); Rotenturm, Hätzeg, Schässburg (an ausfliessendem Buchensaft, c. a.); Tusnád (Deubel).
myrmecobia Kr. Rodnagebirge (c. a.).
sodalis Er. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Schässburg (c. a.); Tusnád (Deubel).
pallidicornis Thoms. Kerzer Gebirge (Bielz); Hätzeger Gebirge, Ompolytza (Karlsburg), Karlsburg, Csukás (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).
nigritula Grav. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Heltau, Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); Nagyenyed, Schässburg (altes Eichenholz, c. a.); Altufer, Hätzeg (Deubel).
liturata Steph. Bucsecs (Malajest, Méhely); Ompolytza (Karlsburg), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
boletophila Thoms. Karlsburg, Bistra, Rotenturm, Schässburg (c. a.).
spelaea Er. (Ompolytza-Tal bei Karlsburg in einer von Fledermäusen bewohnten Höhle im Dünger derselben, c. a.).
crassicornis F. (sericans Grav.). Kronstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kleinpöld (Ormay); Ober-Kerz (Glashütte), Zalatna, Rodnagebirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).
 ♀ var. **fulvipennis** Muls. Rotenturm (c. a.).
pilicornis Thomson. Rodnagebirge (Deubel); Schässburg, Bistra, Rotenturm (c. a.).
xanthopus Thoms. Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Deubel).
trinotata Kr. Kronstadt (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Hätzeger Gebirge (c. a.).
euryptera Steph. Hermannstadt (Ormay, am ausfliessenden Eichensaft); Altufer (Deubel); Schässburg (auf Krautstrünken, 3. April, c. a.).
valida Kr. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).
aquatica Thoms. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
Pertyi Heer. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz).
 Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.
castanoptera Mannb. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge Gyógy (Ormay); Unter-Kerz, Baassen, Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Tusnád (Deubel).

aquatilis Thomson. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
(*Lioglut.*)

hypnorum Kiesenw. Kronstadt (Deubel)

pagana Er. Buceacs (Deubel).

granigera Kiesenw. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Bistra, Schässburg, Borszék, Ratosnya (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

♀ var. **subalpina** Rey. Bistra, Csukás (c. a.).

microptera Thoms. Rodnagelbirge (Deubel).

longiuscula Grav. (vicina Steph.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátszeg, Baassen, Bistra (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

nitidula Kr. Kronstadt (Bielz); Zoolgebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákos (c. a.).

oblonga Er. (*oblongiuscula* Sharp.). Schanta (Ormay); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákos, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Hátszeg, Rodnagelbirge (Deubel).

(*Thinobaena.*)

vestita Grav. Rosenau (Deubel).

(*Dimetrota.*)

contristata Kr. Buceacs (Deubel).

atramentaria Gyllh. Schulergebirge (c. a.).

picipennis Mannh. (*subrugosa* Rey nec Kiesenw.). Fogaräsker Gebirge, Zernest (Deubel); Bistra (c. a.).

putrida Kr. Rotenturm (c. a.); Buleasee, Buceacs, Schulergebirge (Deubel)

cinnamoptera Thoms. Marosujvár, Tordaer Schlucht, Buceacs, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

marcida Er. Rosenau (Deubel); Schässburg (c. a.).

laevana Rey. Karlsburg, Zalatna, Schässburg (auf Pilzen, c. a.).

(*Badura.*)

parvula Mannh. Rodnagelbirge, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge, Nagyhagy-más (Deubel).

(*Datomica.*)

cribrata Kr. Rodnagelbirge (c. a.).

sordidula Er. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz).

celata Er. Kronstadt (Bielz); Rodnagelbirge (c. a.).

zosteræ Thoms. Kronstadt (Bielz); Borszék, Schässburg (29. Juli, Fuchslotz, c. a.).

(*Pycnota.*)

paradoxa Rey. (Ska'itzky Bernh.). Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

(*Chaetida.*)

longicornis Grav. Gross-Scheuern (Bielz); Bükszád, Rodnagelbirge (c. a.); Schuler-Gebirge, Kronstadt (Deubel).

(*Coprothassa.*)

consanguinea Epp. Kronstadt (Bielz); Schanta (Ormay).

melanaria Mannh. Baassen (c. a.).

sordida Marsh. Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Rodnagelbirge, Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.).

(*Acerotona.*)

pygmaea Grav. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Bistra (c. a.).

aterrima Grav. Götzenberg, Präsbe (Bielz); Schanta (Ormay); Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

parva Sahlb. Buceacs, Kronstadt, Zernest (Deubel).

parens Rey. Hátszeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

orphana Er. Rodnagelbirge, Nagyhagy-más, Kronstadt (Deubel).

fungi Grav. Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rodna-Gebirge, Ratosnya, Előpatak, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel).

var. **orbata** Er. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (Kloster-teich), Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt, Altufer (Deubel).

clientula Er. (pulchra Kr.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen der *A. clientula* Er. in Kronstadt, ebenso das der *A. sordidula* Er.

fuscipes Heer. Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

laticollis Steph. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

subsinnata Er. Karlsburg (am ausfliessenden Saft einer Ulme), Schässburg (c. a.).

(*Amischa.*)

analís Grav. Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Zalatna, Rodnagelbirge, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagyhagy-más (Deubel)

soror Kr. Götzenberg, Präsbe (Bielz); Rodnagelbirge, Paringul, Schässburg (c. a.).

cavifrons Sharp. Karlsburg, Schässburg (c. a.).

(*Amidobia.*)

talpa Heer. Schässburg, Búdös (c. a.); Kronstadt (Ameisenester, Deubel).

validiuscula Kr. Kronstadt (Bielz).

(*Meotica.*)

exilis Er. Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

indocilis Heer. Schässburg (Witeberg, an den Wurzeln von Pflanzen, c. a., determin. Ganglbauer)

211. *Sipalia* Rey.

infirmá Weise (*Leptusa infirma* W.). Kerzer Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota, aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.); Nagyhagy-más (Deubel); Rodnagelb. (Ganglbauer).

curtipennis Aub. Kronstadt (Zinne). Alt-
ufer (Deubel).

Deubeli Bernh. Alsó-Rákos (Deubel, c. a.);
Kronstadt (Zinne, Deubel).

Bielz kennt weder *S. curtipennis* Aub. noch
S. Deubeli, von denen erstere oft für *S.*
arida Epp. gehalten wurde, die bei uns wohl
nicht vorkommt, jedenfalls aber erst nachzu-
weisen sein wird.

armata Epp. Hátszeg, Baassen, Schäss-
burg (Kokelufer in Geniste, c. a.);
Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

circellaris Grav. Neudorf b. Il., Kronstadt
(Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Or-
may); Borszék, Előpatak, Schässsburg
(c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

caesula Er. Balánbánya (c. a.).

alpicola Mill (Atheta alpicola Mill) Rodna-
gebirge, Zernster Gebirge, Kerzer Ge-
birge (Bulea, c. a.).

carpathica Mill. Bucsecs (c. a.); Rodna-
gebirge (Deubel).

212. *Notothecta* Thoms.

flavipes Grav. Schässburg (Breite, 11. April
1909, c. a.); Kronstadt (Deubel).

confusa Märk. Schässburg (Breite, 11. April
1900, c. a.).

anceps. Schässburg (c. a.); Kronstadt
(Deubel).

213. *Dadobla* Thoms.

immersa Er. Rotenturm, Schässburg,
Büdös, Borszék (c. a., unter der Rinde
verschiedener Bäume); Kronstadt
(Noa, Deubel).

214. *Tomoglossa* Kraatz.

luteicornis Kr.? Schässburg (Türkenhill,
Oktober, c. a.).

215. *Callicerus* Gravenh.

rigidicornis Er. Ober-Kerz (Glashütte). To-
roczkó (Erzgebirge, Eichenstumpf, Juli
1903, c. a.).

216. *Thamlaraea* Thoms.

cinnamomea Grav. Kronstadt, Hosszufalu
(Bielz); Honigberg (Altufer). Alsó-
Rákos (Deubel).

hospita Märk. Kerzer Gebirge (Bielz);
Hátszeg (c. a.); Honigberg (Altufer,
Deubel).

217. *Astilbus* Stephens.

canaliculatus F. Durch das ganze Gebiet
verbreitet.

218. *Zyras* Stephens.

Die Arten leben in der Nähe oder in Ameisen-
nestern.

(*Zyras* s. str.)

collaris Payk. Hermannstadt, Gross-
Scheuern (Bielz); Unter-Kerz, Schäss-
burg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

fulgidus Grav. S.-Regen (Bielz); Hermann-
stadt (Ormay); Hátszeg (Deubel, c.
a.); Schässburg (c. a.).

Haworthi Steph. Gross-Scheuern, Klausen-
burg (Bielz); Gyógy (Ormay); Szó-
váta, Rotenturm, Rátosnya, Hammers-
dorf, Schässburg (bei *Myrmica laevi-*
nodis, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deu-
bel).

(Pella.)

funestus Grav. Hermannstadt, Mediasch,
S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyógy
(Ormay); Schässburg (bei *Lasius ful-*
iginosus, c. a.); Kronstadt, Hátszeg
(Deubel).

cognatus Märk. Gross-Scheuern, Holzmen-
gen, Mezőség (Záh, Bielz); Gyergyó-
Tölgyes (Ormay); Schässburg (bei *La-*
sius fuliginosus, c. a.); Honigberg
(Deubel).

humeralis Grav. Hermannstadt, Harbach-
Tal, Hosszufalu (Bielz); Gyergyó-Töl-
gyes (Ormay); Kronstadt (Deubel);
Schässburg (c. a.); Klausenburg (Mül-
ler).

similis Märk. Hermannstadt (Ormay);
Schässburg (bei *Lasius fuliginosus*,
c. a.).

limbalus Payk. Schässburg (bei *Ponera*
contracta, c. a.); Honigberg (Deubel).

(*Myrmedonia* Er.)

lugens Grav. Mezőség (Bielz); Hermann-
stadt (Ormay); Schässburg (bei *La-*
sius brunneus, c. a.); Kronstadt (Deu-
bel); Klausenburg (Müller).

laticollis Märk. Schässburg (bei *Lasius*
fuliginosus, ziemlich häufig, c. a.);
Kronstadt (Deubel).

Hampei Kr. Hermannstadt (J. W., Bielz).

Da Bielz den *M. laticollis* Märk. nicht
anführt, liegt es nahe, anzunehmen, dass hier
eine Verwechslung vorliegt, da *M. Hampei* nur
aus Kroatien nachgewiesen ist.

(*Myrmoecia*.)

plicatus Er. Michelsberg, Mediasch (Bielz).

219. *Lomechusa* Gravenh.

strumosa Grav. Präsbe (Bielz).

220. *Atemeles* Stephens.

emarginatus Payk. Hátszeg (Bielz); Schäss-
burg (bei *Myrmica rubra*, c. a.); Rátosnya
(Müller).

paradoxus Grav. Götzenberg, Präsbe
(Bielz); Schässburg (Breite, April, in
Haufen der *Formica rufa*, c. a.); Kron-
stadt (Deubel).

Aleocharinul.

221. *Phloeodroma Kraatz.*

concolor Kr. Schässburg (c. a.).

222. *Phloeopora Erichs.*

testacea Mannh. (reptans Er.). Porumbach, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

angustiformis Baudi. Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

teres Grav. (corticalis Er.). Götzenberg, Präße, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und in altem Eichenholz, c. a.).

corticalis Grav. (major Kr., latens Er.). Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Klausenburg (Sigmund-Park unter Baumrinde, c. a.); Hätzeg (Deubel).

223. *Ilyobates Kraatz.*

Die Arten leben in der Nähe oder in Ameisenkolonien.

nigricollis Payk. Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Schässburg (c. a.).

Meinen sämtlichen *I. nigricollis* fehlt die Aushöhlung des letzten Fühlergliedes, welche bei *I. Mech* Baudi deutlich zu beobachten ist. Schliesslich besitzt das ♂, ähnlich wie die Männchen des *I. Mech*, in der Mitte der Basis der vier ersten Dorsalsegmente ein etwas feineres Fältchen. Da aber die Tiere im übrigen mit der Beschreibung des *I. nigricollis* übereinzustimmen scheinen, getraue ich mich nicht, dieselben als neue Art anzusprechen.

var. *Deubeli* Bernh. Ober-Kerz (Glashütte), Héviz (c. a.); Bucees, Honigberg (Deubel).

Mech Baudi. Hätzeg, Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.). Nagybagymás (Deubel).

224. *Calodera Mannh.*

nigrita Mannh. Borgoer Pass (Bielz), Honigberg (Altuf, Deubel).

aethiops Grav. Honigberg (Altuf, Deubel).

uliginosa Er. Kerzer Gebirge (Bielz).

225. *Chilopora Kraatz.*

longifarsis Er. Schässburg (Schleifengraben), Krivadia (Hätzeg, in einer Höhle, c. a.); Kronstadt, Bucees (Valea Jeppi, Deubel).

rubicunda Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

226. *Amarochara Thomson.*

(*Amarochara* s. str.)

umbrosa Er. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel)

(*Mniobates*.)

forticornis Lac. Götzenberg, Präße (Bielz); Schässburg (c. a.).

227. *Ocalea Erichs.*

badia Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Rodnaggebirge (Deubel); Baassen, Búdös, Schässburg, Rotenturm, Malomviz (c. a.).

var. *puncticollis* Rey. Kronstadt (Bielz).

var. *robusta* Bernh. Búdös, Csukás (c. a.); Bucees, Kronstadt (Deubel).

picata Steph. Hermannstadt, Heltau (Ormay); Bucees (subalpin, Deubel).

228. *Deubelia Bernhauer.*

picina Aubé. Kronstadt (Gespreng, aus Rasen von Sumpfpflanzen gesiebt, Deubel; c. a.).

229. *Ocyusa Kraatz.*

(*Ocyusa* s. str.)

maura Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel). (*Mniusa*.)

incrassata Rey. Schässburg (Scherkes, aus Laub gesiebt, 10. März, c. a.); Bucees, Schulergebirge, Nagybagymás (Deubel).

230. *Oxypoda Mannh.*

Die Arten leben auf Pilzen, am ausfliessenden Baumsafte, unter Laub etc.

(*Oxypoda* s. str.)

spectabilis Mark. (ruficornis Gyll.). Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Citendell, auf verpilztem Eichenstumpf, 12. Oktober, c. a.); Zernest (Deubel).

lividipennis Mannh. (luteipennis Er.). Hermannstadt (Ormay); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

opaca Grav. Zibins-Gebirge, Gross-Schenk (Bielz), Hermannstadt, Gyógy, Gyergyótölgyes, Szamosújvár (Ormay); Balánbánya, Bistra, Baassen, Schässburg (unter faulenden Pflanzenstoffen, häufig, c. a.).

vittata Märk. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, (Ormay); Schässburg (an Eichenstämmen, c. a.).

longipes Rey. Kronstadt, Zernest, Schulergebirge (Deubel).

(*Podoxya*.)

nimbicola Fauv. Siebenbürgen (Catalogus Col. Europ. etc., 1906, col. 212); Rotenturm (c. a.).

vicina Kr. (humidula Er.) Schässburg (Kokel, Geniste, c. a.).

induta Rey. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Skalitzkyi Bernh. Schulergebirge, Nussbach (Deubel); Rodnaggebirge (c. a.).

umbrata Gyllh. Kronstadt (Bielz); Bistra, Rodnaggebirge, Borszék, Baassen (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

sericea Heer. Schässburg (c. a.).

Doderoi Bernh. Kronstadt, Rosenau (Deubel).

exoleta Er. Rodnagebirge (Deubel, c. a.); Rotenturm (c. a.).

exigua Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Törzburg (Deubel).

(Deropoda.)

rufula Rey. Hermannstadt (Bielz).

rugulosa Kr. Rotenturm (c. a.).

(Baeoglena.)

praecox Er. Unter-Kerz (c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

(Mycetodrepa.)

alternans Grav. Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Borszék, Csukás (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

formosa Kr. Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

(Sphenomma.)

togata Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Borszék, Balánbánya (Egyeskö, aus dem Moos und den Algenbüscheln einer Quelle in Anzahl, c. a.).

montana Kr. Porumbacher Geb. (Ormay); Bucsecs, Kerzer Geb. (Buleu), Rodnagebirge (aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.).

rufa Kr. (praecellens Epp.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Puj (Hátszeg, c. a.); Erösd (Altufcr, Deubel).

(Demosoma.)

bicolor Rey. Bucsecs (subalpin). Schulergebirge, Zernest (Deubel); Malomviz (c. a.).

haemorrhoea Mannh. Schässburg (aus dem Holze alter, kranker Eichen, c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

rugicollis Kr. Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).

formiceticola Märk. Kronstadt? (Deubel).

amoena Fairm. Kronstadt (Bielz); Búdös (c. a.).

filiformis Redt. Karlsburg, Búdös, Schässburg (Kokelufer). Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

(Bessopora.)

soror Thoms. Paringul, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.); Nagybagymás, Bucsecs (Deubel).

Deubeli Bernh. Bucsecs, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

annularis Mannh. Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay); Zalatna, Schässburg, Balánbánya, Búdös, Borszék (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs, Rodnagebirge (Deubel).

brachyptera Steph. Rodnagebirge (c. a.).

231. *Platyola* *Rej.*

fusicornis Rey. Marosujvár (Mai. c. a.).

232. *Stichoglossa* *Fairm.*

(*Stichoglossa* s. str.)

semirufa Er. Hermannstadt (Ormay); Baassen (c. a.).

(*Dexiogra*.)

corticina Er. Hermannstadt (Bielz); Malomviz, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

(*Ischnoglossa*.)

prolixa Grav. Bucsecs, Bistra (c. a.); Königstein, Nagybagymás (Deubel).

233. *Thiasophila* *Kraatz.*

angulata Er. Schässburg, Präszaka (Zalatna, in den Nestern der *Formica rufa*, c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

234. *Eurymnusa* *Ganglb.*

crassa Epp. Schässburg, Marosujvár, Unter-Kerz (c. a.).

235. *Cratararea* *Thoms.*

(*Microglossa* Kr. ex parte.)

suturalis Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Zernest (Deubel).

236. *Microglossa* *Kraatz.*

pulla Gyllh. Schässburg (in alten kranken Eichen), Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

gentilis Märk. Reps, Schässburg (bei *Lasius brunneus* in alten Eichen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

marginalis Grav. Honigberg (Altufcr, Deubel).

237. *Homoeusa* *Kr.*

acuminata Märk. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Hátszeg, Schässburg, (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, oft in Gesellschaft der *Euryusa*-Arten, c. a.).

238. *Dinarda* *Mannerh.*

dentata Grav. Klausenburg, Schässburg in den Nestern der *Formica rufa*, c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **Märkeli** Kiesenw. Schässburg (mit der Stammform, c. a.); Kronstadt (Deubel).

239. *Aleochara* *Gravenhorst.*

Die Arten finden sich unter faulenden Pflanzen- und Tierstoffen, einige in den Nestern von Ameisen.

(*Aleochara* s. str.)

curtula Goeze (*fuscipes* Grav.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Mezöség, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermann-

stadt, Hammersdorf (Ormay), Kronstadt (Deubel).

crassicornis Lac. (lateralis Heer). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

laticornis Kr. Hätzeg (Deubel)

lala Grav. Rotenturm (c. a.).

brevipennis Grav. Kronstadt (Deubel)

var. **curta** Sahlb. (fumata Er.) Schässburg, Puj (Hätzeg, c. a.).

(Baryodma.)

intricata Mannh. (hiponetata Er.). Gross-Scheuern, Ober-Sebes, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Baumgarten (Ormay); Rodnageb., Kronstadt (Zinne, Deubel)

morlon Grav. Hermannstadt (Bielz); Rodnageb. (Alpin, Deubel).

iristis Grav. Hätzeg, Hammersdorf, Holzungen (Bielz); Baassen, Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel)

moesta Grav. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Ompolyczatal (bei Karlsburg, in einer Höhle auf den Excrementen von Fledermäusen in grosser Zahl, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Homoeochara.)

sparsa Heer. (succiola Thoms.). Kronstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (Kokolufer), Rotenturm (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

(Polychara.)

lanuginosa Grav. Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

villosa Mannh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely); Schässburg (c. a.).

rufitarsis Heer). Hätzeg (Deubel); Petrosény, Schässburg (c. a.).

sanguinea L. Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

fumata Grav. (mycetophaga Kr.). Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

moerens Gyll. Kronstadt (Deubel).

haematodes Kr. Kerzer Gebirge (Bielz).
Das Vorkommen der *A. haematodes* Kr. bei uns scheint weiteren Nachweises zu bedürfen, da die Art dem südlichsten Europa angehört.

laevigata Gyll. (bisignata Er.). Salzburg, Neudorf b. H. (Bielz); Déva, Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel)

(Ceranota.)

erythroptera Grav. Busecs, Kronstadt (Deubel); Schässburg (Klossel, Eichenmühl, 9. April, c. a.)

(Coprochara.)

bilineata Gyll. Oláhfalva (Bielz); Rodnageb. (c. a.); Busecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

bipustulata L. (nitida Grav.). Salzburg, Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Schässburg, Bistra, Fiecker Geb. (Serbota), Rodnageb. (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

VIII. Pselaphidae.

Faronini.

240. Faronus Aubé.

Latertei Aub. Csukás (am Bachufer in 2 Exemplaren aus Laub gesiebt), Busecs (Deubel).

Raffrayi Lokay. Rodnageb. im September 1910 von Dr. Lokay gesiebt, Acta soc. ent. Bohemiae, VII, 1910, p. 94, fig.)

Euplectini.

241. Sauleyella Reitter.

Schmidtii Mark. Schässburg Fuchsloch, im Mai in einem von Lasius brunneus bewohnten Nussbaum, Breite, September und Oktober in Mehrzahl, im April in einem Exemplar in Eichen, welche von Lasius brunneus bewohnt waren, c. a.)

242. Trimum Aubé.

latipennis Tourn. (det. Reitter). Schässburg Breite, Oktober in alten, von Lasius brunneus bewohnten Eichen, c. a.).

Merkli Reitter (det. Reitter). Schässburg (25. Juli, Reissel, im Mulm und Holz einer Linde, c. a.).

brevicornis Reichenb. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Előpaták, Rotenturm, Karlsburg, Schässburg (c. a.).

carpathicum Sauley. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Hätzeg, Schässburg unter Laub und in Baummulm, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

243. Euplectus Leach.

(Plectophloeus.)

Euplectus cavifrons n. sp. Länge 1 1/4 mm. Schässburg (c. a.).

Euplecto nubigeno affinis, rufotestaceus, nitidus, subtilissime pubescens; capite transverso, temporibus rotundatis, impunctato, nitido, postice utrinque fovea rotundo impresso, antice transverse profunde sulcato, margine anteriore modice elevato, crassato, medio marginis postice late sinuato, utrinque sulfoveolato. Antennae validae, articulis duobus basilibus incrassatis, 3. subquadrato, ultimis valde transversis. Prothorax laevis, subcordatus, medio foveolis duabus latis, rotundis obsitus. Elytra latitudini posticae aequilonga, lateribus parum rotundato-amplata, stria humerali ante medium evanescente. Abdomen tergitis anterioribus haut lineatum, subtilissime dense coriaceum, modice nitidum.

Unter den Arten des Subgenus *Plectophloeus* besitzt keine andere eine ähnliche Stirnskulptur. In Gestalt und Färbung steht sie dem *Euplectus nubigena* nahe, ist aber etwas kleiner als die kleinsten Stücke derselben und während bei *E. nubigena* die beiden vorderen Stirngrübchen durch eine tiefe Vertiefung verbunden sind, haben wir bei dieser Art eine stark vertiefte Querrinne, deren wulstiger Vorderrand auf der hinteren Seite in der Mitte

breit und seicht, aber deutlich ausgerandet ist, und in den äussersten Ecken der Furche befindet sich beiderseits je ein wenig auffälliges seichtes Grübchen. Die beiden hintern Stirngrübchen sind ründlich und isoliert und stehen weder mit der vorderen Furche noch untereinander in Verbindung. Die Fühler sind kräftig und kaum so lang als Kopf und Halsschild zusammengenommen, das vorletzte, stark quere Fühlerglied ist fast ebenso dick als der Knopf. Die beiden mittleren Grübchen des fast herzförmigen Halsschildes sind isoliert, das vordere seichter, ründlich, den Vorderrand nicht erreichend, das hintere etwas tiefer und etwas quer, das Seitengrübchen seicht und mit dem hintern Mittelgrübchen nur undeutlich verbunden.

nubigena Reitter. Kronstadt (Bielz); Csukás, Schässburg (c. a.).

venustus Csiki. Annal. mus. hung. VIII. 1910, Rotenturm (ungar. Nat.-Museum, col. Diener).

ornatifrons Reitter. Siebenbürgen, nahe der rumänischen Grenze (Wiener e. Ztg. XXIX. 151—163. 1910).

Tischeri Aub. (Tischeri Heer.). Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.)

carpathicus Reitter (det. Reitter). Frecker Gebirge (Serbota), Hätzeg, Rotenturm, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

(Euplectus i. sp.)

brunneus Grimmer. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs (Deubel); Csukás, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a., det. Reitter); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

Duponti Aubé. Kronstadt? (Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

bescidicus Reitter (det. Reitter). Csukás (c. a.).

piceus Motsch. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg, Borszék (c. a.).

nanus Reichenb. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Szováta, Unter-Kerz, Schässburg, Marosujvár (c. a., det. Reitter); Rotenturm (Ormay).

sanguineus Denny. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

signatus Reichenb. Kronstadt (Bielz); Schässburg (unter Laub, c. a.).

Felschei Reitter (det. Reitter). Schässburg (alte Eiche bei Lasius brunneus, c. a.).

punctatus Muls. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos (in einem Lindenklötz bei Ameisen, c. a.).

falsus Bed. (intermedius Reitter). Schässburg, Csukás (c. a., det. Reitter).

Karsleni Reichenb. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus), Baassen, Marosujvár, Alsó-Rákos (c. a.).

244. *Bibloplectus* Reitter.

ambiguus Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

245. *Bibloporus* Thoms.

bicolor Denny. Holzmenzen, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Kronstadt, Zalatna, Búdös, Borszék, Schässburg (im Mulm alter Eichen und Buchen, c. a.).

Trichonychini.

246. *Trichonyx* Baudi.

sulcicollis Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde einer vertrockneten Espe, welche von Poner contracta und einer Myrmica-Art bewohnt war), Schässburg (in einer von Lasius brunneus bewohnten Weissbuche, c. a.).

247. *Amauornyx* Reitter.

Märkeli Aub. Hermannstadt, Holzmenzen (Bielz).

Batrisini.

248. *Batrissus* Laporte.

Ormayeri Reitter. Michelsberg (Burg), Rotenturm (Bielz); Schässburg, Szurduk-Pass (in Maulwurfshaufen und unter Steinen bei der gelben Ameise, im Herbst und im Frühjahr, c. a.).

Die Beschreibung des Batr. Ormayeri Reitter bedarf insoweit einer Ergänzung, als weder Reitter noch Ganglbauer in ihren Beschreibungen des feinen, scharfen Dornes Erwähnung tun, welcher beim Männchen an der Unterseite der Mittelschenkel deutlich wahrnehmbar ist, und zwar nicht nur bei den aus der Gegend von Schässburg stammenden Exemplaren, sondern auch bei denen vom Rotenturm- und Szurduk-Pass.

formicarius Aub. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen, Alsó-Rákos, Hätzeg, Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, seltener in Ameisenhaufen der Formica rufa in Eichenwäldern, auch auf der Weissbuche, c. a.); Bistritz (Müller).

249. *Batrisodes* Reitter.

moreanus Reitter (det. Reitter). Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, einmal in einer alten Weissbuche), Baassen, Rosenau (c. a.).

Ich habe unsere Art und vier Weibchen vom Csorbasee in Ungarn mit zwei deutschen Stücken, mir von Reitter freundlichst übersendet, das ♀ aus Baiern stammend und von Flach gesammelt, verglichen und gefunden, dass B. moreanus sich tatsächlich von B. Delaportei

durch kräftigere Fühler und obsoletes Rückenlältchen auf den Flügeldecken unterscheidet. Der Unterschied im Fühlerbau tritt namentlich beim Weibchen hervor: während bei Delaportei alle Fühlerglieder bis zum achten wenigstens so lang als breit, das vierte und fünfte sogar länger sind, sind die Fühlerglieder des weiblichen moreanus von vier an umso deutlicher quer, je näher sie der Spitze sind, das neunte Glied ist kaum merklich breiter als das achte, die dreigliedrige Keule daher kaum abgesetzt; an der Spitze der männlichen Mittelschienen befindet sich ein deutlicher feiner Sporn. B. moreanus scheint den B. Delaportei im östlichen Europa zu vertreten.

venustus Reichenb. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Hätzeg, Baassen (Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Kronstadt (Deubel).

adnexus Hampe. Csukás, Schässburg (wie der vorige, aber selten); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

exculptus Hampe. Hermannstadt (Bielz)

oculatus Aub. Hermannstadt (Bielz).

Bryaxini.

250. *Brachygluta* Thomson.

xanthoptera Reichenb. Kerzer Gebirge, Tartlau (Bielz); Nagyenyel, Unter-Kerz (c. a.).

fossulata Reichenb. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Heltau, Rotenturm (Ormay); Baassen, Unter-Kerz, Schässburg (c. a., wohl im ganzen Gebiet verbreitet, unter Laub und Gras), Kronstadt (Deubel).

tristis Hampe. Hermannstadt (Bielz); Szováta (auf Salzboden), Schässburg (c. a.); Rodnagelberge (Deubel).

helferi Schmidt. Déva (Bielz); Dees-Akna (c. a.).

haematica Reichenb. Durch das ganze Berg- und Hügelland am Ufer süsser Gewässer.

♂ var. **trigonoprocta** Ganglb. Zusammen mit der Stammform.

♂ var. **sinuata** Aub. Mit der Stammform.

251. *Reichenbachia* Leach.

juncorum Leach. Bastritz (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.).

impressa Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gesprenge, Deubel, c. a.).

autennata Aub. Schässburg (Türkenhüll, im Röhricht einer sumpfigen Stelle in grösserer Anzahl, 24. Oktober, ♂ und ♀, c. a.).

252. *Bryaxis* Sauley.

(*Rybaxis* Sauley.)

longicornis Leach. (sanguinea auct.). Hermannstadt, Michelsberg, Götzenberg, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

Bythinini.

253. *Bythinus* Leach

(*Areopagus*.)

crassicornis Motsch. Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge), Unterkerz, Csukás, Hätzeg, Alsó-Rákös, Rátosnya, Bülös, Rotenturm, Schässburg unter Laub, wohl durch das ganze Gebiet verbreitet); Bucecs (Deubel); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay).

bajulus Hampe. Kronstadt, Bucecs (Bielz); Hätzeg, Alsó-Rákös, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Heltau, Gyógy (Ormay).

♂ var. **Ormayi** Ganglb. Torockzó, Hätzeg, Karlsburg, Rotenturm, Schässburg (c. a.).

reitteri Sauley. Kerzer Gebirge (Bielz); Götzenberg (Ormay); Rotenturm (c. a.); Bucecs, Kelemengebirge, Rodnagelberge (Deubel).

var. **sculptifrons** Reitter. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Borszék, Torockzó (c. a.); Gyógy (Ormay).

carpathicus Sauley. Bucecs (Alpin, Deubel).

Deubel führt wohl den B. carpathicus für den Bucecs an, aber als fraglich; seiner Ansicht nach dürfte auch dieser Bythinus der B. transsylvanicus sein.

transsylvanicus Ganglb. Bucecs (c. a.).

musorum Kiesenw. Kronstadt (Bielz).

femoratus Aub. Kronstadt, Rotenturm (c. a., 3 ♂♂); Hätzeg (Deubel).

Weisei Sauley. Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagelberge (Deubel).

bulbifer Reichenb. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Heltau (Ormay); Unter-Kerz (c. a.).

Curtisi Leach. Hermannstadt (Bielz); Baumgarten, Heltau, Michelsberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Unter-Kerz, Bülös, Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelberge (Deubel).

var. **hungaricus** Reitter. Gyógy (Ormay); Schässburg, Baassen, Rotenturm (c. a.).

nodicornis Aub. Kronstadt (Bielz); Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); Hätzeg, Kerzer Geb. (Bulea), Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.).

Deubeli Ganglb. Rodnagelberge (Ganglbauer, c. a., Deubel); Bülös (c. a.); Bucecs, Nagyagymás (Deubel).

ruthenus Sauley. Negoi (subalpin, Deubel).

acutangulus Reitter. Kronstadt, Bucecs, Hätzeg (Deubel).

securiger Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

macropalpus Aub. (*distinctus* Chaud.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Türkenhill, an sumpfiger Stelle, Oktober, c. a.); Kronstadt (Deubel); S. - Regen (Müller).

Hopffgarteni Reitter. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

lunicornis Reitter. Bucsecs, Rosenauer Gebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Burrelli Denny. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässburg (c. a.).

nigripennis Aub. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Rodnagebirge, Schässburg (c. a.).

Stussineri Reitter. Nagyhagymás (Deubel).

validus Aub. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

puncticollis Denny. Hermannstadt, Unterkarz, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Büdös, Topánfalva (Erzgebirge), Schässburg (c. a.).

254. *Tychus* Leach.

niger Payk. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerz, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Rotenturm, Karlsburg, Kronstadt (Kapellenberg), Schässburg (c. a.); Nagyhagymás, Bucsecs (Deubel).

var. **dichrous** Schmidt. Schässburg (c. a.).

Pselaphini.

255. *Pselaphus* Herbst.

Die Arten werden aus Laub und verwesenden Pflanzenstoffen gesiebt.

Helsei Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék, Rotenturm (c. a.); Kerzer Gebirge, Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Bistritz, Klausenburg (Müller).

mehadiensis Friv. Rotenturm (aus Laub gesiebt, c. a., Deubel).

Ctenistini.

256. *Ctenistes* Reichenbach.

Die Art lebt wie die Pselaphiden.

palpalis Reichenb. Hätzeg, Dobra, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Birthälm (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).

Tyrini.

257. *Tyrus* Aubé.

mucronatus Panz. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Götzenberg, Präsbe (Ormay); Szurduk - Pass, Előpatak, Büdös, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

IX. Clavigeridae.

258. *Claviger* Preysler.

testaceus Preyssl. Hätzeg, Gross-Scheuern, Michelsberg (Burg, Bielz); Rotenturm (in den Nestern der *Lasius flavus*, unter Steinen zusammen mit *Batrhus* Ormay); Szurduk-Pass (c. a.).

longicornis Müll. Götzenberg (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, in einem Baumstrunk bei *Myrmica rubra*, c. a.); S.-Regen (Müller).

X. Scydmaenidae.

Cephenini.

259. *Euthiconus* Reitter.

parallelocollis Saulcy. Kerzer Gebirge (Bielz); Gyógy (Ormay).

260. *Euthia* Stephens.

plicata Gyllenh. Kronstadt (Zinne, Bielz); Wolkendorf b. Kr. (Deubel).

Schaumi Kiesenw. Hätzeg (Longitudo 1'3 mm, 1 ♀, c. a.).

Merkli Simon. Siebenbürgen (Hätzeg?, Catalogus Col. von Heyden etc. 1906, Col. 231).

Deubeli Ganglb. Kronstadt (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, III. Bd. 22).

scydmaenoides Steph. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel).

261. *Cephenium* Müller.

(*Megalodorus*.)

majus Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Borszék (c. a.).

banaticum Ganglb. Kerzer Gebirge (Glashütte, Büdös, Topánfalva (Erzgebirge), Hermannstadt (c. a.); Bodzauer Gebirge, Nagyhagymás (Egyeskö), Schulergebirge (Deubel).

Reitteri Brisout (*laticolle* Reitter). Schieltal, Hermannstadt, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

difficilis Reitter. Kronstadt (Deubel).

carnicum Reitter (*hungaricum* Reitter). Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Zalatna, To-

pánfalva (Erzgebirge), Büdös, Alsó-Rákos, Schuler-Gebirge, Schässburg, Rodnagelberge (c. a.); Bodzaer Gebirge, (Deubel).

thoracicum Müll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz).

carpathicum Sauley. Kronstadt (Zinne, Deubel).

minutissimum Aubé. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

regale Hoidhaus. (Annales mus. nat. hung. 1908, VI, 578). Rotenturm (Lautertal und Ru vadulm, auch im Altal aus Laub gesiebt, c. a., Deubel).

262. *Microtherium Petri*.

Annales mus. nat. hung. 1908, VI, 570.

Herr Kustos Csiki hat (Magyarország faunájához II. köt. 8) den Gattungsnamen *Microtherium* (*Scydmaeniden*) in *Ectea* umgewandelt, weil schon eine Säugertiergattung, *Microtherium* Meyer 1865, den Namen führe. Schon Kiesenwetter nimmt (Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, Annobiden, p. 199, Anm.) anlässlich der Umtaufung der Gattung *Aspidiphorus* in *Coniporus* durch Thomson Stellung gegen dieselbe, indem er die Berechtigung der Umtaufung anzweifelt, nachdem die in Betracht kommenden Genera verschiedenen Ordnungen der Arthropoden (Insecta — Crustacea) angehören. Umsoweniger erscheint mir in diesem Falle die Umtaufung berechtigt, nachdem die beiden in Betracht kommenden Genera verschiedenen Tierkreisen angehören (Vertebrata — Arthropoda), und ich behalte daher den ursprünglichen Namen bei, da eine Kollision der Namen ausgeschlossen erscheint.

tenue Petri. Rotenturm (Lauterburg, unter tiefen Blätterlagen Anfang Juni von mir gesammelt, c. a., 1 Exemplar).

Stenichnus.

263. *Neuraphes Thomson*.

angulatus Müll. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Seehofberg, Sudabhang, unter Laub, c. a.)

elongatulus Müll. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz), Malomviz, Topánfalva (Erzgebirge), Büdös, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Porumbacher Geb., Präsbe, Gyógy (Ormay); Kronstadt (Zinne), Rodnagelberge (Deubel)

(*Pararaphes*.)

coronatus Salzb. Frecker Gebirge (Serbota). Bucsecs (c. a., aus Laub und Grasbüscheln und gesiebt). Schulergebirge (Deubel).

Deubeli Ganglb. Negoi (Umgebung der Schutzhütte gesiebt, Deubel).

(*Scydmaraphes*.)

leptocerus Reitter. Hätzeg (c. a.).

Dieneri Csiki. Anal. mus. hung. VIII. 1910, Rotenturm (c. a., ung. Nat. Mus., col. Diener).

geticus Sauley. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Ormay); Hätzeg (c. a.).

subparallelus Sauley. Kronstadt, Alsó-Rákos (Lepe, Deubel). Schässburg (c. a.).

latitans Sauley. Kronstadt (Bielz); Gyógy-Bad, Ormay; Schässburg (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen des *Neuraphes latitans* in Kronstadt, was vielleicht nicht gerechtfertigt ist, da Reitter als Fundort die „transylvanischen Alpen“ angibt.

nigrescens Reitter. Schässburg (c. a., vgl. Reitter)

264. *Stenichnus Thomson*.

(*Scydmaenus auct.*)

(*Cyrtoscydms*.)

Godarli Latr. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Szurdok-Pass, Alsó-Rákos in alten Eichen bei *Lasius brunneus*), Rotenturm (c. a., Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

seutellaris Müll. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Witeberg, aus Laub gesiebt, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Rodnagelberge (Deubel).

cellaris Müll. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Borszék, Schässburg in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Rodnagelberge, Nagybagymás (Deubel)

pusillus Müll. Schässburg (Breite, in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).

(*Stenichnus* s. str.)

exilis Er. Kerzer Gebirge (Bulea), Schässburg (Breite in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel)

265. *Euconnus Thomson*.

(*Napochus*.)

claviger Müll. Hermannstadt, Schässburg (Klossel unter Eichenrinde bei Ameisen, c. a.)

Maeklini Mannh. Gölzenberg (Bielz)

(*Spanioconnus*.)

Wetterhali Gyllh. Hätzeg, Hermannstadt, Unter-Kerz (Bielz); Karlsburg, Schässburg (unter Laub und Gras im Frühjahr besonders häufig); Rotenturm (Ormay); S.-Regen, Bistritz (Müller).

nanus Schaum. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Breite, in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.).

(*Euconnus* i. sp.)

Motschulskyi Strm. Durch das ganze Gebiet verbreitet in Wäldern unter Laub, Rinde, oft in Gesellschaft von *Lasius brunneus*).

var. **rufescens** Ganglb. (Kiesenwetteri Reitter). Zusammen mit der Stammform.

denticornis Müll. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge (Bielz);

Gyógy (Ormay); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagerbirge, Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

rutilipennis Müll. Kronstadt (Gespreng, an den Wurzeln der Stumpfpflanzen, Deubel).

hirticollis Ill. Hermannstadt, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Fuchsloch aus Laub, Kokelufur aus Geniste gesiebt, c. a.) (Tetramelus.)

transsylvanicus Sauley. Durch das ganze Gebiet in Wäldern unter Laub, Rinde, in alten von Ameisen bewohnten Bäumen.

oblongus Sturm. Gross-Scheuern, Neudorf b. Il. (Bielz).

Ich habe diese Art nie gesammelt und glaube kaum, dass sie bei uns vorkommt; jedenfalls muss sie neuerdings nachgewiesen werden.

pubicollis Müll. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz).

Dasselbe gilt von *E. pubicollis* Müll., der bei uns durch den *E. transsylvanicus* vertreten zu sein scheint.

styriacus Grim. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Präse, Porumbacher Gebirge (Ormay); Balánbánya (Egyeskő), Borszék, Ratosnya, Schulergebirge (c. a.); Rodnagerbirge, Nagyhagymás (Deubel).

Scydmaenini.

266. *Scydmaenus Latreille*.

(*Scydmaenus s. str.*)

tarsatus Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (in Gärten unter faulenden vegetabilischen Stoffen oft in grosser Zahl, namentlich im ersten Frühjahr, c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

(Cholerus.)

rufus Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (im Holze und unter der Rinde alter Eichen und anderer Bäume in Kolonien der *Lasius brunneus*, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Perrisi Reitter. Schässburg (in alten Eichen, wie der vorige, oft mit ihm zusammen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hellwigi Herbst. Hermannstadt, Holzmenzen, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Előpatak, Schässburg, Alsó-Rákös (wie die beiden vorigen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Clidicini.

267. *Leptomastax Pirazzoli*.

mehadiensis Friv. Rotenturm (Lautertal und im Tale des Riu vadului in 2 Exemplaren aus Laub gesiebt, einmal Anfang Juni, das zweitemal April, c. a. Deubel).

XI. Silphidae.

Leptoderinae.

Pholeuonini.

268. *Pholeuon Hampe*.

(*Parapholeuon*.)

hungaricum Csiki. Lucia-Höhle bei Szohadol (Unterweissenburger Komitat, Ung. Nat. Museum).

Oryotini.

269. *Drimeotus Müll.*

Ormayi Reitter. Bedelö-Höhle bei Szent-György im Erzgebirge (c. a.). Die Tiere krochen auf feuchten Tropfsteinen und Höhlenwänden herum.

Bathyscelini.

270. *Bathyscia Schioedle*.

Merkli Friv. Malomviz (Lanka negru unter einem tief eingebetteten Steine, Deubel).

Cholevinae.

271. *Choleva Latreille*.

spadicea Sturm. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchsloch aus Laub gesiebt, c. a.).

oblonga Latr. (intermedia Kr.). Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Marosujvár (Ormay); Schulergebirge, Zernest (Deubel).

Sturmi Bris. Rotenturm (c. a.).

elongata Payk. (angustata Sturm). Hermannstadt, Neudorf b. H. (Bielz).

cisteloides Fröhl. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (c. a.); Bistritz (Müller).

oresistropa Ganglb. Rodnagerbirge (von Ganglbauer und Deubel auf der höchsten Spitze des Kuhhorn aus abgehackten, dann längere Zeit liegen gelassenen Grashbüscheln gesiebt, c. a.).

272. *Nargus Thomson*.

velox Spence. Michelsberg (Bielz); Schässburg (Türkenhill an einem verpilzten Weidenstumpf, Oktober, c. a.); Klausenburg (Müller).

badius Sturm. Zibinsgebirge (Bielz).

Witkini Spence. Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Csukás, Schässburg (aus Laub gesiebt, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

brunneus Sturm. Schässburg (aus Laub gesiebt im Klossel, Fuchsloch und Scherkes, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

anisotomoides Spence. Schässburg Fuchslöcher, aus Laub gesiebt, c. a.).

273. *Catopomorphus Aubé*.

(*Attaphilus*.)

arenarius Hampe Hammersdorf (Bielz). (Soll bei *Aphaenogaster structor* Latr. leben und zur heissen Mittagszeit um die von ihm bewohnten Erdlöcher schwärmen).

274. *Catops Payk.*

(*Sciodrepa*.)

umbrinus Er. Hermannstadt, Grossscheuern (Bielz); Schässburg (Kälbertritt an einer Hecke aus Laub gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Watsoni Spence. Hermannstadt, Grossscheuern, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Michelsberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Ompolyzatal (Karlsburg); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Lasio-catops*.)

alpinus Gyll. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Malomviz, Rotenturm (bei einem Hundekadaver, c. a.); Schulergebirge, Zernest (Deubel); Kelemengebirge (Müller).

Reps und Schässburg als Fundorte sind zu streichen.

(*Catops s. str.*)

picipes F. Götzenberg (Bielz); Rotenturm, Csukás, Schässburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

fuscus Panz. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

nigricans Spence. Schässburg unter Laub, Rotenturm (bei einem Hundekadaver, c. a.); Bucsecs (Valeu Jeppi, Deubel).

fuliginosus Er. Schässburg, Rotenturm, Szováta (c. a.); Negoi, Rodnagebirge, Hätzeg (Deubel).

grandicollis Er. Rotenturm, Schässburg (Kälbertritt in Hecken aus Laub gesiebt, c. a.); Bereczk (Ojtos-Pass Méhely).

nigrita Er. ? *affinis* Steph.). Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Malomviz, Schulergebirge, Csukás, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Michelsberg, Rotenturm (Ormay); Hätzeg (Deubel).

coracinus Kellner. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Reissel aus Laub gesiebt), Rotenturm, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

morio F. Csukás (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

neglectus Kr. Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

chrysomeloides Panz. Kronstadt (Zinne), Honigberg (Deubel).

longulus Kella. Schulergebirge (an feuchter Stelle unter Gras, c. a.).

trishs Panz. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne), Nagybagymás, Schulergebirge (Deubel).
var. **ventricosus** Weise. Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Kronstadt (c. a.).

275. *Anemadus Reitter*.

strigosus Kr. Hermannstadt, Grossscheuern (Bielz); Baassen (c. a.).

276. *Nemadus Thoms.*

colonoides Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

277. *Ptomaphagus Illig.*

varicornis Rosenh. Hermannstadt an ausgelegtem Fleischköder gefangen, Ormay); Schässburg, Büdös (aus verpilztem Laube gesiebt, c. a.); Vargastal, Schulergebirge (Deubel).

subvillosus Goeze (*sericeus* Panz.). Grossscheuern, Kronstadt, S.-Regen (Bielz). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

sericatus Chaud. Hermannstadt, Schässburg, Baassen (c. a.), aus Laub gesiebt); Kronstadt (Deubel).

278. *Colon Herbst*.

(*Mylocellus*.)

latum Kr. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Borszék, Büdös, Csukás, Schässburg (Witeberg, Fuchslöcher aus Laub, Kokelufur aus angeschwemmtem, schimmeligem Detritus gesiebt, c. a.); Bucsecs, Dues, Rodnagebirge, Nagybagymás (Deubel).

affine Sturm. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne), Bucsecs (subalpin, Deubel).

fuscicornis Kr. Batosnya, Schässburg Fuchslöcher, auf einer Wiese am Waldrande gegen Abend gestreift, 30. Juli c. a.); Kronstadt (Schneckenberg, Deubel).

dentipes Sahlb. Königstein (Crepatura, Deubel); Borszék (c. a.). Das Borszéker Exemplar meiner Sammlung ist ganz hellrötlich-gelb mit etwas dunklerem Kopf.

brunneum Latr. Hermannstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

denticulatum Kr. Schässburg (Kokelufur unter dem Witeberg, 2 ♂♂ aus Laub gesiebt, 6. August 1910, c. a.)

(*Colon l. sp.*)

fuscum Er. (*serripes* Ganglb.). Grossscheuern (Bielz); Kronstadt (Zinne), Schulergebirge, Nagybagymás (Deubel); Borszék (c. a.)

Wir besitzen nur *C. fuscum* Er., der früher als Synonym zu *C. serripes* Sahlb. gehörte. Letzterer ist gegenwärtig Synonym des *C. viennense* Hbst.

Silphinae.

279. *Necrophorus Fabr.*

germanicus L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

var. **speciosus** Schulze. Kronstadt (Deubel).

humator Goeze. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

interruptus Steph. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Balánbánya (c. a.); Zoodtal (Ormay).

investigator Zett. Präsbe, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

vespilloides Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

vespillo L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

vestigator Herschel. Mediasch, Mezöség (Záh, Bielz).

280. *Necrodes Leach.*

littoralis L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Előpatak (c. a.).

281. *Tanatophilus Samouelle.*

sinuatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

rugosus L. Ebenso verbreitet wie der vorige.

282. *Oeceoptoma Samouelle.*

thoracicum L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

283. *Blitophaga Reitter.*

alpicola Küst. Zibins-Gebirge, Kristest, Sterpu (Dealu negru), Surul, Fogarascher Gebirge, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Retjezat, Paringul, Rodnagelbirge (c. a.).

(Aclypea.)

undata Müll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

284. *Xilodrepa Thoms.*

4-punctata Schreber. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet auf Gebüsch, zuweilen unter Laub.

285. *Silpha Linné.*

carinata Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet, besonders in Gebirgswäldern.

oblonga Küst. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (?), Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hammersdorf, Salzburg (Ormay); Retjezat, Torockó, Rodnagelbirge (c. a.).

obscura L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

orientalis Brull. Bistra, Torockó (Erzgebirge), Dees, Bucsecs (c. a.).

granulata Thunbg. (tristis Ill.). Schulergebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

tirolensis Laich.

var. **nigrita** Creutz. Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz).

286. *Ablattaria Reitter.*

laevigata F. Kronstadt, Mediasch, Vásárhely, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár, Timód (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg, Baassen (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

287. *Phosphuga Leach.*

atrata L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auch in den Gebirgswäldern.

a. **brunnea** Herbst. Kronstadt, Tusnád, Rodnagelbirge, wohl überall, wo die Stammform sich findet.

Agyrtini.

288. *Necrophilus Latr.*

subterraneus Dahl. Präsbe (Bielz); Frecker Gebirge (Ormay); Rodnagel-, Kerzer Gebirge (Bulea, am häufigsten in den Gehäusen von *Urtica arbutorum* und *aethiops*, c. a.); Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

289. *Agyrtus Fröhl.*

bicolor Lap. Rotenturm (unter Moos an einem Baumstamm, Deubel).

XII. Liodidae.

Liodini.

290. *Triarthron Schmidt.*

Maerkeli Schmidt. Kronstadt (Zinne, Deubel).

291. *Hydnobius Schmidt.*

multistriatus Gyll. Rodnagelbirge, Oberkerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Schneckenberg, nicht selten, Deubel).

punctatus Sturm. Schässburg (c. a., Türkenhill, an sumpfiger Stelle); Kronstadt (Deubel).

var. **punctatissimus** Steph. Schulergebirge (Deubel).

punctulatus Hampe. Sielenbürgen (Catalogus Coleopt. Europae Heyden 1906. c. 251).

292. *Ilodes Latreille.*

- cinnamomea* Panz. Zibinsgebirge, Marosgebirge (Bielz); Schässsburg Fuchsbloch aus Laub gesiebt, 13. Juli, (c. a.).
- sllesiaca* Kr. Rodnagelbirge (c. a.); Schulergebirge (Deubel); Zibinsgeb. (Müller).
- macropus* Rye. Kronstadt (Deubel).
- picea* Illig. Rodnagelbirge (c. a.); Busecs (Deubel).
- brunnea* Sturm. Schässsburg Schleifengraben, 30. Juli, (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- dubia* Kuzel. Kerzergebirge (Bielz); Schässsburg (Witberg, aus Laub gesiebt, 2. Juli, (c. a.); Nagybagymás, Busecs, Schulergebirge (Deubel).
- a *bicolor* Schmidt. Schässsburg (c. a.).
- var. *obesa* Schmidt. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- flavescens* Schmidt. Kronstadt (Zinne, Schulergebirge (Deubel).
- curla* Faun. Stolzenburg (Ormay).
- calcarata* Er. Präsbe (Bielz); Borszék, Schässsburg Kokelufer, Weidenelensch unter Laub, 21. Mai, (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. *picta* Reiche. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- ovalis* Schmidt. Balánbánya, Retjezat, Schässsburg (15. Juni, (c. a.); Zernest (Deubel).
- rugosa* Steph. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- Skalitzkyi* Ganglb. Busecs, Königstein (Crepatura, Deubel).
- (Pteromerula.)
- rotundata* Er. Retjezat (c. a.).
- (Oosphacraula.)
- badia* Strm. Kerzer Gebirge, Sachs.-Regen (Bielz); Rotenturm (aus Blättern gesiebt, (c. a.).
- carpathica* Ganglb. Rodnagelbirge aus abgehackten und längere Zeit liegen gelassenen Grasbüscheln gesiebt, Ganglbauer, (Deubel).
- parvula* Sahlb. Schässsburg Schleifengraben, aus Laub gesiebt, 30. Juli Borszék, Ober-Kerz. Glashütte, (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- flavicornis* Bris. Schässsburg (Furkenhill, an sumpfiger Stelle, 21. Oktober, (c. a.).
- (Orosphaerula.)
- nitida* Reitter. Rodnagelbirge (alpin, Deubel).

293. *Agaricophagus Schmidl.*

- cephalotes* Schmidl. Kronstadt (Hangenstein, Deubel).

294. *Colenis Erichs.*

- immunda* Sturm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet unter Laub.

295. *Cyrtusa Erichs.*

- Fussi* Seidl. Hermannstadt (Seidlitz); Kronstadt (Florisas, Deubel).
- minuta* Ahrens. Marosujvár Mai, (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- pauvilla* Schmidl. Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässsburg (29. Juli, Fuchsbloch, aus Laub und Moos gesiebt, (c. a.).

Agathidini.

296. *Anisotoma Illig.*

- humeralis* F. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässsburg Breife, Eichenschwämme, (c. a.).
- var. *clavipes* Herbst. Rotenturm (c. a.).
- var. *globosa* Payk. Zalatna (c. a.); Hät-szeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).
- axillaris* Gyll. Götzenberg, Bükszad, S.-Regen (Bielz); Bistra, Előpatak, Nussbach (c. a.); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel).
- glabra* Kugel. Zibinsgebirge, Kronstadt, Kerzer Gebirge, Hargita (Bielz); Bistra, Előpatak, Ober-Kerz, Schässsburg Bükszad (c. a.); Nagybagymás (Deubel).
- orbicularis* Herbst. Marpo, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz), Unterkerz, Hät-szeg, Szováta, Budös, Schässsburg (c. a.); Porumbacher Gebirge (Ormay).
- castanea* Herbst. Kerzer Geb., Kronstadt, Sachs.-Regen (Bielz). Nagybagymás, Busecs (Deubel).
- serricornis* Gyll. Schässsburg Breife, alte Eiche, Mai, (c. a.).

297. *Amphicyllis Erichs.*

- globus* F. Branischwald b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Beltan, Gyógy (Ormay); Schässsburg, Rotenturm, Budös, Ratosnya, Rodnagelbirge (c. a.); Nagybagymás, Hät-szeg (Deubel).
- var. *ferrugineus* Strm. Kerzer Geb., Gyógy (Ormay); Schässsburg, Ober-Kerz (Glashütte), Ratosnya, Budös (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- globiformis* Sahlb. Hermannstadt (Ormay); Budös (c. a.); Hät-szeg (Deubel).

298. *Cystoplastus Reitter.*

- seriepunctatus* Bres. Kronstadt? (Deubel).

299. *Agathidium Illig.*

- Die Arten leben an abgestorbenen; verpilzten Baumstämmen und in verpilztem Laub.
- (Cyphoclebe.)

- nigripenne* F. Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Malomviz (Lunka negru), Schässsburg (Atelsbill auf Eiche, welche von *Lasius brunneus* bewohnt war, (c. a.); Königstein, Schuler-Gebirge, Busecs, Nagybagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

atrum Payk. Holzmengen, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Oláhfalu, Borszék (Bielz); Rotenturm, Csukás, Büdös, Ratosnya, Bükszád, Szováta, Baassen (c. a.); Hätzeg (Deubel); Hermannstadt, Heltau (Ormay).

seminulum L. S.-Regen, Borszék (Bielz); Rotenturm, Malomviz, Büdös, Szováta, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

laevigatum Er. Reys (Bielz); Schässburg, Büdös, Ratosnya (c. a.); Nagyhagy-más, Vargyastal, Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

badium Er. Kerzer Gebirge, Sachs.-Regen (Bielz); Bistra, Präszaka (Zalatna), Büdös, Alsó-Rákos, Schässburg, Szováta, Rodnagelirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schuler-Gebirge, Bucsecs (Deubel); Präshe, Schanta (Ormay).

(Neocleble.)

banaticum Reitter. Rodnagelirge, Büdös, Balánbánya, Rotenturm, Bistra (c. a.).

nudum Hampe. Kronstadt, Zernest (Deubel).

marginatum Strm. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

varians Beck. (pallidum Gyll.). Kerzer Gebirge, Präshe (Ormay); Präszaka (Zalatna), Büdös, Schässburg (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

rotundatum Gyll. Präshe, Kerzer Gebirge (Bielz); Balánbánya, Bistra (c. a.); Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

bescidicum Reitter. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.), 1 Exemplar, das sich tatsächlich nur durch die helle, rötlich-gelbe Färbung von *A. rotundatum* Gyll. zu unterscheiden scheint; die Absonderung des Clypeus ist auch wahrnehmbar, zwar fein, aber ebenso sichtbar, wie bei manchen Exemplaren des *A. rotundatum*.

mandibulare Strm. Schielthal, Präshe, Kerzer Gebirge, Fogarasz, Kronstadt (Bielz); Csukás, Rotenturm, Büdös, Schässburg (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).

confusum Bris. Büdös, Schuler-Gebirge (c. a.).

polonicum Wank. (piceum Bielz teste Seidlitz). Hätzeg (Bielz).

Nach Seidlitz (F. trans. 316) soll das von Bielz angeführte *A. piceum* Er. gleich *A. polonicum* Wank. sein. Nachdem jedoch *A. polonicum* Wank. nach dem Kataloge Catalogus col. Europae etc. 1906, c. 254) gleich *A. piceum* Thoms. nec Erichs. ist, so wäre *A. piceum* Er. aus unserer Fauna zu streichen. Gebrügens ist im Kataloge anstatt *A. piceum* Thoms. zu setzen *A. polonicum* Wank., da der Name *piceum* bereits von Erichson vergeben ist.

plagiatum Gyll. Präshe, Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás (c. a.); Bodzaer Gebirge, Rodnagelirge (Deubel).

(Saccocleble.)

nigrinum Sturm. Schässburg (1 Exemplar, c. a.); Nagyhagy-más (Deubel).

Deubel teilt mir mit, dass sein von Nagyhagy-más stammendes Exemplar von Dr. Krauss mit Bestimmtheit als *A. nigrinum* Strm., von Dr. Holdhaus jedoch als *A. rhinoceros* Sharp. determiniert worden sei.

discoideum Er. Michelsberg, Kerzer Geb. (Bielz); Csukás (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel)

XIII. Clambidae.

300. Calyptomerus Redtenb.

alpestris Redtenb. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, April, c. a.); Bucsecs, Schulergebirge, Rodnagelirge (Deubel).

dubius Marsh. Hätzeg (1 Ex., c. a.).

301. Clambus Fischer.

Die Arten werden aus verwesenden Pflanzenstoffen; Laub gesiebt.

minutus Strm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyastal, Rodnagelirge (Deubel).

punctulum Beck. Schässburg (Kokelufer, Hattergraben), Rodnagelirge (c. a.); Hätzeg (Deubel).

armadillo Deg. (atomarius Sturm). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Atelschill, Kokelufer), Rotenturm (c. a.).

pubescens Redtenb. Rotenturm (Altufer, Bielz); Schässburg (20. Februar in grösserer Anzahl aus verwesenden Pflanzenstoffen im Hausgarten gesiebt, c. a.).

XIV. Leptinidae.

302. Leptinus Müll.

testaceus Müll. Klausenburg, Schässburg (am Fusse alter Eichen, wahrscheinlich in den Gängen der Haselmaus); Königstein (Ru.-Schucht, unter einem Steine, unter welchem sich ein Mausest befand, Deubel).

XV. Corylophidae.

303. Sarcium Leconte.

pusillum Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz).

brunneum Bris. Kerzer Gebirge (Bielz); Hätzeg, Rotenturm, Schässburg (unter verwesenden Pflanzenstoffen, c. a.).

304. *Arthrolips Wollaston.*

obscurus Sahlb. Előpatak, Rotenturm (Ormay, im Mulm eines Buchenstumpfes); Előpatak (1 ♀, bei welchem die zwei letzten und die Hälfte des drittletzten Abdominalsegmentes vorragen unter den Flügeldecken, wodurch das Tier an gewisse Nitulinen erinnert).
piceus Comoll. Siebenbürgen (nach Seidlitz von Reitter aus Laub gesiebt).

305. *Sericoderus Steph.*

lateralis Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Tartlau (Deubel); Schässburg, Rotenturm (c. a.).
Revelieri Reitter. Schässburg, Rotenturm, Hätzeg (c. a.).

306. *Corylophus Stephens.*

cassidoides Marsh. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (Kokelufer im angeschwemmten Geniste, c. a.); Kronstadt (Gesprenge, Deubel).

307. *Orthoperus Stephens.*

punctatus Wankow. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zimmer, Alsó-Rákos (Deubel)).
punctulatus Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Büdös, Hätzeg, Schässburg (Atelshill, Kokelufer in angeschwemmtem Geniste, c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel).
brunnipes Gyll. Hermannstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (in morschem Lindenholz, Fuchslotz und Breite in Eichenmulm, 15. April, c. a.).
atomus Gyll. Baassen, Schässburg (Atelshill, Kokelufer, 13. Mai, c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel).
anxius Rey. Hermannstadt (Bielz).

XVI. *Sphaeriidae.*

308. *Sphaerius Walll.*

acaroides Walll. Schässburg (Atelshill, Kokelufer im Geniste, 3. November), Unter-Kerz (Klosterleichen, ein Pärchen aus Grasbüscheln in Copula gesiebt, 10. August, c. a.).

XVII. *Trichopterygidae.*

Diese kleinen Käfer leben in verwesenden Tier- und Pflanzenstoffen, schwärmen aber bei Sonnenuntergang und können auch im Fluge gefangen werden.

Ptenidium.

309. *Nossidium Erichs.*

pilosellum Marsh. Hermannstadt, Gross-Schenk, S-Regen (Bielz); Schässburg (aus Eichenmulm gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

310. *Ptenidium Erichs.*

(Gressnerium.)

Gressneri Er. Kerzer Gebirge (Bielz).

(Matthewsium.)

turgidum Thoms. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge, Schässburg (Nester der *Formica rufa*, c. a.).

myrmecophilum Motsch. Torockzó (Erzgebirge). Baassen, Schässburg (in morschem, von *Lasius brunneus* bewohnten Lindenholz, c. a.); Kronstadt (Deubel).

pusillum Gyll. (evanescens Marsh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Scheuern, S-Regen (Bielz); Maros-njvár, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

Reitteri Flach. Schässburg (Kokelufer, aus Geniste gesiebt, 3. November, c. a.).

nilitum Heer. Schässburg (c. a.); Tartlau (Deubel).

Ptilini.

311. *Euryptilium Matthews.*

marginalum Aub. Unter-Kerz (c. a.).

312. *Ptilium Flach.*

Kunzei Heer. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
fuscum Er. Schässburg (Bielz).

313. *Ptilium Erichs.*

(Millidium.)

minutissimum Web. Hermannstadt (Bielz).

Ptinellini.

314. *Ptinella Motsch.*

(Neuglenes Thoms.)

aptera Guer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz).

tenella Er. Schässburg (Breite, aus dem morschem Holze und der Rinde eines Eichenstumpfes gesiebt, c. a.).

var. **biimpressa** Reitter. Schässburg (zusammen mit der Stammform, c. a.).

315. *Pteryx Matthews*

(Aderces Thoms.)

suturalis Heer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Baassen, Karlsburg, Hätzeg, Schässburg (Kokelufer aus Geniste im November, Witeberg im März, Siechhofberg im Mai aus Laub gesiebt, c. a.).

Trichopterygini.

316. *Nephaes Thomson.*

Titan Newm. Büdös, Csukás, Unter-Kerz, Schässburg (Oktober, aus morschem Holze alter Eichen gesiebt, c. a.).

317. *Trichopteryx Kirby.*

(*Ctenopteryx*.)

grandicollis Mannh. Schässburg (Fuchsloch, 18. Mai, c. a.).

Montandoni Allib. Hermannstadt (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

(*Trichopteryx* i. sp.)

thoracica Waltl. Unter-Kerz, Rodnagebirge (c. a.).

alomaria Dey. Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg, Bistra, Rotenturm (c. a.).

intermedia Gilm. Rodnagebirge, Schulergebirge, Schässburg (Siechhofberg, 18. Februar aus Laub gesiebt, c. a.).

fascicularis Herbst. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

suffocata Hallid. Rodnagebirge (c. a.).

brevipennis Er. (*longicornis* Matth., *pumila* Er.). Harbachufer, S.-Regen, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Michelsberg (Ormay); Schässburg (Kokeluf, aus Geniste gesiebt, 3. November, c. a.).

sericans Heer. Schässburg (Atelshill aus Laub, Garten, aus verwesenden Pflanzen in grosser Anzahl gesiebt, c. a.).

dispar Matth. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

XVIII. Scaphidiidae.

Die Arten leben vorwiegend auf Baumpilzen.

Scaphidiini.

318. *Scaphium Kirby.*

immaculatum Oliv. Präsche (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

319. *Scaphidium.*

4-maculatum Oliv. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Scaphisomini.

320. *Scaphisoma Leach.*

agaricinum L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

subalpinum Reitter. Kronstadt (Bielz); Zalatna, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Zoodgeb. (Ormay); Kelemengebirge (Müller).

assimile Er. Retjezat, Kerzer Geb. (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

boleti Panz. Kronstadt (Bielz); Búdös (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Vargyas-Tal (Deubel); S.-Regen (Müller).

(*Caryoscapa*.)

limbatum Er. Hätzeg, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glaslütte), Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Schanta (Ormay).

XIX. Histeridae.

Holopletini.

321. *Holopleta Payk.*

plana Sulz. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde einer abgestorbenen Espe in grosser Anzahl, Mai, c. a.); Bodola (unter Pappelrinde, Deubel).

322. *Platysoma Leach.*

frontale Payk. Hätzeg, Gross-Scheuern, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék, S.-Regen, Borgeoer Pass (Bielz); Schässburg (in morschem Eichenholz, Bükszád (c. a.).

compressum Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet, unter Baumrinden.

323. *Cylistosoma Levis.*

oblongum F. Talmatschel (Bielz).

angustum Hoffm. Borszék, Borgeoer Pass (Bielz).

324. *Hister Linné.*

Die Arten leben auf verwesenden tierischen und pflanzlichen Stoffen, einige in Ameisennestern. (*Heterognathus*.)

inaequalis Oliv. Hermannstadt, Kronstadt?, S.-Regen (Bielz); Előpatak (Ormay); Szunyokszék, Karlsburg (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

4-maculatus L. Hätzeg, Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Nagyenyed, Nagylak, Tinód, Magyarforró (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Marosujvár (c. a.).

helluo Truqui. Zood (Bielz); Hätzeg (Deubel).

unicolor L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Szunyokszék (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

cadaverinus Hoffm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

striola Sahlb. (*succicola* Thoms.). Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Noa), Beczka (Méhely).

terricola Germ. Hermannstadt, Dees (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

stercorarius Hoffm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

bipustulatus Schrank. (*fimetarius* Herbst). Hammersdorf, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

purpurascens Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

ruficornis Grimm. Bálványos bei Torja (Méhely); Kronstadt (Deubel).

- marginatus** Er. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz).
neglectus Germ. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg (Bielz), Karlsburg, Klausenburg (c. a.).
ventralis Marsh. Hätzeg (Bielz), Rossetan (Deubel).
carbonarius Hoffm. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Bakszád (Bielz), Klausenburg, Karlsburg, Schässburg (c. a.), Nagvenvel, Szamosujvár (Ormay).
quadrinotatus Scriba. Hätzeg, Nendorf b. H., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz), Karlsburg, Klausenburg, Schässburg, Nöcker-Erdisch (c. a.).
sinuatus Illig. Dusch. Zibinsgebirge, Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz), Szamosujvár (Ormay).
sepulchralis Er. Stolzenburg, Zakelsberg, Ormay, Schässburg (c. a.).
funestus Er. Hermannstadt, Stolzenburg, Zakelsberg, Ormay, Križba (Burzenland, Mchely).
bisexstriatus F. Unter-Kerz, Sächs.-Regen (Bielz), Kronstadt (c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay) (Attholz).
12-striatus Schrank. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
 var. **14-striatus** Gyll. Schässburg (c. a.).
bimaculatus L. Hätzeg, Marktscheiken, Tartan, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Deubel).
corvinus Germ. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kastenholz, Marpod, Kronstadt, Schässburg (Bielz), Karlsburg, Klausenburg (c. a.).

325. *Epiurus* Erichs.

Lebt unter Baumrinde.

- italicus** Payk. Rotenturm (Ormay).

326. *Dendrophilus* Leach.

- punctatus** Herbst. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Hätzeg, Marosujvár in alten Eichen bei Ameisen, (c. a.), Kronstadt (Deubel), Brad (Ormay).
pygmaeus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákös, Szurdok-Pass (c. a., in den Nestern der *Formica rufa*); Kronstadt (Deubel).

327. *Paromalus* Erichs.

Die Arten leben unter Baumrinden.

- complanatus** Panz. Hätzeg (Bielz).
parallelepipedus Herbst. Gross-Scheuern, Talmesch, S.-Regen, Borgoer Pass (Bielz); Kronstadt (c. a.); Nagybagy-más (Deubel); Kerzer Geb. (Ormay).
flavicornis Hbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, namentlich unter Eichenrinde.

Hetaerini.

328. *Hetaerius* Erichs.

- ferrugineus** Ol. Hätzeg (Bielz); Schässburg aus dem Neste der *Formica rufa* gesiebt, (c. a.); Hengberg (Deubel); Ratosnya (bei Ameisen, Müller).

Saprinini.

329. *Gnathoneus* Duval.

- rotundatus** Kugel. Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeko, Bielz), Kronstadt (Deubel).
punctatus Thoms. Klausenburg (c. a.).

330. *Saprinus* Erichs.

- semipunctatus** F. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).
concinus Motsch. Hermannstadt (Ormay, an Fleischköler).
semistriatus Scriba. nitidus F., Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
politus Brahm. speciosus Latr. Hätzeg (Bielz).
aeneus F. Hätzeg, Talmesch, S.-Regen (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
 var. **immundus** Gyll. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).
sparsutus Salsky. Schässburg (c. a.).
rufipes Payk. Hermannstadt (Bielz).
conjungens Payk. Hätzeg, Hermannstadt, Poplaka, Reps, Marienburg b. Kr., Kronstadt, Mediasch (Bielz), Karlsburg (c. a.).
rugiceps Duft. (quadristriatus Hoffm.). Szakálát, Altufer, Bielz); Schässburg (c. a.).
rugifrons Payk. Talmesch (Bielz); Rotenturm (c. a.).

Abraeini.

331. *Teretrius* Erichs.

- picipes** F. Dobra, Gross-Scheuern (Bielz); Malomvíz (c. a.); Dees, Alsó-Rákös (unter Weidenrinde, Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

332. *Plegaderus* Erichs.

Die Arten leben unter Baumrinden.

- vulneratus** Panz. Torzburger Pass, Borgoer Pass (Bielz); Borszék (Bielz, c. a., unter Lichenrinde, Schu'erg-birge Deubel).
caesus Herbst. Dobra, Hermannstadt, Kastenholz (Bielz); Baassen, Szováta, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
dissectus Er. Hätzeg, Fogarasch (Bielz); Schässburg (Eiche, Biere), Alsó-Rákös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

333. *Onthophilus Leach.*

striatus Forster. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

334. *Abraeus Leach.*

Die Arten leben unter Baumrinden und in altem morschem Holz.

globulus Creutz. Kerzer Gebirge, Marktschelken, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Zoppae. Siebenbürgen.

parvulus Aub. Schässburg (in alten Eichen, c. a.).

granulum Er. (punctatissimum Reitter). Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenauer Gebirge, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

globosus Hoffm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Rotenturm, Szováta (c. a.).

335. *Aeritis Leconte.*

Die Arten leben wie die der vorigen Gattung.
minutus Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kastenholz, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

homoeopathicus Woll. (rheneanus Fuss.). Kerzer Gebirge (Bielz).

nigricornis Hoffm. (seminulum Küst.). Hätzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Kronstadt (Deubel); Schässburg, Garten, 1. März, in vorjährigen Krautstrünken, c. a.).

var. **microscopicus** Reitter. Kerzer Geb. (Bielz).

Palpicornia.

XX. Hydrophilidae.

Helophorinae.

336. *Helephorus Fabr.*

(*Empleurus.*)

nubilus F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Mediasch, Reps, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Trichelophorus.*)

micans Fald. Déva, Deesakna (c. a.).

(*Megalephorus.*)

aquaticus L. Durch das ganze Berg- und Hüelland verbreitet.

var. **aequalis** Thoms. Schässburg, Kronstadt (c. a.).

(*Atractelophorus.*)

avernicus Muls. Kerzer Gebirge (Lakuz, Bielz).

Wahrscheinlich ist *H. avernicus* Muls. des Bielz'schen Verzeichnisses nichts anderes als *A. brevitarsis* Kuw., da ich letzteren auf dem Frecker

Gebirge und auch im Kerzer Gebirge in grösserer Anzahl sammelte, während Bielz denselben nicht anführt, wohl weil er den Käfer noch nicht kannte. Wahrscheinlich kommt *H. avernicus* Muls. bei uns nicht vor.

brevitarsis Kuw. (Deubel Krauss.). Paringul (Vurfu Mandru), Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Vunetoure, aus Grasbüscheln gesiebt), Rodnagerbirge (c. a.); Hätzeg Geb. (Deubel).
glacialis Villa. Zibinsjäger, Präsbe (Bielz); Negoi (Ormay); Hätzeg Geb. (alpin, Deubel); Pietrosul (Müller).

confrater Kuw. Transsylvanische Alpen (südliche Gebirgskette, Ganglbauer); Nagybagynás (Deubel); Präsbe (Deubel, c. a.).

brevipalpis Bed. Héviz. Topánfalva (Erzgebirge), Baassen, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **montenegrinus** Kuw. Baassen, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Altfluss, Gespreng, Deubel).

(*Helophorus* s. str.)

affinis Marsh. Héviz, Baassen (c. a.).

griscus Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

granularis L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Sächs.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg, Halvelagen b. Sch., Topánfalva (Erzgebirge), Klausenburg, Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

viridicollis Steph. (caenepennis Thoms.). S.-Regen (Bielz).

Zoppae Ganglb. Mezőség (Ganglbauer).

quadrisignatus Bach. Oláhfalva, Schässburg, Baassen, Unter-Kerz (c. a.).

pumilio Er. Hermannstadt (Bielz); Brenn-dorf (Altufer beim Priesterhügel, Deubel).

nanus Sturm. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz).

337. *Hydrochus Leach.*

elongatus Schaller. Hermannstadt, Nuss-lach, Schässburg (Bielz); Halvelagen b. Sch., Kronstadt (c. a.); Mezőség (Müller).

carinatus Germ. Dobra (Bielz); Kronstadt (c. a.); Várhegy (Deubel).

brevis Herbst. Dobra, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

angustatus Germ. Dobra (Bielz); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altufer, Deubel).

338. *Oechthebius Leach.*

(*Henicoverus.*)

exsculptus Germ. Hätzeg (Bielz); Csukás, Szurdok-Pass (c. a.); Vargyas-Fluss (Deubel).

gibbosus Germ. Hätzeg (Bielz)

(*Aulacochthebius*.)

exaratus Muls. Klausenburg (Szamosfalva, Bielz).

narrenfinus Reitter. Schässburg (Atelshill, Kokelufer an einer sumpfigen Stelle im Gemste, c. a.).

(*Hemalochthebius*.)

impressus Marsh. Déva, Sabemicza (S.-Regen), Klausenburg (Szamosfalva, Mezöség (Záh, Bielz); Alsó-Rákös (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altfluss, Deubel).

(*Eothochthebius*.)

punctatus Steph. Déva, Salzburg b. H., Torda, Szamosfalva (Bielz).

(*Hymenodes*.)

foveolatus Germ. Hätzszeg, Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

caudatus Friv. Baassen, Szováta im Schlunne der salzigen Quellen, zahlreich, c. a.).

(*Ochthebius* i. sp.)

pusillus Steph. Salzburg, Sabemicza (S.-Regen, Bielz); Halvelagen bei Sch., Baassen in Süßwassertümpeln oberhalb des Bades, c. a.).

marinus Payk. Déva, Salzburg, Sabemicza (S.-Regen, Bielz).

339. *Hydraena Kugelann*.

(*Hydraena* i. sp.)

riparia Kug. Hermannstadt (Bielz), Retjezat (c. a.); Kronstadt, Krizba (Deubel).

morio Kiesenw. Siebenbürgen (Ganglb.).

nigrita Germ. Bükszád, Alsó-Rákös (c. a.); Krizba, Vargvasfluss (Deubel).

(*Haemidraena*.)

gracilis Germ. Hermannstadt (Bielz), Borszék, Alsó Rákös, Csukás (c. a.); Kronstadt, Krizba, Deubel).

(*Hadrenya*.)

atricapilla Waterh. Krizba (Deubel).

pygmaea Waterh. Csukás, Borszék (c. a.).

Spercheinae.

340. *Spercheus Kugelann*.

emarginatus Schall. Dobra, Salzburg, Hermannstadt, Fogarasch, Nussbach, Bozauer Pass (Bielz); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Hydrophilinae.

Berosini.

341. *Berosus Leach*.

(*Enoplurus*.)

spinosus Stev. Déva, Salzburg, Neudorf b. H., Schässburg, Kolos, Sabemicza (S.-Regen, Bielz); Hermannstadt (Ormay), Nieder-Eulisch (c. a.).

(*Berosus* i. sp.)

signaticollis Charp. Déva, Hermannstadt, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

luridus L. Hätzszeg, Hermannstadt, Mezöség (Gyeke, Bielz); Szamosujvár (Ormay); Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hydrophilini.

342. *Hydrons Dahl*.

piceus L. Hermannstadt, Kerz, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Timod (Unterweissenburger K., Ormay).

aterrimus Esch. Hermannstadt, Neudorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Karlsburg (c. a.); Mezö-Bänd (Maros-Torda), Timod (Ormay).

343. *Hydrophilus Degeer*.

caraboides L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **smaragdinus** Bach. Déva, Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Priesterhügel am Altufer, Deubel).

flavipes Stev. Salzburg b. H., Hermannstadt, Girelsau, Fogarasch, Krizba, S.-Regen (Bielz); Miriszlo (Ormay); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hydrobiini.

344. *Limoxenus Rey*.

oblongus Herbst. Klausenburg (Bielz); Marosujvár (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

345. *Hydrobius Leach*.

fuscipes L. In Tümpeln durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Es ist wahrscheinlich, dass die Stammform bei uns gar nicht vorkommt, sondern nur die Varietäten.

var. **Rottenbergi** Gehrhardt. Schässburg, Előpatak (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

var. **subrotundatus** Steph. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

346. *Anacaena Thomson*.

Creniphilus Thomson.

globula Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Maaren (Ormay).

limbata Fr. Hätzszeg, Reys, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Maaren (Or-

may); Baassen (in Süßwassertümpeln, auch an feuchten Stellen unter Laub, c. a.); Kronstadt (Deubel).

347. *Paracymus Thomson.*

aeneus Germ. Szamosfalva, Déva (Bielz, c. a.); Gross-Scheuern (Bielz).

348. *Philydrus Solier.*

Die Arten leben teils im Süß-, teils im Salzwasser.

(*Enochrus*.)

melanocephalus Ol. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., S.-Regen, Sabenicz, Mezöség (Záh, Bielz); Stolzenburg (Zakelsberg), Maaren (Ormay).

(*Methydrus*.)

minutus F. (affinis Thunbg.). Halvelagen b. Sch. (c. a.); Hermannstadt, Maaren (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(*Philydrus* i. sp.)

frontalis Er. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (c. a.).

fuscipennis Thoms. Kronstadt, Schässburg (c. a.).

4-punctatus Herbst. Halvelagen b. Schässburg, Baassen, Klausenburg, Malomvitz (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bicolor F. (griseus Gyll., maritimus Thoms.). Déva, Torda, Nieder-Erlisch, Baassen (c. a.).

testaceus F. Déva, Salzburg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Persány, Gross-Schenk, Süchs.-Regen, Mezöség (Záh, Gyeken, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár, Maaren (Ormay); Kronstadt (Deubel).

349. *Helochaeres Muls.*

griseus F. (lividus Steph. nec Forster). Salzburg, Hermannstadt, Fogarasch, Nussbach, Schässburg (Bielz); Maaren, Kákova (Ormay); Alsó-Bákos, Klausenburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

350. *Cymbiodyta Bedel.*

marginella F. Déva, Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Tümpel am Altfluss, Deubel).

351. *Laccobius Erichs.*

minutus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

nigriceps Thoms. Héviz, Kronstadt, Unter-Kerz, Baassen, Torda, Klausenburg, Deesakna (c. a.).

sinuatus Motsch. Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer unter Geniste, c. a.).

scutellaris Motsch. (atratus Rottenb.). Salzburg b. H. (Ormay); Ilvanika (Naszód, Rotenturm, Balánbánya (c. a.); Nagy-lagymás (Öcsém, Deubel).

alutaceus Thoms. Baassen (Salzquelle, c. a.).

var. *laevicollis* Ganglb. Baassen (c. a.).

gracilis Motsch. Schässburg (Kokelufer unter Geniste), Héviz, Unter-Kerz (c. a.).

Chaetarthriini.

352. *Chaetarthria Steph.*

seminulum Hbst. Hermannstadt (Bielz); Unter-Kerz, Balánbánya, Schässburg, Halvelagen b. Sch., Tordaer Schlucht (an sumpfigen Orten unter Moos und Pflanzenmoder, c. a.); Vargyas-Fluss (Deubel).

Limnebiini.

353. *Limnebius Leach.*

Die Arten leben in Tümpeln.

(*Limnebius* i. sp.)

truncatellus Thunbg. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Kákova (Ormay).

papposus Muls. Maaren (Ormay); Honigberg (Altufer). Kronstadt (Gesprenk, Deubel).

truncatulus Thoms. Schässburg (c. a.).

crinifer Rey. Schässburg, Baassen, Alsó-Bákos (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

stagnalis Quilleb. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

? *nitidus* Marsh. Unter-Kerz (c. a.).

aluta Bedel. Kronstadt (Gesprenk, Deubel).

(*Polimnius*.)

picipis Marsh. Hermannstadt (Bielz); Halvelagen (c. a.); Kronstadt (Gesprenk, Deubel).

Sphaeridiinae.

354. *Coelostoma Brullé*

orbiculare F. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Ilvanika, Naszód, Rodnagelinge, Retjezat, Déva (an feuchten Orten unter Moos, Laub, Geniste, c. a.); Nagy-enyed, Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

355. *Sphaeridium Fabr.*

Die Arten leben im Dünger.

scarabaeoides L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *lunatum* F. Hermannstadt (Ormay); Baróth-Méhely; Königstein (Crepatura, Deubel).

bipustulatum F. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

- var. **marginatum** F. Schässsburg, Maros-ujvár (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Gesprenz). Križba, Oberkomana, Sostoző, Mchely.
- var. **substriatum** Fahl. semi-striatum Lat. Oláhfalú (c. a.).

356. *Cereyon Leach.*

Die Arten leben in verwesenden Pflanzen- und Tierstoffen, werden aber oft auch im Fluge gefangen.

Dietytoereyon.

- ustulatus** Preysl. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S. Regen, Klausenburg (Bielz); Schässsburg, Baassen, Oláhfalú (c. a.).

(*Cereyon* i. sp.)

- lugutris** Oliv. (obsoletus Gyll.) Mühlbach, Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Kerzer Gebirge, Schässsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- impressus** Sturm. Bistra, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelbirge (c. a.); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay), Schulergebirge, Bucecs, Nagygyimás (Deubel).

- haemorrhoidalis** F. (flavipes F.). Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H. Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalú, S. Regen (Bielz); Schässsburg, Szováta, Naszód, Borszék (c. a.); Michelsberg, Kerzer Gebirge, Remete (Nagyenyed), Károly (Ormay).

- var. **erythropterus** Muls. Schässsburg, Hermannstadt, Szunyoksék (Kronstadt, c. a.).

- melanocephalus** L. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch (Bielz); Remete, Nagyenyed, Gyógy (Ormay); Bucecs (Deubel).

- marinus** Thoms. Präsbe (Bielz).

- lateralis** Marsh. Tartlau, Schässsburg (Bielz); Kerzer Gebirge (Biele), Előpaták (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- unipunctatus** L. Hermannstadt, Fogarasch, Előpaták, Schässsburg, Csáki Gorbó (Bielz), Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- quisquilius** L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Inter-Kerz, Fogarasch (Bielz), Klausenburg (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

- terminatus** Marsh. Schässsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

- pygmaeus** Illg. Tartlau, S. Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Križba, Mchely; Kronstadt, Vargyastal (Deubel); Schässsburg (c. a.).

- var. **merdarius** Sturm. Schässsburg Fuchsloch, in Dangel (c. a.).

- nigriceps** Marsh. Hermannstadt (Bielz); Schässsburg, Malonyiz (c. a.).

- lristis** Illg. Hermannstadt (Bielz), Hätzeg (Deubel).

- granarius** Er. Schässsburg (c. a.); Rotenturm, Schanta (Ormay); Kronstadt (Gesprenz, Deubel).

(*Paracereyon*).

- flavipes** Thunbg. analis Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Inter-Kerz, Kronstadt, Tartlau, S. Regen, Mezöség (Záh). Schässsburg unter verwesenden Pflanzen in Gärten im Frühjahr häufig, (Bielz); Präsbe, Gyógy (Ormay).

357. *Megasterium Muls.*

- boletophagum** Marsh. Rohazebirge, Oláhfalú, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Rejczat, Schässsburg (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

358. *Cryptopleurum Muls.*

In Dungern und verwesenden Pflanzenstoffen.

- minutum** F. (atomarium Oliv.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

- crenatum** Panz. Schässsburg Fuchsloch (c. a.).

Cantharoidea.

XXI. Cantharidae.

Homalisini.

359. *Homalisus Geoffroy.*

Auf blühenden Pflanzen; namentlich Schirmlblüthen, auch in morschem Holze.

- lentisbellaquei** Geoffr. (suralis Oliv.) Hätzeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Marosgeb. (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota); Schässsburg (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hermannstadt (Albrecht); Bistritz (Müller).

Lycini.

360. *Dietyopterus Latreille.*

Auf blühenden Pflanzen.

- Aurora** Herbst. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucecs (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

- rubens** Gyll. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässsburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

361. *Pyropterus Muls.*

Auf blühenden Pflanzen.

- affinis** Payk. Bistra, Rodnagelbirge, Schässsburg (Fuchsloch, 18. Juni, c. a.); Rodnagelbirge (Deubel); Székany (Kovácsnaer Gebirge, Mchely).

362. *Platyels Thomson.*

- Cosnardi** Chev. Zibinsgebirge (Bielz); Rodna Gebirge (Deubel); Hermannstadt (Müller).

minuta F. Surul, Borszék (Bielz); Bistra (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

363. *Lygistopterus Muls.*

sanguineus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Lampyridini.

364. *Lampyris Geoffr.*

noctiluca L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

365. *Phausis Leconte.*

(*Lamprorhiza* Motsch.)

splendida L. Heltau, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Rodnagelbirge (Deubel).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt, jedoch wohl mit Unrecht.

366. *Phophaenus Laporte.*

Unter Laub und in morschem Holz in Laubwäldern.

hemipterus Goeze. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyastal, Honigberg (Alt- ufer, Deubel).

367. *Luciola Laporte.*

mingreluca Men. Hätzeg, Kronstadt (Bielz). Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

Cantharini.

368. *Podabrus Westwood.*

alpinus Payk. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz); Balánbánya, Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Schässburg, Borszék (c. a.).

var. *lateralis* Er. Kerzergebirge (Bielz).

var. *rubens* F. Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a.).

369. *Cantharis Linné.*

(*Ancistronecha*.)

abdominalis F.

var. *cyanipennis* Bach. Kronstadt, Előpatak (Bielz).

violacea Payk. Schulergebirge (Bielz); Balánbánya (Egyeskő, c. a.); Rodnagel-, Nagyhagymás (Deubel); Rátosnya, Klausenburg (Müller); Bodzaer Geb. (Méhely).

var. *figurina* Dietr. Rodnagelbirge (?), (Deubel).

Das in der Sammlung Deubels befindliche *C.* weicht von der normalen Form ab durch schwarzen Hinterkopf, dunkeln Halsschild mit rötlich durchscheinenden Rändern und mit Ausnahme der Vorderhüften ganz schwarze Beine. An den Fühlern ist nur die Unterseite des ersten Gliedes gelb. Die Krallen aller Beine sind gelb.

Erichsoni Bach. Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat, Rodnagelbirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

(*Cantharis* l. sp.)

fusca L. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

rustica Fall. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

tristis F. Retjezat, Kerzer Gebirge (Bielz); Surul (Albrecht); Rodnagelbirge (Deubel).

obscura L. Hätzeg, Götzenberg, Talmatschel, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Gyeke (Bielz); Schanta (Ormay); Alsó-Rákös (c. a.); Paringul (Deubel).

pulicaria F. Hätzeg, Zibinsgebirge, Kronstadt, Záh (Mezőség, Bielz); Kalán, Alsó-Rákös (c. a.).

nigricans Müll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pellucida F. Hätzeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Héviz, Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay); Vargyastal, Nagyhagymás, Paringul (Deubel); Detunata (Mallász).

livida L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Olábfalu, Záh, Gyeke (Bielz); Sebanta (Ormay); Karlsburg, Borszék (c. a.).

var. *scapularis* Redt. Tartlau (Bielz).

var. *rufipes* Herbst (dispar F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

longicollis Kiesenw. Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt (c. a.); Rodnagelbirge, Vargyastal, Nagyhagymás (Deubel).

quadripunctata Müll. (*assimilis* Payk.). Práshe, Hosszufalu (Bielz); Szurdok-Pass, Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Vargyastal (Deubel); Remete (Nagyenyed, Ormay).

sudetica Letzn. Fogarascher, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Nussbach, Klausenburg (c. a.).

rufa L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Héviz, Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel); Schässburg, Klausenburg (c. a.).

pallida Goeze. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

fulvicollis F. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Petrozsény, Malomviz, Előpatak (c. a.).

bicolor Herbst (*thoracica* Oliv.). Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Borszék (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

lateralis L. (*oralis* Germ.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Baassen, Marosújvár, Karlsburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Metacantharis*.)

discoidea Ahr. Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).

var. liturata Redtenb. Mediasch (Bielz); Fogarascher Gebirge (c. a.); S.-Regen (Müller).

haemorrhoidalis F. Hátszeg, Grossschauern, Kerzer Gebirge, Reps, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Götzenberg, Remete (Nagyenyed, Ormay).

turcica Marsh. Kerzer Gebirge (Bielz)

370. *Absidia Mulsant.*

pilosa Payk. Dees, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, Paringul, Borszék (c. a.); Buceacs, Nagyagy-más, Schulergebirge (Deubel).

prolixa Märk. Kronstadt, Rodnag Gebirge, Buceacs (♂ ♀, c. a.); Nagyagy-más, Schulergebirge (Deubel).

rufotestacea Letzn. Schuler Gebirge, Szováta (c. a.); Zernest, Rosenau (Deubel).

371. *Rhagonycha Eschsch.*

translucida Kryn. Rodnag Gebirge, Schäss-burg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

nigricreps Walth. Zibinsgebirge, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Bistra, Retjezat, Schässburg, Borszék, Rodnag Gebirge (c. a.); Paringul (Deubel).

var. nigricornis n. v. Rodnag Gebirge (c. a.). Im Rodnag Gebirge kommt eine Varietät vor mit ganz schwarzen Fühlern und schwarzen oder braunen Schenkeln, für welche ich den Namen *nigricornis* vorschlage.

fulva Scop. Hátszeg, Déva, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Klausenburg (Bielz).

var. usta Germ. Schässburg (Bielz)
opaca Muls. Kronstadt (Bielz).

Die Art gehört dem südwestlichen Europa an, so dass ihr Vorkommen bei uns eines weiteren sicheren Nachweises bedarf.

maculicollis Märk. (Meisteri Gredl.). Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Szamosújvar (Ormay), Paringul, Buceacs, Csukás, Rodnag Geb., Bistritz (c. a.).

testacea L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Schauen, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előatak, Schässburg, Szováta, Gycke, Záh (Bielz).

limbata Thoms. Hermannstadt (c. a.); Kronstadt, Buceacs (Deubel).

Deubeli n. sp. Schässburg, Kronstadt (c. a., Deubel).

Rhagonycha Deubeli.

Niger vel nigropiceus, mandibulis, elytris, tibiis tarsisque rufotestaceis, antennae corporis dimidium superantes, prothorax subquadratus, angulus anterioribus subrotundatis, posterioribus acutis, subobtusis vel rectangularibus.

Schwarz oder dunkelpechbraun, Mandibeln, Schienen, Tarsen und Flügeldecken hellgelb, zu-

weilen das zweite Fühlerglied an der Wurzel etwas heller. Kopf beim ♂ etwa so breit als der Halsschild, mit ebenso grossen, vorgequollenen Augen wie bei *Rh. pallipes*, beim ♀ viel schmaler als der Halsschild mit kleineren wenig vorgequollenen Augen, fein zerstreut, etwas rauh punktiert, zwischen den Augen leicht, zuweilen obsolete eingedrückt. Fühler in beiden Geschlechtern länger als der halbe Körper, das dritte Glied fast doppelt so lang als das zweite und um 1/2 kürzer als das vierte Halsschild beim ♂ fast so lang als breit, nach vorne etwas verengt, beim ♀ sehr wenig kürzer als breit, fast quadratisch, mit schwach gerundeten Seiten und schwach gerundetem Vorderrand, die Vorder-ecken stumpf, aber deutlich, die Hinter-ecken fast rechtwinklig, ziemlich scharf, Vorder- und Hinter- rand deutlich, der Seitenrand kaum aufgebogen, fast verflacht, Scheitel mit den gewöhnlichen Eindrucken, glänzend, glatt, höchstens in den Vorderwinkeln und an den Seiten undeutlich punktiert. Schildchen dunkel, Flügeldecken vier- bis fünfmal länger als der Halsschild, dicht, etwas runzlig punktiert, mit zwei mehr oder weniger deutlichen, erhabenen Linien auf der innern Scheibenhälfte, dicht gelblichgrau niederliegend behaart. Unterseite ganz schwarz. Der 10. femoralis Brüll nahestehend, aber grösser, anders gefärbt und punktiert, mit längeren Fühlern und weniger queren glänzendem Halsschild.

femoralis Brüll. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Paringul, Buceacs, Nagyagy-más (Deubel).

var. nigripes Redtenb. Zibinsgebirge, Präsbe, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Buceacs, Rodnag Gebirge (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

var. fuscitibla Rey. Retjezat, Paringul (c. a.).

lignosa Müll. (*pallipes* F., *pallida* F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland bis ins Gebirge verbreitet.

straminea Kiesenw. Schanta, Stolzenburg (Ormay).

banatica Rosenh. Déva, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Ham-mersdorf, Baassen, Schässburg (c. a., von Grassipen geköschert).

viduata Küst. Hermannstadt (Ormay).

rorida Kiesenwetter. Hermannstadt (Bielz); Hátszeg, Puj (b. Hátszeg), Buceacs, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

elongata Fall. Hátszeg, Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz), Hermannstadt (Ormay); Szováta (c. a.).

carpathica Ganglb. (? morio Müller). Rodnag Gebirge (Ganglbauer).

atra L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Schauen, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Tardlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.); Nagyagy-más (Deubel).

var. rhaetica Stierl. Vargyastal (Deubel).

372. *Pygidia Muls.*

denticollis Schumm. Klausenburg, Bihar-gebirge (Bielz), Rodnag Gebirge (c. a.).

373. *Silis Latreille.*

- nitidula** F. Mühlbach, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Reps, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz).
ruficollis F. Gross-Scheuern (Bielz).

Malthinini

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen, werden mit dem Streifsack von niedern Pflanzen und durch Klopfen von Laub- und Nadelhölzern gesammelt.

374. *Malthinus Kiesenwetter.*

- demissus** Kiesenw. Hermannstadt (Seidlitz); Baassen, Schässburg (c. a.).
sinuatocollis Kiesenw. Hermannstadt (Seidlitz); Kerzer Gebirge (Bielz).
nigrinus Schaaf. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Mátzeg, Schässburg (c. a.).

375. *Malthinus Latreille.*

- biguttulus** Payk. Bucsecs, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
flaveolus Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Klausenburg, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
fasciatus Oliv. Kerzer Gebirge (Bielz); Michelsberg (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).
facialis Thoms. Seidl. Schässburg (Wietberg, 4. Juli, c. a.).
glabellus Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.).
maritimus Pic. Kronstadt (Honterusplatz, 1 ♂, Deubel).
frontalis Marsh. Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Honigberg (Deubel).

376. *Malthodes Kiesenwetter.*

- marginatus** Latr. Gross-Scheuern, Neudorf (Bielz); Kronstadt, Előpatak, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); S.-Regen (Müller).
trifurcatus Kiesenw. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
 var. **afamentarius** Kiesenw. Kronstadt (♂, Deubel).
guttifer Kiesenw. Bucsecs, Frecker Geb. (Serbota, Nagybagymás, Kronstadt, Borszék (c. a.).
spretus Kiesenw.
 var. **apiceguttatus** Ganglb. Kronstadt (Deubel).
Liegeli Weise. Kronstadt (Zinne, ♂, Deubel).
brevicollis Payk. (nigellus Kiesenw.). Kerzer Gebirge (Bielz); Paringul (c. a.).

- minimus** L. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Ömpolyiczatal (bei Zalatna), Baassen, Schässburg (c. a.).
fuscus Waltl. (pellucidus Kiesenw.). Hermannstadt, Schässburg (c. a.).
debilis Kiesenw. Bozauer Gebirge (Méhely).
 var. **transsylvanicus** Ganglb. Kronstadt (Zinne, ♂ ♀, Deubel).
dispar Germ. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Balánbánya, Szováta, Bistra, Retjezat (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
maurus Cast. Hermannstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
 var. **misellus** Kiesenw. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Szováta, Borszék, Schässburg (Kokelufer auf Weiden, c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).
fibulatus Kiesenw. Kronstadt (Deubel).
hexacanthus Kiesenw. Retjezat (c. a.).
dimidiaticollis Rosenh. (pulicarius Redt.). Hermannstadt, Baassen, Schässburg (♂, c. a.).
spathifer Kiesenw. Kronstadt (♂ ♀, Deubel).
serbotae Petri Frecker Gebirge (Serbota, oberhalb der Baumregion im Grase unter Steinen, ♀, c. a.).
Holdhausi Ganglb. Kronstadt (♂ ♀, Deubel).
Deubeli Ganglb. Siebenbürgen.

Drilini.377. *Drillus Olivier.*

- concolor** Ahr. Grosspold, Gross-Scheuern, Kronstadt (Kapellenb., Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.). Die Larven der flügellosen Weibchen leben in verschiedenen Landschnecken, *Helix vindobonensis*, *Helix lutescens*, *vicina*; Entwicklung der Männchen noch unbekannt; Hermannstadt (Albrecht); Bistritz, S.-Regen (Müller).

Malachiini.378. *Troglops Erichs.*

- albicans** L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Reps, Unter-Kerz, Csukás (c. a.).

379. *Charopus Erichs.*

- thoracicus** Moraw. Csukás, Bozauer Gebirge (Deubel).
flavipes Payk. Fogarasch, Klausenburg, Bihargebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- pallipes** Oliv. Hätzeg, Hermannstadt, Holz-
mengen, Előpatak, S.-Regen (Bielz).
concolor F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-
Scheuern, Girdelsau, Fogarasch, Elő-
patak, Schässburg, S.-Regen (Bielz);
Baassen (c. a.), Kronstadt (Deubel).

380. *Hypebaeus Kiesenw.*

(Alloceps.)

- flavipes** F. Mühlbach, Mediasch (Bielz).
Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Hät-
zeg (Deubel).

381. *Ehaeus Erichs.*

- pedicularis** Schrank (praeoccupatus aut.)
Hermannstadt, Gross-Scheuern, Schäss-
burg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Stol-
zenburg, Salzburg (Ormay); Hätzeg
(c. a.).
ater Kiesenw. Buceses (Deubel, subalpin).
appendiculatus Er. Hermannstadt, Neudorf
b. II, Holzungen, S.-Regen (Bielz);
Hätzeg (c. a.).
flavicornis Er. Hammersdorf, Előpatak
(Bielz); Schässburg (c. a.); Törzburg
(Deubel).
mediterraneus Ab. Kronstadt (Rosenauer
Burgherg, Méhely).
coerulescens Er. Gross-Scheuern (Bielz);
Hätzeg (c. a.).
(Sphinginus.)
coarctatus Er. Kronstadt, Schässburg
(Bielz); Zajzon (Deubel).

382. *Attalus Erichs.*

(Abrinus.)

- analis** Panz. Hermannstadt, Marpod, Fo-
garasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz);
Stolzenburg, Resinar (Ormay); Ham-
mersdorf, Rotenturm, Hätzeg, To-
roczkó (Erzgebirge), Tordaer Schlucht,
Baassen, Borszék (c. a.).

383. *Axinotarsus Molsch*

- ruficollis** Oliv. Hermannstadt, Neudorf bei
II. (Bielz); Schässburg (c. a.); Kron-
stadt (Deubel).
pulicarius F. Durch das ganze Berg- und
Hügelland verbreitet.
marginalis Lap. Hätzeg, Déva, Hermann-
stadt, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz);
Baassen, Schässburg, Reys (c. a.).

384. *Malachius Fabr.*

- scutellaris** Er. Hermannstadt, Birtihalm,
Schässburg, Reys (Bielz); Vargyastal
(Deubel).
rubidus Er. Talmatschel (Bielz).
aeneus L. Durch das ganze Berg- und
Hügelland verbreitet, auch im Gebirge.
Retjezat (c. a.)

- marginellus** Oliv. Durch das ganze Berg-
und Hügelland verbreitet bis in das
Gebirge Rodnagebirge, Koronjis, c. a.)

- dilatatornis** Germ. Gross-Scheuern, Ham-
mersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz);
Alsó-Bákos (Tepcehgy, c. a.). In
Hammersdorf sammelte ich diese Art
auf *Cranbe tartarica*.

- bipustulatus** L. Durch das ganze Berg-
und Hügelland verbreitet.

- affinis** Mént. Hätzeg, Oláhfalú (Bielz); Her-
mannstadt, Hammersdorf (Ormay).

- spinipennis** Germ. Hätzeg, Retjezat, Her-
mannstadt, Fogarasch (Bielz); Stolzen-
burg, Rotenturm (Ormay).

- elegans** Oliv. Rotenturm (Bielz); Ham-
mersdorf (Ormay).

- falcifer** Abeille. Schässburg (2 ♂, c. a.);
Rosenau, Untertöms (Méhely); Kron-
stadt (Zinne, Deubel).

- geniculatus** Germ. Mühlbach, Fogarasch,
Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammers-
dorf, Stolzenburg (Ormay); Marosuj-
vár, Schässburg (c. a.); Hätzeg (Deu-
bel).

385. *Anthocomus Erichs.*

(Cedrus.)

- rufus** Herbst. Hammersdorf, Gross-Scheuern
(Bielz); Schässburg (c. a., Oktober
im Hölzricht einer feuchten Stelle).

(Neotrotus.)

- bipunctatus** Harter (equestris F.). Durch
das ganze Berg- und Hügelland ver-
breitet.

(Parembalus.)

- fasciatus** L. Hätzeg, Retjezat, Gross-
Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt,
Schässburg, S.-Regen (Bielz); Her-
mannstadt, Stolzenburg (Ormay); Kron-
stadt (Deubel).

Dasytinae.

386. *Dasytes Fabr.*

- niger** L. Hätzeg, Gross-Schenk, Fogarasch,
Kronstadt, Mediasch, S.-Regen; Her-
mannstadt (Ormay); Schässburg,
Baassen, Dees (c. a.); Nagyhagymás
(Deubel).

- alpigradus** Kiesenw. Petrosényi, Kronstadt
(Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bu-
ceses (c. a.); Hätzeg (Deubel).

(Hypodasytes.)

- subalpinus** Baudi. Rosenau (Buces-Gie-
biet, Deubel).

- obscurus** Gyll. (*rugipennis* Thoms.) Gross-
Scheuern, Kerzer Gebirge, Gross-
Schenk, Fogarasch, Büdös, Oláhfalú,
S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Or-
may); Schässburg (c. a.); (? *rugipen-
nis* Thomson). Büdös (Bálványos), Tö-
möser Pass (Méhely).

(Metadasytes.)

coeruleus Deg. Ober-Schles, Kerzer Geb. (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdok-Pass, Retjezat, Schässburg (Gross-Mischer Kuppen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Bistritz (Müller).

(Mesolasytes.)

aerosus Kiesenw. Rin Sad, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz, S.-Regen (Müller).

plumbeus Müll. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (c. a.); Salzburg (Ormay).

(Hapalogluta.)

fuscus Illig. Gross-Scheuern, Holzmeugen, Zood, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

subaeneus Schönh. Girelsau, Kerzer Geb., Fogarasch, Gyeke (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

387. *Dolichosoma Stephens.*

lineare Rossi. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Balánbánya, Szováta, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Valea vinului). Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

388. *Haploenemus Stephens.*

pini Redt. (impressus aut.). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

nigricornis F. Hermannstadt (Ormay).

tarsalis Sahlb. Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a. ♂♀).

389. *Trichoceble Thomson.*

(Julistus Kiesenw.)

floralis Oliv. Grosspold, Schässburg, Borszék (Bielz); Rosenau (Deubel); Bistritz (Müller).

fulvohirta Bris. Hätzeg (c. a.); Rosenau? (Deubel).

390. *Dasytiscus Kiesenw.*

impressicollis Reitter (graminicola Kiesenw.). Gross-Scheuern (Bielz).

391. *Danacaea Laporte.*

Die Arten leben auf verschiedenen niedern Pflanzen.

Reyi Proch. Kronstadt (Deubel).

pallipes Panz. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Mediasch, Gyógy (Bad), Stolzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rotenturm (c. a.).

serbica Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Salzburg, Karlsburg, Schässburg, Borszék (c. a.); Mezőség (Gyeke, Mchely).

morosa Kiesenw. Rosenau (Bucsecs-Gebiet, Deubel).

nigritarsis Küst. Gross-Scheuern, Fogarasch, Reys, Záh (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed, Rotenturm, Zalatna, Hätzeg, Puj (b. Hätzeg), Petrozsény (c. a.); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XXII. Cleridae.

Clerini.

392. *Denops Steven.*

albofasciatus Charp. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz).

var. **longicollis** Stev. Siebenbürgen (Catalog. Col. Europae, Heyden 1906)

393. *Tillus Olivier.*

Die Arten werden in der Regel an gefällten Holzstämmen oder in altem Holze gesammelt.

elongatus L. Hätzeg, Zood, Kerzer Geb., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes Schlurgebirge, Bucsecs, Bodzaer Gebirge (Deubel).

♂ var. **comma** n. v. Zalatna (1 Ex. c. a.).

Tillus elongatus var. **comma** weicht in Grösse, Gestalt und Färbung von normalen Männchen nicht ab, besitzt aber auf dem vierten Zwischenraume der Flügeldecken in der Basalhälfte einen schmalen, lebhaft rot gefärbten, kielförmig erhöhten, kommaförmigen Strich.

unifasciatus F. Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Göfzenberg, Zood, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed (c. a.).

pallidipennis Bielz. Gross-Schenk, Szombat, Schässburg, Csiker Geb. (Bielz).

394. *Tarsostenus Spinola.*

univittatus Rossi. Hammersdorf, Sächs.-Regen (Bielz).

395. *Opilo Latreille.*

domesticus Sturm. Fogarasch, Kronstadt (? Deubel); Hosszufalu (Bielz); Schässburg (c. a.).

mollis L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rotenturm, Remete (Nagyenyed, Ormay); Kronstadt (Deubel).

396. *Clerus Fabr.*
Cleroides Schaffer.

mutillarius F. Hätzeg, Hermannstadt, Zood.
 Mediasch, Dees, Klausenburg (Bielz);
 Schässburg (c. a.); Hárónyszék (Deu-
 bel).

397. *Thanasimus Latreille.*

rufipes Brahm.

var *femoralls* Zett. (*pectoralis* Fuss.).
 Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

formicarius L. Hätzeg, Hermannstadt,
 Hammersdorf, Präsbe, Kerzer Gebirge,
 Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch,
 Bithalm, Schässburg, S. Regen (Bielz),
 Bistra (Ormay).

398. *Trichodes Herbst.*

apiarius L. Durch das ganze Berg- und
 Hügelland bis in die Gebirge ver-
 breitet, auf blühenden Pflanzen.

favarius Illig. Csiker Gebirge (Bielz); Var-
 gyastal (Deubel).

irkutensis Laxm. (*bifasciatus* F.). Gyergyo,
 Rodna (Bielz); Bistra (Ormay);
 Rodnagebirge (Vale vinului, Deubel).

Enopiini.

399. *Orthoplenra Spinola.*
Dermestoides Schaffer.)

sanguinicollis F. Fogarasch, Kronstadt, Me-
 diasch, Klausenburg, Gyala (Bielz);
 Hermannstadt (Ormay); Honigberg,
 Nussbach (Deubel, an Eichenstämmen).

Corynetini.

400. *Corynetes Herbst.*

coeruleus Degeer. Gross-Scheuern, Rothberg
 b. H., Kronstadt (Bielz); Schässburg
 (c. a.).

var. *ruficornis* Sturm. Marktschelken, Me-
 diasch, Schässburg, Héviz (Bielz);
 Marosujvár (c. a.).

401. *Necrobia Latreille.*

violacea L. Durch das ganze Berg- und
 Hügelland verbreitet.

rulipes Degeer. Mühlbach, Klausenburg
 (Bielz).

402. *Opetiopalpus Spinola.*

scutellaris Panz. Gross-Scheuern, Dees
 (Bielz); Klausenburg (c. a.).

XXIII. *Derodontidae.*

403. *Derodontus Leconte.*

macularis Fuss. Kerzer Gebirge (Bielz).

404. *Laricobius Rosenhauer.*

Erichsoni Rosenh. Bursecs (Deubel, alpiu,
 aus Grashuscheln geseht, ich sammelte
 diese Art in Böhmen bei Franzens-
 bad durch Klopfen von Gesträuch).

XXIV. *Byturidae.*

405. *Byturnus Latreille.*

fumatus F. Durch das ganze Berg- und
 Hügelland verbreitet, namentlich auf
 den Blüten des Löwenzahn.

tomentosus F. Durch das ganze Gebiet
 verbreitet, namentlich auf Himbeer-
 blüten.

a. *flavescens* Marsh. Mit der Stamm-
 form.

XXV. *Ostomidae.*

Nemosomini.

406. *Nemosoma Latreille.*

elongatum L. Gross-Scheuern, Bithalm, S.-
 Regen (Bielz); Nagybagymás, Kron-
 stadt (Zinne, Deubel).

407. *Tenebrioides Piller.*

mauritanicus L. Durch das ganze Gebiet
 unter der Rinde von Laub- (auch
 Obst-)Bäumen.

Leperini.

408. *Calytis Thomson.*
Nosodes Leconte.)

scabra Thunbg. Borszék (Bielz)

Ostomini.

409. *Ostoma Laicharting.*

(*Zimioma*.)

grossum L. Kerzer Gebirge, Kronstädter
 Gebirge, Piatra mare, Bükszád, Bor-
 szék, Marosgebirge, S.-Regen (Bielz);
 Bistra, Rodnagebirge (c. a.).

(*Ostoma* i. sp.)

ferrugineum L. In unsern Gebirgen unter
 Fichtenrinde.

(Grynocharis.)

oblongum L. Hátzeg, Präsbe, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Bozauer Pass, Marosgebirge, Dees (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Brád, Szamosujvár (Ormay); Csukás (Deubel).

410. *Tymalus Latreille.*

limbatus F. In allen Gebirgswäldern unter Baumrinde (Rotbuche, Fichte).

XXVI. Sphaeritidae.

411. *Sphaerites Duftschmid.*

gabratus F. Präsbe, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Zernest (Deubel).

XXVII. Nitidulidae.

Cateretini.

412. *Cateretes Herbst.*

(*Cercus Latreille.*)

pedicularius L. Mezőség (Záh, Bielz).

bipustulatus Payk. Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

a. **suturalis** Murray.) mit der
a. **ochraceus** Murray.) Stammform.

(Pulion.)

rufilabris Latr. Dobra (Bielz).

413. *Heterhelus Duval.*

scutellaris Heer. (sambuci Er.). Kronstadt, Schulergebirge, Borszék (c. a.).

solani Heer. (rubiginosus Er.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Retjezat, Bistra, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Resinar, Gyergyó-Tölgyes, Schanta (Ormay); Nagybagymás (Deubel).

414. *Brachypterus Kugelann.*

glaber Steph. Zibinsgebirge (Bielz).

urticae F. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge, Baánbánya, Schulergebirge, Előpatak, Bükszád, Retjezat (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallás).

415. *Heterostomus Duval.*

pulicarius L. (gravidus Illig.). Hátzeg, Hermannstadt, Zood, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz).

var. **cinereus** Heer. Zibinsgebirge (Bielz).

var. **linariae** Steph. Előpatak, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

Carpophilini.

416. *Carpophilus Leach.*

(Ecnomorphus.)

sempustulatus F. Gross-Scheuern, Holz-mengen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und am ausfliessenden Saft der Buche, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne).

Nitidulini.

417. *Ipidia Erichs.*

4-maculata Quens. (4-notata F.). Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Borszék, Gyergyó (Toplitz, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel); Szováta (c. a.).

418. *Amphotis Erichs.*

marginata F. Dobra, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter der Rinde und im Holze alter Weissbuchen in den Nestern der *Formica fuliginosa*, c. a.); Honigberg (unter Eichenrinde, Deubel); Szováta (Rothbuchenstumpf, 5. Juni, c. a.).

419. *Soronnia Erichs.*

punctatissima Illig. Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz).
grisca L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, im Holze alter Eichen, unter der Rinde und am ausfliessenden Saft der Buchen und anderer Laubbäume).

420. *Epuraea Erichs.*

(Dadopora.)

decemguttata F. Hátzeg, Hermannstadt, Präsbe, Gross-Scheuern, Holz-mengen, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (in Baumpilzen, besonders der Eiche, c. a.); Detunata (Mallás).

(*Epuraea i. sp.*)

silacea Herbst. Präsbe, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **fagi** Bris. Bucsecs (Malajester Schlucht, Méhely).

depressa Gyll. (aestiva Er., ochracea Er.). Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Michelsberg, Schanta (Ormay); Unterkarz (c. a.).

- a. bisignata** Sturm. Präsche, Götzberg, Hammersdorf, Neudorf b. H. (Bielz); Heltan, Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg, Kronstadt (c. a.).
- melina** Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Kronstadt (c. a.); Schulergeb. (Deubel).
- deleta** Er. Rodnagelirge (c. a.); Zernest (Deubel).
- terminalis** Mannh. (immunda Er.). Zibinsgebirge (Ormay); Hargitta Méhely, Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota); Balaibanya (Egyeskő, c. a.).
- a. nigricans** Schilsky. Schulergebirge (c. a.).
- a. Seidlitzi** Schilsky. Schulergebirge, Balaibanya (Egyeskő, c. a.); Zernest (Deubel).
- nana** Reitter. Rodnagelirge (c. a.); Negoi subalpin (Deubel).
- neglecta** Heer. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Freck, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Ober-Kerz (Glashütte); Schässburg (c. a.); Bistra, Gyógy (Ormay); Zernest (Deubel).
- rufomarginata** Steph. Kerzer Geb. (Bielz).
- castanea** Duft. Hätzeg (Bielz).
- nobilis** Reitter. Schässburg (am ausfließenden Saft eines Buchenstumpfes, März, c. a., 5 Exemplare).

Die Art erinnert in der Färbung an *E. rufomarginata* Steph., für die ich sie anfänglich auch hielt. Da jedoch die 77 erweiterte Mittelschienen besitzen, die Punktierung entschieden gröber und körniger als bei *E. obsoleta*, die Färbung ähnlich der *E. nobilis* ist, so habe ich die Schässburger Tiere als *E. nobilis* Reitter determiniert. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir in unserer *E. nobilis* eine neue Art zu erblicken haben, da der wesentliche Unterschied zwischen ihr und *E. obsoleta* im Fühlerbau besteht, den Reitter nicht erwähnt. Die Fühlergeißel ist viel schlanker und länger, das mittlere Glied der Keule deutlich breiter als die beiden einschliessenden und gebraunt. Doch ist es immerhin möglich, dass Reitter diese Unterschiede, da ihm nur ein Exemplar vorlag, übersehen hat.

- variegata** Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Amen-See (Tusnád); Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Rosenau (Bucsecs-Gebiet, Deubel).
- a. monochroa** Reitter. Kronstadt (Deubel).
- obsoleta** F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Tahmesch, Fogarasch, Kronstadt, Lartlau, Oláhfaln (Bielz); Schässburg, Hätzeg (c. a.).
- longula** Er. Hermannstadt (Bielz); Petrozsény, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- a. Erichsoni** Reitter. Petrozsény (c. a.).
- boreella** Zetterst. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Rodnagelirge (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).
- angustula** Strm. Präsche (Bielz).
- pygmaea** Gyll. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Schulergeb., Frecker

- Gebirge, Serbota, Oláhfaln, Rodnagelirge (c. a.).
- pusila** Fitz. Hätzeg (Bielz); Schulergebirge (c. a.); Rodnagelirge, Tusnád (Deubel).
- abietina** J. Sahlb. Schulergebirge, Alsó-Rákos (Deubel).
- oblonga** Herbst. Frecker Gebirge, Serbota, c. a.; Schulergebirge, Nagybagymás (Deubel).
- Fussi** Reitter. Frecker Gebirge, Oláhfaln (c. a.); Bucsecs, Nagybagymás (Deubel).
- Horea** Er. Zibinsgebirge, Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Fúj (bei Hätzeg), Maromváz (c. a.); Gotzenberg, Kleinpold (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- laeviuscula** Gyll. Ober-Kerz (Glashütte, c. a., 1 Ex., vicht Ganglbauer).
- Deubeli** Reitter. Schulergebirge (von Deubel gesammelt, c. Reitter?).

421. *Micrurula* Reitter.

Micruria Reitter ol.

- melanocephala** Marsh. Zibinsgebirge, Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte); Schulergebirge, Büdös (c. a.); Kronstadt, Bucsecs (subalpin, Deubel).

422. *Omosiphora* Reitter.

- limbata** Oliv. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Gross-Scheuk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a., im Moos eines vertrockneten Ahorn); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Homberg (Deubel).

423. *Omosita* Erichs.

- depressa** L. Gross-Scheuern, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).
- colon** L. Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Szamosújvár (Ormay); Schässburg (an tierischen Stoffen, verfaultem Obst etc.); Kronstadt (Deubel).
- discoidea** F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz). In Schässburg unter Baumrinden gesammelt, c. a.).

424. *Nitidula* Erichs.

- bipunctata** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland an tierischen Stoffen, oft in Vorratskammern.
- rufipes** L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Bistritz (Bielz); Homberg, Neustadt bei Kr. (Deubel).
- carnaria** Schall. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (an den getrockneten Leberresten eines Fuchses, c. a.), Kronstadt (Gesprenk, Deubel).

425. *Pria Stephens.*

dulcamarae Scop. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Marienburg b. Sch. (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

426. *Meligethes Stephens.*

Blutenkafer.

(*Ontogethes*.)

hebes Er. Zibinsgebirge, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Borszék, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagelirge (Deubel).

(*Meligethes* l. sp.)

rufipes Gyll. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Zernest (Deubel).

lumbaris Sturm. Hätzeg (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt Zinne, Deubel).

Försteri Reitter. Kronstadt (c. a.).

rubripes Muls. (fulvipes Bris.). Kronstadt (Zinne). Bucecs (subalpin, Deubel).

coracinus Strm. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Előpatak, Oláhfalú, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz); Bükszád, Schässburg, Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Gyógy (Bad, Ormay).

a. *epuraeoides* Reitter. Előpatak (c. a.).

var. *pumilus* Er. Baróth, Kisszéktő (Méhely); Kronstadt, Előpatak, Schässburg (c. a.).

var. *decoloratus* Först. Baróth, Kronstadt (Zinne, Méhely).

var. *aenescens* Ganglb. Kronstadt (Ganglbauer); Alsó-Rákos, Schässburg, Hätzeg, Előpatak (c. a.); Vargyastal (Deubel).

Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa, III. 504) führt diese Varietät, die sich vielleicht als selbständige Art herausstellen dürfte, ausdrücklich für Kronstadt an. Sie ist im *Catalogus col. Europae*, Heyden etc. 1906 ausgeblieben. Die Art kommt auch mit dunklen Beinen und Fühlern vor, die Flügeldecken sind bei den Weibchen etwas runzlig punktiert.

subaeneus Sturm. Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Előpatak, S.-Regen, Oláhfalú (Bielz); Schässburg, Szováta, Alsó-Rákos (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

aeneus F. (*brassicae* Reitter). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, besonders auf Löwenzahn).

var. *dauricus* Motsch. Baláubánya (c. a.).

a. *coeruleus* Reitter. Bistritz, Dees (c. a.).

viridescens F. Götzenberg, Talmesch (Bielz); Baláubánya (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

Czwaina Reitter. Königstern, Crepatura, Bucecs (Deubel); Zibinskamm (Albrecht).

humerosus Reitter. Rodnagelirge, Nagyhagymás (Deubel).

symphyti Heer. Hätzeg, Hermannstadt, Mediasch, Reys, Előpatak (Bielz); Schäss-

burg, Ilyanika (Naszód, c. a.); Rosenau (Deubel).

M. corvinus Er. ist aus dem Verzeichnis siebenbürscher Käfer zu streichen, da er durch einen Irrtum meinerseits aufgenommen wurde.

subrugosus Gyll. Neppendorf, Kerz, Kerzer Gebirge, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Resinar, Schanta (Ormay); Borszék, Alsó-Rákos (Tepe, c. a.); Schulergebirge, Rosenau (Deubel).

var. *substrigosus* Er. Előpatak (Bielz).

serripes Gyll. Neppendorf, Sächs.-Regen, Gyeke (Bielz); Gyógy (Ormay); Schässburg (c. a.).

nanus Er. Hermannstadt (Bielz).

obscurus Er. Előpatak, Oláhfalú (Bielz); Hätzeg, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.).

var. *parallelus* Reitter. Rosenauer Geb., Baróth (Méhely); Előpatak (c. a.).

bidens Bris. Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Reys, Schässburg (c. a.).

umbrosus Sturm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Nagyhagymás, Kronstadt (Zinne, Deubel).

transsylvanicus n. sp. Reys, Héviz, Oláhfalú, Bükszád, Ober-Kerz, Ilyanika (Naszód), Rátosnya, Schässburg (c. a.).

Meligethes transsylvanicus n. sp.

Von der breiten Gestalt und der Grösse. Färbung und Punktierung des *M. umbrosus* Sturm und demselben jedenfalls nahestehend, jedoch durch die Bewaffnung der Vorderschienen und die männlichen Geschlechtsauszeichnungen sicher verschieden. Die Vorderschienen sind bis zum Spitzendrittel erweitert und sehr fein gekerbt, im Spitzendrittel befinden sich zwei grössere Zähne, die in der Regel durch ein oder zuweilen noch zwei kleinere getrennt sind. Beim Männchen ist das Metasternum in der Mitte der hinteren Hälfte tief dreieckig eingedrückt, am Vorderrande des Eindrucks befindet sich ein breiteres Doppelhöckerchen und an seinem Hinterrande ein einfaches scharfes Körnchen. Das vierte Ventralsegment ist in der Mitte des Hinterrandes schmal geglättet, das fünfte vor dem Hinterrande vertieft, und dieser etwas aufgebogen. Im übrigen scheint die Art vollständig dem *M. umbrosus* zu gleichen, auch die Schenkellinie der Hinterbeine hat einen ähnlichen Verlauf.

Die bei Bielz für *M. umbrosus* angeführten Lokalitäten sind zum grössten Teile auf die neue Art zu beziehen. Ich streiche jedoch nur jene Orte, von denen mir *M. transsylvanicus* bekannt geworden ist, die übrigen belasse ich als zweifelhaft bei *M. umbrosus*, der bei uns wahrscheinlich durch die neue Art ersetzt wird.

ater Bris. Kerzer Gebirge (Bielz).

maurus Sturm. Hätzeg, Götzenberg, Reys (Bielz); Bükszád, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

incanus Strm. Reys, Oláhfalú (Bielz); Borszék (c. a.).

ovatus Sturm. Hätzeg (c. a.); Rosenau (Deubel).

brachialis Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

picipes Sturm. Hermannstadt, Oláhfalú (Bielz); Reys (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

flavipes Sturm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).
 var. **moestus** Er. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz).
memnonius Er. Reys (Bielz), Kronstadt (c. a.).
niger Bris. Szováta (c. a.).
oehropus Sturm. Mediasch (Bielz); Reys (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).
brunnicornis Sturm. Reys (Bielz); Bodzaer Gebirge (Méhely); Kronstadt (Deubel).
angustus Küst. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.).
haemorrhoidalis Först. Oláhfalú, Borszék, Héviz, Unter-Kerz, Schässburg (♂, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
atramentarius Först. Schässburg (c. a.).
difficilis Heer. Héviz, Oláhfalú (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Hermannstadt, Schulergebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hátszeg (Deubel).
Kunzei Er. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Noa, Deubel).
morosus Er. Kronstadt Tömöser Pass (Bielz); Retjezat (c. a.).
 Bei dieser Art, ferner bei *M. tristis*, *exilis* und *brevis* wurden einige Fundorte des Bielz'schen Verzeichnisses, die sich nachträglich als irrtümlich herausgestellt haben, fortgelassen.
viduatus Sturm. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosennau, Zernest (Deubel).
pedicularius Gyll. Kerzer Gebirge, Reys (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Héviz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
sulcatus Bris. Siebenbürgen (Ganglb. K. v. M. 516).
assimilis Sturm. Schässburg (c. a.); Baróth, Gyeken, Záh (Méhely); Kronstadt (Deubel).
distinctus Sturm. Oláhfalú (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
lepidii Müll. Gyeken, Záh (Bielz); Gross-Scheuern (Ormay); Bükszád (c. a.).
Frivaldszky Reitter. Siebenbürgen (Ganglbauer).
tristis Sturm. Bükszád (Bielz); Balánbánya, Schässburg, Rátosnya (c. a.).
planusculus Heer. Bükszád, Oláhfalú, Előpatak (Bielz, c. a.); Hátszeg, Rátosnya, Szováta (c. a.).
aeicularis Bris. Siebenbürgen (Ganglbauer K. v. M. III. 533).
lugubris Sturm. Hermannstadt (Bielz); Tesla (Bodzaer Gebirge), Baróth (Méhely); Borszék (c. a.).
 var. **gagatinus** Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne), Ober-Komana, Baróth (Méhely); Hátszeg (c. a.).
egenus Er. Kerzer Gebirge, Előpatak, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

exilis Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz).
fumatus Er. Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz).
bidentatus Bris. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
erythropus Gyll. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Ober-Komana, Baróth (Méhely); Alsó-Rákos, Bükszád, Előpatak, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne).

(*Acanthogethes*.)

solidus Kugel. Hermannstadt (Bielz); Gyógy (Ormay).
brevis Sturm. Schässburg (Bielz); Kronstadt, Petersberg b. Kr. (Talinenberg, Deubel); Borszék (c. a.).

427. *Thalyera* Erichs.

fervida Oliv. Hermannstadt (am ausfließenden Saft einer Eiche, Ormay); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

428. *Poradius* Erichs.

ferrugineus F. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Mediasch, Reys, S.-Regen (Bielz); Resmar (Ormay); Balánbánya, Ober-Kerz (Glashütte), Klausenburg, Schässburg (c. a.), in Eichenschwämmen und in Bovisten; Kronstadt (Deubel).

429. *Cyehramus* Kugelann.

Die Arten leben auf verschiedenen Pilzen.

4-punctatus Herbst. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Ertlau, Annen-See (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Schanta, Bistra (Ormay).

luteus F. (lutaceus Reitter). Hátszeg, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Héviz, Oláhfalú, Borszék, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Detunata (Mallász).

var. **fungicola** Heer. Neudorf b. H., Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalú, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt Götzenberg, Schanta, Heltan (Ormay); Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.).

430. *Cyllodes* Erichs.

Strongylus Herbst.

Die Art lebt unter Baumrinde, namentlich aber in Baumpilzen.

ater Herbst. Hermannstadt, Retjezat, Parangul, Gross-Scheuern, Präsbe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Remete (Nagyenyed, Ormay); Malomviz, Alsó-Rákos (c. a.).

Cypocephalini.

431. *Cybocephalus Erichs.*

pulchellus Er. Schässburg (30. April, Hecke unter Blättern, c. a.).

politus Germ. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Cryptarchini.

432. *Cryptarcha Shuckard.*

strigata F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Eichenschwämme, c. a.); Honigberg (Deubel); Schauta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

(*Cryptarchula* Ganglb.)

imperialis F. Präsbe, Götzenberg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmingen, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (an Eichen, c. a.).

433. *Glischrochilus Murray. (Ips F.)*

Die Arten leben namentlich unter Baumrinden. (*Librodor.*)

quadriguttatus Oliv. Kerzer Geb., Brenndorf, Marosgebirge, Schässburg (Bielz).

a. *10-guttatus* Oliv. Kronstadt, Keisd b. Schässburg (Deubel); Schässburg (c. a.).

(*Glischrochilus* i. sp.)

quadripustulatus L. Kerzer Geb., Götzenberg, Marosgeb., Präsbe, Ober-Sches, Fogarasch, Kronstadt, Piatra mare (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota); Marosgebirge (unter Espenrinde, c. a.); Rodnagebirge, Zernest (Deubel).

434. *Pityophagus Shuckard.*

laevior Abeille.

var. *Deubeli* Ganglb. Siebenbürgen.

Ganglbauer führt (Käfer von Mitteleuropa. III. 556) *P. quercus* Reitter nach 1 ♂, welches von Deubel gesammelt wurde, für Siebenbürgen an; später hat er dasselbe Exemplar als Varietät des *P. laevior* Ab. erkannt; daher kann *P. quercus* nicht in unser Verzeichnis aufgenommen werden. In wessen Besitz sich das Exemplar befindet, ist mir nicht bekannt.

ferrugineus L. Szurul, Kerzer Geb., Kronstadt, Schulergeb., Bilargebirge (Bielz); Mahonviz, Bistra (auf frisch gesägten Fichtenbrettern). Frecker Geb. (Serbota, unter Fichtenrinde). Szurulukpass (an frisch geschälten Fichtenstämmen). Borszék (c. a.).

435. *Rhizophagus Herbst.*

Die Arten leben unter Baumrinden, an gefälltem Holz, zuweilen in morschem Holz, faulenden Vegetabilien etc.

depressus F. Hosszufalu (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

ferrugineus Payk. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge, Rosenau (Bucsecsgebiet, Deubel).

perforatus Er. Bodzaer Gebirge (Méhely); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

parallelocollis Gyll. Hätzeg (Bielz); Kronstadt (Zinne), Mezösámsond (Méhely); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

Brancsiki Reitter. Hermannstadt (junger Wald, 6 Exemplare, c. a.).

Rh. Brancsiki Reitter. Länge 3'4—3'9 mm. (♂♀.)

Statura *Rh. parallelocollis*, sed praesertim antice latior, testaceus, caput prothoraxque saepe paulo obscuriora. Caput prothorace angustius, post oculos breve, parallelum, retroversum haud angustatum, punctatum, nitidum, vertice transversim nonnihil impressum; oculi sat convexi, prominentes; antennarum articulum tertium secundo sesquilingius. Prothorax latus, medio nonnihil depressus, latitudine paulo longior, obovatus, lateribus rotundatis, postice paulum modo magis angustatus quam apicem versus, angulis anterioribus rotundatis, medio disci disperse sat valde punctatus. Elytra prothorace nonnihil angustiora, lateribus medio nonnihil rotundato-angulatis, pone medium rotundato-angustata, striato-punctata, subtilissime coriacea, minus nitida. Corpus subtus medio subtiliter disperse punctatum.

Mas: abdominis segmento primo medio depresso.

Von *Rh. parallelocollis* Gyll. unterscheidet sich die neue Art durch etwas gewölbtere Gestalt, in beiden Geschlechtern kleineren, weniger dicht punktierten Kopf; der Halsschild ist fast ebenso grob, aber weniger dicht, die Streifen der Flügeldecken auf der Basis etwas stärker punktiert, das dritte Führlglied etwas kürzer als bei *Rh. parallelocollis*, die Vorderecken des Halsschildes vollkommen abgerundet. Von *Rh. perforatus* Er. unterscheidet sie sich ausser durch die Halsschildform durch stärker vorkommende Augen, nach hinten nicht verengten und nicht eingeschnürten, vollkommen parallelen Hals, kürzeres drittes Führlglied.

Von *Rh. nitidus* F. weicht die neue Art ab durch geringere Grösse, flacheren Körper, weniger dicht punktierten Halsschild, in beiden Geschlechtern schmälern Kopf, stärker gewölbte Augen, stärker punktiertgestreifte Flügeldecken, weniger starke Aussenecke der Vorderschienen etc.; von *Rh. bipustulatus* F. durch breitere Gestalt, parallele Schläfen, gröbere Halsschildpunktuierung, breiteren Halsschild etc.; von *Rh. dispar* Payk. durch breitere, flachere Gestalt, in beiden Geschlechtern kleineren Kopf mit kürzeren parallelen Schläfen, etwas weniger gewölbten, breiteren, nach hinten verengten, auf der Scheibe flacheren, gröber und zerstreuter punktierten Halsschild, gröbere Punktstreifen der Flügeldecken, hellere Färbung etc. Unbekannt blieben mir die wohl nahe verwandten *Rh. Hahnenfeldi* Tourn aus Russland und Rumänien und *Rh. Brancsiki* Reitter aus Bosnien und Herzegowina.

Herr Reitter, dem ich die neue Art zusendete, war zuerst der Ansicht, es dürfte die neue Art (die ich als *Rh. brevicornis* beschrieben hatte) *Rh. dispar* v. Gyllenhal Thoms. sein. Ich kann mich dieser Ansicht aus den oben angeführten Gründen nicht anschliessen. Später hat Reitter (Wiener Z. XXIX. 206. 1910) die neue Art mit *Rh. Brancsiki* Reitter identifiziert, welche Mequignon (L'Abeille XXXI. 1909. 103—119, also nach dem Erscheinen des Catalogus Col. Eur. Heyden etc. 1906) als Synonym des *Rh. dispar* v. Gyllenhal Thoms. eingezeichnet hatte, und seine Art nach nochmaliger Untersuchung seines aus der Herzegowina und Bosnien stammenden Materials und der sieben-

bürrischen Stücke als gute Art aufrecht erhalten, worin ich ihm beipflichten muss, wenn unsere sielenb. Tiere tatsächlich mit seinen Tieren von obgenannter Herkunft übereinstimmen. Ich habe auf diese Untersuchungen hin meiner Art den Namen Rh. Branesiki Reitter substituiert und die Beschreibung stehen lassen, weil ohnehin nicht jedem Reiters Beschreibung zur Verfügung stehen wird.

nitidulus F. Fogarasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Borszék, Schulergebirge, Ober-Kerz Glashütte, c. a.).

dispar Payk. Hermannstadt, Präshe, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Resnár, Golzenberg (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelberge (c. a.; Detunata (Mallász).

bipustulatus F. Hätzeg, Gross-Scheuern, Götzberg, Poresst, Surul, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagel., Rotenturm, Malomviz, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

politus Helly. Hätzeg, S-Regen, Dees (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Marosujvár (c. a.); Rodnagelberge, Kronstadt (Deubel).

parvulus Payk. Schielthal, Zabinsgebirge (Bielz); Götzberg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Zernest (Deubel).

(Anonophagus.)

eribratus Gyll. Zabinsgebirge, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Buessers (alpin, in der Nähe von Krumholz aus Grashüscheln gesiebt, Deubel).

(Gynotolus.)

aeneus Richter. Hermannstadt (j. W., Bielz)

XXVIII. Cucujidae.

Monotomini.

436. *Monotoma* Herbst.

(Cyrocis.)

quadrioveolata Aub. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz)

conieicollis Guer. Kronstadt (Deubel); Klausenburg (bei formica rufa, Müller)

angusticollis Gyll. Schässburg (in den Nestern der formica rufa und pratensis, c. a.); Kronstadt (Deubel)

(Monotoma s. str.)

spenicollis Aub. Hätzeg (Bielz).

picipes Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Arpascher Gebirge, S-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Rodnagelberge, Kronstadt (Deubel).

var. **cavicula** Reitter. Baassen (c. a., auf Salzboden).

quadridentata Thoms. (brevicollis Aub.) Schässburg (c. a., Fuchsloch an Holzspanen); Kronstadt (Deubel).

bicolor Villa (quadricollis Aub.). Hätzeg (Bielz); Alsó Rákos (c. a.); Várhegy (Deubel)

longicollis Gyll. Hermannstadt (Bielz); Rodnagelberge (alpin, 1 Exemplar aus Grobüscheln gesiebt, Deubel).

Silvanini.

437. *Silvanus* Latreille.

(Orizaeplilus.)

surinamensis L. Hermannstadt (Bielz); Bistritz (c. a., in einem Hause mit Kornspeichern auf dem Aufboden in ungeheurer Menge).

(Silvanus i. sp.)

bidentatus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a., unter Fichtennadeln).

unidentatus F. Durch das ganze Berg- und Hüteland verbreitet, unter Baumrinden.

fagi Guer. Schässburg Fuchsloch, gesiebt. März 1898, c. a.)

438. *Chatartus* Reiche.

advena Waltl. Várhegy (Deubel)

Psammoecini.

439. *Psammoeceus* Latreille.

bipunctatus F. Kronstadt Gespeng, von Sumpfpflanzen gekötschert oder gesiebt, Deubel)

var. **Boudieri** Luc. Schässburg (Mundung des Schutergates in die Koker aus Blättern gesiebt, c. a.); Kronstadt (mit der Stammform, Deubel).

Uleiotini.

440. *Uleiota* Latreille.

Hyliota Reitter, *Hyleota* Seidl.)

planata L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, unter Baumrinde.

441. *Dendrophagus* Schönherr.

crenatus Payk. Hätzeg (Malomviz), Kronstadt (Bielz); Bistra (unter Fichtennrinde, selten, c. a.); Schulergebirge (Deubel)

Cuenjini.

442. *Cuenjus* Fabr.

cinnaberinus Scop. (sanguinolentus L.). Schässburg (Hattergraben, April, unter Eichenrinde), Borszék, Rodnagelberge (Bielz); Nussbach (10. Mai), Tusnád (11. September, unter Birken- oder Espenrinde, Deubel); Rátosnya (Müll.).

haematodes Er. Tusnád (Bielz, Deubel, unter Fichtenrinde); Schulergeb. (Juni, Deubel).

443. *Pediaeus Shuckard.*

depressus Herbst. Fogarasch (Bielz); Schässburg (Bielz, im Holze alter Eichen, c. a.); Hätzeg (c. a.; Klausenburg (Müller).

dermestoides F. Gross-Scheuern. Neudorf b. H., Holzmengen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Götzenberg (Ormay); Nussbach (Deubel).

fuscus Er. Hermannstadt (Bielz)

444. *Phloeostichus Redtenbacher.*

denticollis Redt. Kerzer Gebirge (Bielz).

Laemophloeini.

445. *Laemophloeus Stephens.*

(Leptus.)

monilis F. (denticulatus, Preysl.). Gross-Schenk (Bielz); Kronstadt (Zinne), Szováta, Schässburg (unter Buchenrinde und an trockenen Buchenästen, c. a.).

testaceus F. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Gyögy (Ormay); Schässburg (unter Weiden- und Eichenrinde), Rotenturm (c. a.).

(Cryptolestes.)

bimaculatus Payk. Holzmengen (Bielz).

duplicatus Walth. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg (unter Eichenrinde, Bielz); Nussbach, Honigberg (Deubel).

minutus Oliv. (pusillus Schönh.). Hermannstadt (Bielz).

ferrugineus Steph. Kronstadt (Noa, Deubel).

ater Oliv. Gross-Scheuern, Präshe, S.-Regen (Bielz).

clematidis Er. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Talmesch (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); S.-Regen (Müller).

corticinus Er. Hermannstadt (Bielz).

Passandriini.

446. *Prostomis Latreille.*

mandibularis F. Hermannstadt, Kastenholz b. H. (Bielz); Schässburg (Langheltgraben, in mürbig zerfallenden Eichenstämmen im Mai in grosser Anzahl samt den weissen, zarten, flachen Larven, c. a.).

XXIX. Cryptophagidae.

Telmatophilini.

447. *Telmatophilus Heer.*

sparganii Ahrens. Kronstadt (Gespreng, von Schilf gekötschert, Deubel).

caricis Oliv. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Kokelufer gekötschert, Mai, c. a.); Kronstadt, Honigberg (Deubel).

brevicollis Aubé. Hätzeg (Bielz).

typhae Fall. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **pumilus** Reitter. Zusammen mit der Stammform.

Schönherri Gyll. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Cryptophagini.

448. *Paramecosoma Curtis.*

melanocephalum Herbst. Hermannstadt, Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Kokelufer im Geniste häufig, c. a.); Kronstadt, Vargastal (Deubel).

449. *Henoticus Thomson.*

serratus Gyll. Zood, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelberge, Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).

450. *Pteringium Reitter.*

crenatum Gyll. Bistra (wahrscheinlich unter Fichtenrinde, c. a.); Bodzaer Gebirge, Schulergebirge (Deubel).

451. *Micrambe Thomson.*

vini Panz. Hermannstadt, Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Fuchslotch unter Weissbuchenrinde, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

abietis Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Borszék, Balánbánya (Egyeskő, c. a.).

452. *Cryptophagus Herbst.*

Die Arten führen sehr verschiedene Lebensweise in und auf pflanzlichen und tierischen Stoffen, einige leben in Ameisenkolonien und Wespenestern.

(Micrambinus.)

bimaculatus Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Cryptophagus i. sp.)

pubescens Strm. (lapponicus Reitter). Hammersdorf (Bielz); Buassen (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Wolkendorf bei Kr. (Deubel).

(C. lapponicus Gyll. ist eine gute Art und nicht Synonym des C. pubescens; er gehört dem Norden Europas an und kommt bei uns wohl nicht vor.)

subdepressus Gyll. Topánfalva (siebenb. Erzgebirge, c. a.).

- scanicus** L. Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen (Bielz); Madonviz, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Rodnagelb., Bodzaer Gebirge (Deubel).
- a. **patruelis** Strm. Schässburg Fuchslotz, Gross-Alischer Kuppen von Gesträuch geklopft, c. a.)
- Thomsoni** Reitter. Baassen, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Schulergebirge (Deubel)
- cylindrus** Kiesenw. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Buceses (Deubel)
- saginitus** Strm. Hermannstadt Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel)
- subfumatus** Kr. Torockó, Schässburg (in Eichenmulm, c. a.)
- dentatus** Herbst. Kerzer Gebirge, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Ratosnya, Schässburg (in Eichenmulm), Bistra (c. a.); Hermannstadt (auf blühendem Crataegus und an Weinfässern, Ormay); Rodnagelb., Kronstadt (Deubel)
- pallidus** Strm. Kronstadt (Zinne), Büdös, Schässburg (c. a.); Buceses-Gebiet (Deubel)
- inaequalis** Reitter. Büdös (c. a.)
- labilis** Er. Hätzeg (Bielz); Rodnagelb., Schässburg (Fuchslotz, gekötschert, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel)
- scutellatus** Newm. Hermannstadt (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Hätzeg, Kronstadt (Deubel)
- pumilio** Ganglb. Schässburg Fuchslotz, 1 Exemplar gekötschert, c. a.)
- dorsalis** Sahlborn. Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel)
- distinguendus** Strm. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a., Holzkeller)
- fumatus** Marsh. Hätzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.)
- quercinus** Kr. Büdös, Schässburg (c. a.); Rodnagelb., Buceses (Deubel)
- hamatus** Ganglb. Schässburg (in einer alten von Lasius brunneus bewohnten Eiche), Baassen (c. a.)
- posticus** Reitter. Bistra, Csukás (c. a., vidit Reitter).

C. posticus Reitter hat nach meinen Exemplaren die Grösse und Form des *C. reflexicollis* und die Färbung des *C. axillaris* Reitter, weicht von beiden ab durch hellere, rötlich-gelbe Färbung und die Lage des Lateralzähneins dicht hinter der Mitte der Halsschildseiten. In der Punktierung der Oberseite stimmt er ebenfalls mit meinem *C. axillaris* überein, ebenso in der Form des Halsschildes und der Flügeldecken. Der Halsschild meines *C. posticus* ist am Hinterrande deutlich breiter als lang. Seine gegenwärtige Stellung im Katalog ist nach meinen Exemplaren nicht richtig, er gehört unzweifelhaft, nach dem Vorgehen Ganglbauers, zwischen *C. axillaris* und *reflexicollis* als ein echter *Minionomus*. Reitter, dem ich das Exemplar vorlegte, teilte mir mit, dass er die Art nicht besitze, dass jedoch das vorliegende Stück *C. posticus* sein könne.

- fuscicornis** Strm. Hätzeg, Rotenturm, Schässburg (c. a.)
- badius** Strm. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg, Büdös (c. a.)
- acutangulus** Gyll. Hätzeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel)
- cellaris** Scop. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.), Schulergebirge, Alsó-Bákos (Deubel)
- affinis** Strm. Hermannstadt (Bielz), Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel)
- Skalitzkyi** Reitter. Schässburg (2 Exemplare in Lindenmulm, c. a.)
- Milleri** Reitter. Balánbánya (Egveskö, c. a.); Rodnagelb., Kronstadt (Deubel)
- pilosus** Gyll. Hermannstadt, Sachs-Regen (Bielz), Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel)
- lycopardi** Herbst. Hätzeg (Bielz); Schässburg Fuchslotz, am Waldrande unter Laub, 28. Juli, c. a.)
- setulosus** Strm. Rotenturm (c. a.); Hermannstadt (Alter Berg, Ormay); Kronstadt (Deubel)
- Schmidtii** Strm. Karlsburg, Alsó-Bákos, Schässburg (1 Exemplar im Hausgarten, 1 Exemplar im Reissel, c. a.); Kronstadt (Deubel)

(*Minionomus*.)

- nitidulus** Mill. Hermannstadt (Bielz), Baassen, Schässburg (Fuchslotz, von einer Hecke geklopft, Breite aus Eichenholz oder Mulm gesiebt, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel, Méhely).
- axillaris** Reitter. Kerzer Gebirge (Bulental), Schässburg, Frocker Geb., Serbota, c. a., vidit Reitter); Buceses, Schulergebirge (Deubel)
- reflexicollis** Reitter. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Madonviz (Lunka negra, c. a.); Rodnagelb., Deubel); Götzberg (Ormay).
- Deubeli** Ganglb. Buceses, Rotenturm, Schässburg, Büdös, Torockó, Borszék (c. a.); Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).
- C. baldensis* Er. den Bielz aus dem Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, aus Fogarasz und Kronstadt anführt, ist jedenfalls aus unserem Kaferverzeichnis zu streichen, da diese Art den Pyrenäen und den italienischen Alpen (Monte Baldo) angehört. Bielz kannte die beiden von Ganglbauer erst 1895 beschriebenen neuen Arten *C. Deubeli* und *transsylvanicus* nicht. Nach Ganglbauer (Kafer von Mitteleuropa III, 695 Anmerk.) scheinen von *C. baldensis* bis jetzt nur vier Exemplare bekannt zu sein. Die Bielzschen Fundorte des *C. baldensis* gehören zu Deubel und dem selteneren *transsylvanicus*.
- transsylvanicus** Ganglb. Schässburg (c. a.); Buceses (Deubel)

453. *Spaniophaeus* Reitter.

- laticollis** Mill. Surul (Bielz)

454. *Anthrophagus Latreille.*

Die Arten dieser Gattung leben auf den Blüten niederer Pflanzen, ihre Larven in Hummelnestern.

nigricornis F. Schietal, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne), Zernest (Deubel).

silaceus Herbst. Kronstadt (Bielz); Nagy-enyed (c. a.); Schullergebirge (Deubel).

pallens Oliv. Zibinsgebirge, Zood, Kronstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.); Borszék (c. a.).

Atomariini.

455. *Caenoscelis Thomson.*

ferruginea Sahlb. Präsche, Fogarasch (Bielz); Schässburg (Scherkes, c. a.).
Fleischeri Reitt. Hätzeger Gebirge (subalpin, Deubel).

456. *Grohenia Holdhaus.*

fimetarii Herbst. Schässburg (NE-Abhang der Breite, gesicht, 13. April, c. a.); Schullergebirge, Kronstadt (Deubel).

457. *Atomaria Stephens.*

Die Arten leben unter verwesenden Pflanzenstoffen.

(*Atomaria* s. str.)

Wollastoni Sharp. Karlsburg (Bielz).

carpathica Reitter. Csukás (c. a.).

umbrina Gyll. Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

acutifrons Ganglb. Schässburg (Schleifengraben, Juli, c. a.).

bella Reitt. Búdös (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

nigriventris Steph. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Kronstadt (Deubel); Unter-Kerz, Elő-patak, Schässburg (c. a.).

linearis Steph. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Bielz).

dilufa Er. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Atels-hill, an feuchten Stellen unter Laub, c. a.).

alpina Heer. (*elongatula* Er.). Gross-Scheuern (Bielz); Balánbánya (Egyeskő), Frecker Gebirge (Serhola, c. a.); Schullergebirge, Zernest (Deubel).

procerula Er. Kerzer Gebirge (Bielz).

prolixa Er. Schässburg, Búdös (c. a.); Schullergebirge, Kronstadt (Zinne, Deubel).

pulchra Er. Búdös (c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Bucsecsgebiet (Deubel).

impressa Er. Schässburg (Türkenhill, Kokelufener oder Röhricht an sumpfiger Stelle, 24. Oktober, c. a.).

fuscicollis Mannh. Hermannstadt, Talmesch, Baumgarten (Ormay); Praz-

már, Obervenezie (Méhely); Maros-ujvár, Schässburg (c. a.); Rodnageb., Kronstadt (Deubel).

munda Er. Kronstadt (Deubel).

unifasciatus Er. Rotenturm (Altufer unter Steinen, nicht selten, c. a.).

grandicollis Bris. Rodnagebirge (Deubel).

mesomelaena Herbst. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).

gutta Steph. Gross-Scheuern (Bielz).

gravidula Er. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (Kokelufener im Geniste, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

fuscata Schönl. Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Zernest, Rodnagebirge (Deubel).

atricapilla Steph. Kronstadt (Zinne), Schullergebirge, Rodnagebirge (Deubel).

Zetterstedti Zett. Baróth (Méhely); Honigberg (Altufer, Deubel).

peltata Kr. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Siechholzer, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

fuscipes Gyll. Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pusilla Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kastenholz, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos, Hätzeg (c. a.); Gyógy (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

nigripennis Payk. Reys (Bielz).

Atilla Reitter. Rotenturm (c. a.).

furgida Er. Hätzeg, Vargastal, Honigberg, Erösd (Altufer), Rodnageb. (Deubel).

apicalis Er. Hammersdorf, Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Marosujvár, Rotenturm (c. a.).

ruficornis Marsh. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

analis Er. (*tesiacae* Bielz nec Steph.) Hermannstadt (Bielz); Baumgarten, Talmesch (Ormay); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

Deubeli Holdhaus. Rodnagebirge (Kuhhorn, alpin aus Grasbüscheln gesicht, Deubel).

cognata Er. Schässburg (c. a.).

var. **rubida** Reitter. Schässburg (c. a.).

formosa Reitter. Rotenturm (c. a.).

gibbula Er. Gross-Scheuern, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **mehadiensis** Ganglb. Hätzeg (Deubel).

458. *Ootypus Ganglbauer.*

globosus Wahl. (*nigriclavus* Reitter). Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Kokelufener, c. a.).

459. *Ephistemus Stephens.*

(Ephistemus s. str.)

globulus Payk. Kronstadt (Bielz); Mabornitz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rodnagelberge (alpin Deubel).var. **dimidiatus** Sturm. Hermannstadt (Gross-Schenern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel)).

(Curelius.)

exiguus Er. Hermannstadt (Bielz).XXX. *Erotylidae.*460. *Tritoma Fabr.*
*Cyrtotriplax Crotch.***bipustulata** F. Hätzeg, Götzenberg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Marosgeb., Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (an verpilzten Eichenstumpfen, c. a.); Resinar (Ormay).461. *Triplax Paykall.*

Die Arten leben auf Baumpilzen.

aenea Schall. Durch das ganze Gebiet verbreitet.**elongata** Lac. Schässburg (Wrieberg, c. a.);**russica** L. Hätzeg, Retjezat, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Csukás (c. a.); Rotenturm (Deubel).**pygmaea** Kr. Schässburg (Kokelufer im Detritus, c. a.).

(Platylina.)

scutellaris Charp. Bistra, Rotenturm, Csukás, Zalatna (c. a.); Kronstadt (Deubel); Marosgebirge (Müller).var. **Gyllenhali** Crotch (Bicolor Gyll.). Retjezat, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Piatra mare, Bozener Pass, Marosgebirge (Bielz).**carpathica** Reitter. Csukás (zusammen mit *T. scutellaris* auf Baumpilzen, c. a.).**lepidia** Fald. Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hätzeg, Rosenau (Deubel).**rufipes** F. Hätzeg, Gross-Schenern (Bielz); Rotenturm (Ormay, Deubel, c. a.); Marosgebirge (Müller).**collaris** Schall. Rotenturm (c. a.).**Dacnini.**462. *Dacne Latreille.*

Die Arten leben wie die vorigen.

notata Gmel. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, S. Regen (Bielz); Schässburg, Csukás (c. a.); Hongberg (Deubel).**rufifrons** F. Rotenturm, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Kronstadt, Csukás (c. a.).**bipustulata** Hübner. Durch das ganze Gebiet verbreitet.463. *Combocerus Bedel.***glaber** Schall. Hätzeg, Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Stolzenburg, Hermannstadt (Ormay); M.-Asarhely (Müller).**Diphyllini.**464. *Diphyllus Stephens.***lunatus** F. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt, Hätzeg (Deubel); Ober-Komana (unter Rothbuchenrinde, Mähely).465. *Diplocoelus Guerin.***fagi** Chev. Kronstadt (Zinne, Bielz, Deubel, c. a.); Rotenturm (Ormay); Szavata, Schässburg (c. a.).XXXI. *Phalacridae.*466. *Phalacrus Paykall.***grossus** Er. Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).**hybridus** Flach. Siebenbürgen.**limbatus** F. cornutus Panz. Hätzeg, Giesau, Marpod, Reps, Balánbánya, S.-Regen, Záh (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay, Kronstadt, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.)).var. **Humberti** Rye. Kronstadt (Zinne, Mähely).**caricis** Sturm. Szamosujvár (Mähely); Hongberg (Altfur, Deubel).467. *Olibrus Erichs.***aeneus** F. Kronstadt (Zinne, Mähely).
mittefolii Payk. Neudorf b. H. Mediasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Borszék (c. a.).**corticalis** Panz. Frecker Gebirge, Leutatal (unter der Sägemühle, in Sagespänen, Schässburg (Fuchsloch, c. a.)).**Gerhardtii** Flach. Zalatna, Schässburg (Breite, auf Senecio (c. a.)).**aenescens** Kust. Szamosujvár (Mähely); Schulergebirge (Deubel).

Das Vorkommen dieser Art bei uns ist näher zu prüfen, da sie dem westlichen Europa angehört.

bisignatus Men. Déva, Karlsburg (c. a.).
flavicornis Sturm. Hermannstadt (Ormay); Hätzeg (c. a.).**liquidus** Er. Hätzeg (Bielz); Rotenturm, Hermannstadt (J. W., c. a.).**affinis** Sturm. Mühlbach, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Gyógy (Ormay); Schässburg, Ober-Kerz (Glasbitter), Retjezat (c. a.); Hätzeg, Rosenau, Forzburg (Deubel).

- bicolor** F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Zood, Schässburg, Repts, Előpatak, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Hammersdorf, Klausenburg, Alsó-Rákös, Borszék, Rátosnya (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- bimaculatus** Küst. Repts, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

468. *Stilbus* Seidlitz.

- testaceus** Panz. Neudorf b. H., Holzmen-gen, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- atomarius** L. Marpod (Bielz); Prázsmár, Szamosujvár (Mélhely); Schässburg, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. **picatus** Flach. Kronstadt (Deubel).
- oblongus** Er. Hermannstadt, Baumgarten (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XXXII. Latridiidae.

Dasycerini.

469. *Dasycerus* Brongniart.

- sulcatus** Brongn. Klausenburg (Bielz).

Lathridiini.

470. *Lathridius* Herbst.

Die Arten leben in verwesenden organischen Stoffen, in Pilzen, unter Baumrinden etc.

- lardarius** Dey. Schanta (Ormay).
- angusticollis** Gyll. (angulatus Mannh.). Retjezat, Fogarasz (Bielz); Unter-Kerz, Zalatna, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rodnagelbirge, Kronstadt, Zernest (Deubel).
- Pandellei** Bris. Balánbánya (auf frisch gesägten Fichtenbrettern), Oláhfalú (c. a.).
- campicola** Gerhardt, d. ent. Z. 1911. 283. Schässburg (c. a.).
- alternans** Mannh. Porcest, Surul (Bielz); Büdös, Csukás, Rotenturm (c. a.).
- rugicollis** Oliv. Hermannstadt, Neudorf b. H., Girelsau (Bielz); Oláhfalú (c. a.); Rodnagelbirge, Bucecs, Schulergebirge (Deubel).

471. *Enicmus* Thomson.

Die Arten leben wie die vorigen. (Conithassa.)

- hirtus** Gyll. Präsbe, Freck, Kerzer Geb., Schässburg (Bielz); Rodnagelbirge, Büdös, Előpatak, Csukás, Malomviz (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- minutus** L. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Harbachufer, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz,

Előpatak, Balánbánya, Baassen (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Rodnagelbirge, Kronstadt, Zernest (Deubel).

- consimilis** Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm, Zood (Ormay); Rosenau (Bucecs-Gebiet, Deubel).

brevicollis Thoms. Kerzer Gebirge (Bielz). (Enicmus i. sp.)

testaceus Steph. Kronstadt (Deubel).

rugosus Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Előpatak, Rodnagelbirge (c. a.).

transversus Oliv. Hätzeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Balánbánya, Schässburg, Rodnagelbirge, Zalatna, Pnj (b. Hätzeg, c. a.); Michelsberg, Rotenturm (Ormay).

brevicornis Mannh. Kronstadt (Zinne, Deubel).

472. *Cartodere* Thomson.

Die Arten leben wie die vorigen, zuweilen auch in Ameisennestern.

elongata Curtis. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Előpatak, Baassen (c. a.); Hätzeg, Alsó-Rákös (Tepe, Deubel).

ruficollis Marsh. Hermannstadt (Bielz).

filiformis Gyll. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Corticariini.

473. *Corticaria* Marsham.

Die Arten leben wie die vorigen, auch unter Laub.

(Brevina.)

sylvicola Bris. Kronstadt (Bielz).

Der Catalogus col. Europae 1906 weist die Art nur aus den Pyrenäen nach, Bielz's Angabe bedarf daher der Bestätigung.

(Corticaria i. sp.)

pubescens Gyll. Retjezat, Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Kokel unter Geniste), Unter-Kerz (Altufer, ebenso, c. a.); Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagelbirge (Deubel).

tulva Com. Kronstadt, Erösd (Altfluss), Zazon (Deubel).

umbilicata Beck. Schässburg (Fuchsloch), Alsó-Rákös (Tepe, c. a.); Kronstadt (Deubel).

impressa Oliv. (denticulata Gyll., badia Mannh.). Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schanta, Rotenturm (Ormay); Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

abietum Motsch. interstitialis Reitter. Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay); Paringul, Nagybagmász, Schulergebirge (Deubel).

- robusta** Ganglb. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- linearis** Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).
- Eppelsheimi** Reitter. Frecker Geb. (Serbota, c. a.).
- foveola** Beck. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge (Deubel).
- longicollis** Zett. Kerzer Gebirge (Bielz); Schassburg (Lopatak, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelbirge (c. a.); Rotenturm, Prashe Ormay); Kronstadt (Deubel).
- serrata** Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schassburg, S.-Regen (Bielz), Zalatna, Bilanbanya (c. a.); Hätzeg (Deubel).
- saginata** Mannh. Baassen (c. a.); Schulergebirge, Erosd (Altfluss, Deubel).
- obscura** Bris. Schassburg (Reissel, c. a., 1 Ex.).
- Pietschi** Ganglb. Schassburg (Mühlenham, 1 Ex. im Flüge gefangen, c. a.).
- elongata** Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Sachs. Regen (Bielz, Hätzeg, Karlsburg, Lopatak, Schassburg in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Klempold (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- ferruginea** Marsh. (aenealis Reitter). Kerzer Gebirge (Bielz); Lopatak, Frecker Gebirge (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

474. *Melanophthalma Molschulsky.*

- transversalis** Gyll. (crocata Mannh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Unterkerz, Schassburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel); Bistriz (Müller).
- var. **sericea** Mannh. (albopilis Reitter). Gycke (Méhely); Kronstadt (Deubel).
- distinguenda** Com. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schassburg, Szovata (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- fuscipennis** Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Unterkerz, Schassburg (c. a.). (Corticarina.)
- gibbosa** Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland.
- similata** Gyll. Hermannstadt, S. Regen (Bielz); Unterkerz (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- fuscula** Gyll. Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen (Bielz); Gross-Scheuern, Hammersdorf (Ormay); Unterkerz (c. a.); Rodnagelbirge, Nagyhagymás (Deubel).
- var. **trifoveolata** Redl. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schassburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- tulvipes** Com. Kerzer Gebirge (Bielz); Schassburg (Scherkes, c. a.).

- truncatella** Mannh. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Schassburg (Kokeluf, im Geiste, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Holoparamecini.

475. *Holoparamecus Curtis.*

- caularum** Aub. Hermannstadt (Bielz); Unterkerz wahrscheinlich am Klosterweiher aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.)

XXXIII. Mycetophagidae.

Mycetophagini.

476. *Pseudotriphyllus Reitter.*

- suturalis** F. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt Ormay, Schassburg (c. a.).

477. *Triphyllus Latreille.*

- bicolor** F. punctatus F. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Klempold, Gyögy (Ormay); Büdös, Schassburg (Baumtze), Hätzeg, Lopatak, Baassen (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

478. *Mycetophagus Helwig.*

- Die Arten leben auf Baumpilzen, oft trifft man sie unter Baumrinde.

(*Tritoma* Müll. Reitter.)

- quadripustulatus** L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

- a. **antemacularis** Torre. (bipustulatus Schilsky). Tuszad, Kukukhegy (Frdö-videk, Méhely); Fogarascher Gebirge, Csukás, Schassburg, Szurdokpass (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- var. **erythrocephalus** Lr. (impustulatus Schilsky). Sosmezo (Méhely); Frecker Gebirge (Serbota), Schassburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistriz, S.-Regen (Müller).

- piceus** L. Präzsmár (Méhely); Schassburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

- a. **sempustulatus** F. Schassburg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

- a. **lunaris** F. Schassburg (c. a.), Honigberg (Deubel).

- a. **undulatus** Marsh. Honigberg (Deubel).

- a. **punctulatus** Schilsky. Schassburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

- a. **humeralis** Schilsky. Honigb. (Deubel).

- decempunctatus** F. Hätzeg, Zibinsgebirge, Fogarasch, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schassburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- atomarius** F. Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Unterkerz, Bukszád, Medhasch, S. Regen (Bielz), Rotenturm, Csukás, Schassburg, Alsó-Bakos (c. a.); Prashe (Ormay); Kronstadt (Deubel).

- quadriguttatus** Müll. Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).
- multipunctatus** F. Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Präsbe (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).
- fulvicollis** F. Hermannstadt, Präsbe, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a., Eiche); Rosenau (Deubel).
- var. **Deubeli** Méhely. Kronstadt (Méhely). (Philomyces.)
- populi** F. Hermannstadt, Präsbe, Sächs.-Regen (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

479. *Litargus Erichs.*

- connexus** Geoffr. (bifasciatus F.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Holzmengen, Götzberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Präsbe (Ormay); Alsó-Rákös, Búdös, Schässburg, Klausenburg (c. a., unter Baumrinde, namentlich Espen- und Weidenrinde); Rosenau, Kronstadt (Deubel).

480. *Typhaea Curtis.*

- stercorea** L. (fumata L.). Klein-Cserged (b. Blasendorf), Neudorf b. H., Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Baumgarten, Michelsberg, Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

XXXIV. Sphindidae.

481. *Sphindus Chevrolat.*

- dubius** Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Előpatak, Schässburg (c. a.).
- grundis** Hampe. Klausenburg (Bielz).

482. *Aspidiphorus Latreille.*

- orbiculatus** Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Csukás, Schässburg (c. a., auf Pilzen); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Von der Beschreibung Kiesenwetters (Naturg. d. Ins. Deutschlands, Anobiidae, p. 200) weicht unsere Art durch unpunktierten Kopf und durch die Fühlerbildung ab, indem das erste Glied der Fühlerkeule deutlich länger als breit, das zweite mindestens so lang als breit ist.

XXXV. Cisidae.

483. *Hendecatomus Muls.*

- reticulatus** Hbst. Kronstadt (Deubel).

484. *Xylographus Mellié.*

- bostrichoides** Dufour. Alsó-Rákös (Tepe, Mai, c. a., Deubel).

485. *Cis Latreille.*

Die Arten leben in Baumschwämmen. (Hdraule.)

- striatulus** Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).
- compus** Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenau (Deubel).

(Eridaulus.)

- lineatocribratus** Mell. Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

- nitidus** Hbst. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákös, Rodnagebirge (c. a.); Tusnád, Bucsecs-Gebiet (Deubel).

- Jacquemarti** Mell. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákös, Balánbánya (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel).

- var. **glabratus** Mell. Kerzer Geb. (Bielz); Rodna-Gebirge, Alsó-Rákös (c. a.); Schulergebirge (Deubel); Marosgebirge (Müller).

(Cis i. sp.)

- boleti** Scop. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

- var. **caucasicus** Men. Hätzeg, Schässburg (c. a.).

- setiger** Mell. (villosulus aut nec Marsh.). Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

- micans** F. Hätzeg, Götzberg, Ober-Sebes, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

- hispidus** Gyll. Hätzeg, Zibinsgeb., Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Resinar (Ormay).

- quadrideus** Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Zalatna (c. a.).

- fissicollis** Mell. Kronstadt (Bielz).

- Perrisi** Abeille. Schässburg, Malomviz (c. a.).

- alni** Gyll. Neudorf b. H., Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Búdös (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

- bidentatus** Oliv. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge, Schässburg, Balánbánya (c. a.); Resinar (Ormay).

- festivus** Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Neustadt b. Kr. (Deubel).

- oblongus** Mell. (pygmaeus aut.). Kronstadt (Bielz).

- vestitus** Mell. Kerzer Gebirge (Bielz).

castaneus Mell. Hätzeg, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Előpaták (c. a.); Hermannstadt (Ormay).
punctulatus Gyll. Schubergergebirge (Deubel).
lissicornis Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Baassen, Hätzeg (c. a.); Wolkendorf b. Kr. (Deubel).

486. *Rhopalodontus Mellié.*

Rh. valachiae Reitter, den Bielz anführt, ist nach Seiditz (Fauna transs. p. 530) unaufgeklärter Name in litteris (Sammlungsname).

fronticornis Panz. Hätzeg, Grossscheuern, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Badánybanya (c. a.); Besinar (Ormay); Kronstadt, Nussbach (Deubel).
perforatus Gyll. Präsche, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Nussbach (Deubel).

487. *Ennearthron Mellié.*

Wagae Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
affine Gyll. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Rodnagebirge (c. a.); Rotenturm (Ormay).
cornutum Gyll. Gross-Scheuern, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Matosgeb. (Müller).
laricinum Mell. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

488. *Ocotemnus Mellié.*

glabriculus Gyll. Hätzeg, Zibinsgebirge, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Bogen (Bielz); Retjezat, Ober-Kerz (Glashütte), Karlsburg, Schässburg (c. a.).
 (Orophius.)
mandibularis Gyll. Zibins Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Götzenberg (Ormay).

XXXVI. Colydiidae.

Die Arten sind Holz- und Rindentiere.

Colydiini.

489. *Colidium Fabr.*

elongatum F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
filiforme F. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

Aglenini.

490. *Aglenus Erichs.*

brunneus Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H. (Bielz).

Ditomini.

491. *Ditoma Herbst.*

Synchitodes Crotch.

crenata F. Durch das ganze Gebiet verbreitet unter Baumrinde.

492. *Colobirius Latreille.*

marginatus Latr. semarginatus Er. Gross-Scheuern, Rotenturm, Kerzer Gebirge, S.-Bogen (Bielz); Alsó Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Nussbach, Houghberg (Deubel).

493. *Synchita Helwig.*

Ditoma Crotch. Reitter.

humeralis F. juglandis F.). Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Burg, im Fluge gefangen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

494. *Cicones Curtis.*

variegatus Hellw. Kerzer Gebirge (Bielz), Kronstadt (Zinne, Deubel).
pictus Er. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (von Hecken geklopft), Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

495. *Endophloeus Erichs.*

Markovichiana Pill. spinulosus Latr. Präsche, Fogarascher Gebirge (Bielz); Rotenturm (aus einem verpilzten Rotbuchenstamm, c. a.).

Orthocerini.

496. *Orthocerus Latreille.*

clavicornis L. muticus L.). Präsche (Bielz); Borszék, Schässburg (Breite, unter Moos, c. a.); Gyergyó-Lőgyes (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

Corticini.

497. *Corticus Latreille.*

lauricus Germ. Kerzer Gebirge (Bielz);
tuberculatus Germ. In allen Gebirgswäldern unter Baumrinde, namentlich unter Farnrinde, aber auch im Bergland, so in Schässburg unter Eichen- und Buchenrinde.

Apistini.

498. *Apistus Motsch.*

Rondanii Villa. Hätzeg (Páros, Bielz)

Coxeini.

499. *Diodesma Latreille.*

subterranea Duponch. Zibinsgeb. (Bielz).

Tarphlini.**500. Langelandia Aubé.**

anophthalma Aub. Gross-Scheuern (Bielz).

Pycnomerini.**501. Dechomus Duval.**

sulcicollis Germ. Ober-Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (im Holz und unter der Rinde alter Eichen und Eichenstümpfe).

502. Pycnomerus Erichs.

terebrens Ol. Hermannstadt, Holzmeigen, S.-Regen (Bielz); Honigberg, Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

Myrmecoxenini.**503. Myrmecoxenus Chevrolat.**

subterraneus Chevr. Schässburg (Kreuzberg, im Neste der *Formica pratensis*, c. a.); Kronstadt (Deubel).
vaporiorum Guer. Kronstadt (Bielz).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser dem Süden Europa's angehörigen Art in Kronstadt, wo er nur den *M. subterraneus* sammelte.

Deretaphrini.**504. Oxylaemus Erichs.**

cylindricus Panz. Dobra, Hermannstadt (Bielz); Hätzeg (c. a.); Zernest, Honigberg (Deubel).

505. Teredus Shuckard.

opacus Habeln. Zibinsgelirge (Bielz).

Anommadini.**506. Anommatus Wesmæl.**

12-striatus Müll. Dobra, Gross-Scheuern, Neudorf b. H. (Bielz).

Bothriderini.**507. Bothrideres Erichs.**

contractus F. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Dees, Záh, Schässburg (unter Weidenrinde, Bielz).

Cerylonini.**508. Cerylon Latreille.**

Die Arten leben unter Baumrinde.

evanescens Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.).

tagi Bris. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Csukás,

Előpatak, Baassen, Schässburg, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.); Götzenberg (Ormay); Alsó-Rákös, Kronstadt (Deubel).

histeroides F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

ferrugineum Steph. Reljezat, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm, Präszaka (Zalatna, c. a.); Zood (Ormay); Zernest (Deubel).

impressum Er. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

deplanatum Gyll. Hätzeg, Porcesest, Kerzer Gebirge, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Tusnád (Deubel).

XXXVII. Endomychidae.**Sphaerosominae.****509. Sphaerosoma Leach.**

(Alexia Steph.)

Die Arten werden aus Moos und Grasbüscheln gesiebt.

glabrum Reitter. Hammersdorf, Kerzer Gebirge (Ormay); Kronstadt (Deubel).

globosum Strm. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. *rubrum*. Rotenturm (c. a.).

Im Rotenturm sammelte ich in grosser Anzahl eine etwas kleinere, stets rötlichgelbe, also ausgefärbte Form von mehr rundlicher, aber weniger hochgewölbter Form, die ich als lokale Abänderung bezeichne mit dem Namen *rubrum*. Aus unserem Verzeichnis sind wohl zu streichen: *Sph. pubescens* Friv. die im Schielthal pilifera, die in Hermannstadt, und pilosissima, die in Kronstadt vorkommen soll.

punctatum Reitter. Frecker Gebirge (Serbota, 1 Ex., c. a.).

laevicollis Reitter. Negoi (Deubel); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

carpathicum Reitter. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Bistra, Búdös, Torockó, Topánfalva, Schulergebirge (c. a.); Bucsecs, Nagybagymás (Deubel).

pilosum Panz. Kerzer Geb., Kronstadt (?) (Bielz); Zalatna (c. a.).

Reitteri Ormay. Frecker Gebirge, Kronstadt, Schässburg, Rodnagelbirge, Rotenturm, Búdös (c. a.).

Mycetaeinae.**Mycetaeini.****510. Clemmus Hampe.**

troglodytes Hampe. Hermannstadt (Bielz).

511. *Symblotes Redtenbacher.*

gibberosus Luc. Hermannstadt (Bielz), Schässburg (im Holze alter, von *Lasius brunneus* bewohnter Eichen, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

512. *Mycetaea Stephens.*

hirta Marsh. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Leiestini.

513. *Leiestes Redtenbacher.*

seminigra Gyll. Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.).

Trochoideinae.

514. *Pleganophorus Hampe.*

bispinosus Hampe. Hermannstadt (j. W. an alten, von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen).

Endomychinae.

Dapsini.

515. *Dapsa Latreille.*

denticollis Germ. Hermannstadt, Hammersdorf, Hellau, Michelsberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Raassen, Schässburg, Hätzeg (unter Laub und verwesenden Pflanzenstoffen, c. a.); Bistritz (Deubel); Gorgény-Szt. Imre (Müller).

516. *Lycoperdina Latreille.*

bovistae F. Hermannstadt (Bielz) (Golgia.)

succincta L. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Hammersdorf, Porsest, Reys, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz), Rotenturm, Zalatna (in kleinen Bovisten auf Hutweiden, c. a.)

var. **disca** Gerst. Schässburg, Karlsburg (c. a.).

crassicornis Reitter. Ober-Kerz (Reitter).

517. *Mycetina Mulsant.*

cruciata Schall. Retjezat, Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Fogarascher Pass, Rotenturm, Schässburg (Bielz); Hätzeg (Deubel); Szurdokpass (c. a.).

a. **calabra** Costa. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Bucecs, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **Fussli Csiki.** Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Hätzeg (Deubel).

Bei der Färbungsänderung *Fussli Csiki* und die Färbeflecken einfarbig gelb, nur ein bläuer Schattenfleck zu beiden Seiten in der Mitte derselben deutet die Seitenflecken der a. *calabra* an, die Naht ist schmal gebändert, ebenso die laterale Querfalte der Hals-schilde; im übrigen kann die ex. Färbungsänderungen nicht der Rang der Sub-species (Varietät) zuerkannt werden.

Endomychini.

518. *Endomychus Panzer.*

coccineus L. Zilinsgebirge, Götzenberg, Prasbe, Holzungen, Porsest, Ober-Sches, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tesla, Dongökő, Bozauer Pass, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Csukás, Bükszá, Előpatak, Malomviz, Borszék (c. a., unter Baumrinden, wie der folgende).

a. **Biehli** Reitter. Siebenbürgen.

thoracicus Charp. Retjezat, Hätzeger Geb., Zilinsgebirge, Götzenberg, Prasbe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Bucecs, Tesla, Dongökő, Bozauer Pass, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Balánbánya, Bistra, Karlsburg, Paringul, Alsó-Rákös, Szurdok-Pass, Toroczko, Előpatak, Zalatna, Malomviz (c. a.).

XXXVIII. Coccinellidae.

Epilachninae.

519. *Subcoccinella Huber.*

24-punctata L. Hätzeg, Hermannstadt, Holzungen, Reys, Héviz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S. Regen, Dees, Gyeke (Bielz); Gyógy, Szamosujvár (Ormay); Tordaer Schlucht (c. a.).

var. **meridionalis** Motsch. Kronstadt (Bielz); Naszód, Tordaer Schlucht, Déva, Toroczko, Topánfalva, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

a. **4-notata** F. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **limbata** Moll. saponariae Muls.; Hätzeg (Deubel).

520. *Cynegetis Redtenbacher.*

impunctata L. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Zool, Kronstadt, S. Regen (Bielz); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Hätzeg (Deubel); Szováta (auf Salzboden zwischen Röhricht, 5. Juni, c. a.).

var. **palustris** Redt. Hätzeg.

Coccinellinae.

Hippodamitini.

521. *Hippodamia Mulsant.*

tredecimpunctata L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Freck, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Gyeké (Bielz); Schässburg (c. a.).

7-maculata Deg. Neudorf b. H., Girelsau, Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

522. *Adonia Mulsant.*

variegata Goeze. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Reys, Kronstadt, Hosszufalu, Predaal, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeké, Záh (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Annen-See (c. a.); Hätzeg (Deubel).

a. **constellata** Laich. Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

a. **neglecta** Wse. Dees, Kronstadt (c. a.); Bonc-Nyires, Mező-Samsoni (Méhely).

a. **carpini** Geoffr. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Bodzaer Gebirge (Deubel).

a. **5-maculata** F. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. **turcmenica** Zubk. (maculiger Wse.). Hermannstadt (Ormay).

a. **usulata** Ws. Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **corsica** Reiche (transsylvanica Penckel). Schulergebirge (Deubel).

523. *Anisosticta Duponchel.*

19-punctata L. Gross-Scheuern, Reys, Kronstadt, Dees, Gyeké, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Szováta (auf Sumpfpflanzen, c. a.).

524. *Semiadalia Crotch.*

notata Laich. Neudorf b. H., Porcesst, Borszék (Bielz); Rodnagelbirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

11-notata Schneid. Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Borszék, Gyeké, Záh (Bielz); Tordaer Schlucht, Reys (c. a.).

a. **cardui** Brahm. Bodzaer Geb. (alpin), Kronstadt (Deubel).

a. **9-punctata** Fourc. Baróth, Bone-Nyires (Méhely); Bodzaer Gebirge (alpin), Kronstadt, Hätzeg (Deubel).

Coccinellini.

525. *Aphidecta Weise*

obliterata L. (livida Deg.). Präse, Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (c. a.); Schanta (Ormay).

a. **sexnotata** Thunb. Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

526. *Adalia Mulsant.*

conglomerata L.

a. **bothnica** Payk. Nagyhagyomás, Schässburg (Deubel).

bipunctata L. (dispar Schneid.). Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Iléviz, Oláhfalú (Bielz); Stolzenburg, Kerzer Gebirge (Ormay); Hätzeg (Deubel).

a. **annulata** L. Kerzer Geb. (Ormay).

a. **pantherina** L. Kronstadt (Méhely).

a. **6-pustulata** L. Kronstadt, Hätzeg (Deubel).

a. **4-maculata** Scop. Oláhfalú, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

alpina Villa. Fogarascher Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge, Schulergebirge (Deubel).
Revelierci Muls. Siebenbürgen.

527. *Coccinella Linné.*

7-punctata L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **5-notata** Haw. Schulergebirge (Deubel).

5-punctata L. Schiellal, Gross-Scheuern, Talmesch, Marpod, Fogarasch, Nussbach, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Dees (Bielz); Schässburg, Tordaer Schlucht (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

distincta Fald.

a. **magnifica** Redtenb. Porcesst, Surul (Bielz); Kronstadt (c. a.).

a. **domiduca** Ws. Kronstadt (Méhely).

hieroglyphica L. Hermannstadt (Bielz).

a. **flexuosa** F. Schässburg (c. a.).

10-punctata L. Hätzeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Talmesch, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Oláhfalú (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

a. **pellucida** Ws. Karlsburg (c. a.).

a. **lutea** Rossi. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **subpunctata** Schrank. Kronstadt (Deubel).

a. **lateralis** Ws. Alsó-Rákos (c. a.).

a. **6-punctata** L. Hermannstadt (Ormay); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

a. **8-punctata** Müll. Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

a. **centromaculata** Ws. Kronstadt (Deubel).

a. **humeralis** Schall. Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässburg (Mai, auf Himbeeren, c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **bella** Ws. Kronstadt (Deubel).

a. **bimaculata** Pont. (bipustulata Hbst.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **lateripunctata** Gradl. Kronstadt (Deubel).

- a 10 - *pustulata* L. (guttatopunctata L. Kronstadt (Tömös, Bielz, Mchely), Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay), Schässburg (c. a.); Hätzeg (Deubel).
- 11 - *pustulata* L. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gycke, Záh (Bielz), Parangul, Balanbanva (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- Synharmonia.)
- conglobata* L. 18 - *punctata* Scop. Schässburg, Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- a. *gemella* Hbst. Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. *impustulata* L. Gross-Scheuern, Kronstadt, Tartlau, Medhasch, Schässburg, Birthálm, Dees (Bielz).
- var. *caucasica* Motsch. (vinidula Hanpet, Siebenbürgen).
- (Harmonia.)
- 4 - *punctata* Pont. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt auf Kiefern häufig, (Deubel).
- a 16 - *punctata* F. Kronstadt (Deubel).

528. *Micraspis Redtenbacher.*

- sedecimpunctata* L.
- a. 12 - *punctata* L. Hätzeg, Grossscheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt (?), Medhasch, S.-Regen, Dees, Gycke, Záh, Nagyenyed (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay), Reps, Schässburg (c. a.).

529. *Misia Mulsant.*

- oblongoguttata* L. Surian, Präshe, Talmesch, Fogarascher Gebirge (Bielz), Schanta (Ormay); Rodna-Gebirge auf Erlen, (c. a.); Schulergebirge, Borszék auf Fichte und Tanne, (Deubel); Marosgebirge (Muller).

530. *Anatis Mulsant.*

- ocellata* L. Surul, Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Schulergebirge, Rodnagebirge (Deubel); Marosgebirge (Muller); Borszék (c. a.).

531. *Halictia Mulsant.*

- sedecimguttata* L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Heltau (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Karlsburg, Szováta (c. a.).

532. *Vibidia Mulsant.*

- 12 - *guttata* Poda. Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Gyogy (Ormay); Petrozsény, Malomvíz (c. a.); Hätzeg (Deubel).

533. *Myrrha Mulsant.*

- 18 - *guttata* L. Kronstadt (Zinne, Deubel).

534. *Thea Mulsant.*

- 22 - *punctata* L. Durch das ganze Berg- und Hügel land verbreitet.
- a 20 - *punctata* F. Kronstadt (Bielz), Hätzeg, Vargyas (Deubel).
- a *signifera* Ws. Schässburg (c. a.).

535. *Calvia Mulsant.*

- 10 - *guttata* L. Kronstadt, Tartlau (Bielz), Hermannstadt, Retjezat, Schässburg (c. a.).
- 15 - *guttata* F. Fogarasch, Kronstadt (?), Medhasch, Schässburg, Sachs.-Regen, Bistritz (Bielz), Hermannstadt (Ormay), Hätzeg (Deubel).
- 11 - *guttata* L. Hätzeg, Hermannstadt, Präshe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Medhasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Gycke (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.).

536. *Sospita Mulsant.*

- 20 - *guttata* L. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- a *tigrina* L. Fogarasch, Kronstadt, Dees (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).
- a *Linnei* Ws. Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Alsó-Rákös (c. a.); Hätzeg (Deubel).

537. *Propylaea Mulsant.*

- 14 - *punctata* L. Hätzeg, Hermannstadt, Héviz, Nussbach, Kronstadt, Schässburg, Olahfalu, Bistritz, Gycke, Záh (Bielz); Stolzenburg, Baumgarten, Kerzer Gebirge (Ormay).
- a *tetragonata* Lach. Kronstadt (Deubel).
- a *parumpunctata* Sajo. Kronstadt (Deubel).
- a *suturalis* Ws. Kronstadt (Deubel).
- a *biflexuosa* Ws. Hermannstadt (Ormay).
- a 12 - *pustulata* Pont. Baroth, Kronstadt (Zinne), Mezőség (Gycke), Samsond, Mchely).
- a *perjata* Ws. Kronstadt, Alsó-Rákös, Nagybagmäs (Deubel).

Chilocorini.

538. *Chilocorus Leach.*

- renipustulatus* Scriba (nec similis Rossi). Hätzeg, Hermannstadt, Grossscheuern, S.-Regen (Bielz), Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).
- bipustulatus* L. Hätzeg, Gircsán, Fogarasch, Kronstadt, Medhasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

539. *Exochomus Redtenbacher.*

- 4-pustulatus** L. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Stolzenburg, Resinar, Kerzer Gebirge, Nagy-enyed (Ormay).
 var. **floralis** Motsch. Hermannstadt (j. W.), Karlsburg (c. a.).
flavipes Thunb. (nigromaculatus Ws., auritus Scriba). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Hätzeg (Bielz, c. a., Deubel).
 var. ♀ **collaris** Küst. Hätzeg (c. a.).

540. *Platynaspis Redtenbacher.*

- fulcorubra** Goeze. Salzburg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Baassen, Kronstadt, Rotenturm (c. a.); Szamosujvár (Ormay); Rodnagerbirge (Deubel).

Hyperaspini.541. *Hyperaspis Redtenbacher.*

- repensis** Herbst. Hätzeg, Dobra, Mühlbach (roter Berg), Gross-Scheuern, Schässburg (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **teinturieri** Muls. Alsó-Rákös (c. a.).
campestris Hbst. Hätzeg, Dobra, Hermannstadt, Záh (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Klausenburg (c. a.); Götzenberg (Ormay); Kronstadt (Deubel).
concolor Suffr. Hätzeg (Bielz).

Scymnini.542. *Pullus Mulsant.*

- ferrugatus** Moll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
haemorrhoidalis Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
auritus Thunb. (capitatus F., minutus Rossi). Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Nendorf b. H., Schässburg, Héviz (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
subvillosus Goeze. Hätzeg, Hammersdorf, Schässburg, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel).
 a. **pubescens** Panz. Kronstadt (Zinne, Mähely, Deubel).
testaceus Motsch.
 a. **scutellaris** Muls. Unter-Kerz. Schässburg (c. a.).
suturalis Thunb. Gross-Scheuern, Talmesch, Tartlau (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
pallidivestis Muls.
 var. **nanus** Muls. Zernest, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Deubel).
ater Kugel. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

543. *Scymnus Kugelann.*

- nigrinus** Kugel. Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen, Bielz); Kronstadt (Deubel).
abietis Payk. Kerzer Gebirge, Schuler-Gebirge (Bielz); Bucsecs (c. a.).
Schantia (Ormay); Rodnagerbirge, Kronstadt, Paringul (Deubel).
rufipes F. Schässburg (c. a.).
frontalis F. Hermannstadt, Grossscheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Hätzeg (c. a.); Hammersdorf (Ormay).
 a. **4-pustulatus** Hbst. Déva, Hätzeg, Schässburg, Kronstadt, Rotenturm (c. a.); Nagybagymás (Deubel).
 a. **immaculatus** Suffr. Schuler-Gebirge (Deubel).
Apelzi Muls. Mezőség (Gyeke, Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyastal, Rodnagerbirge (Deubel).
interruptus Goeze. Hätzeg, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Tartlau (Bielz).
rubromaculatus Goeze. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Girdsan, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

544. *Nephus Mulsant.*

- 4-maculatus** Hbst. (pulchellus Herbst.) Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Klem-Pold (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **obliguus** Ws. Kronstadt (Deubel).
bipunctatus Kugel. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel).
 var. **nigrinus** Ws. Schässburg (c. a.); Rodnagerbirge (Deubel).
Redtenbacheri Muls. Rodnagerbirge, Schässburg, Unter-Kerz (Alufer, c. a.), Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

545. *Stethorus Weise.*

- punctillum** Ws. Schässburg, Rotenturm, Malmviz (c. a.).

Rhizobini.546. *Rhizobius Stephens.*

- litura** F. Schässburg (c. a.).

547. *Coccidula Kugelann.*

- scutellata** Hbst. Klausenburg, Záh (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).
rufa Hbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Záh (Bielz); Schässburg, Kronstadt (c. a.).

XXXIX. Dascilloidea.

Helodiidae.

Cyphonini.

548. *Helodes Latreille*.

minuta L. Gross-Scheuern, Hahnbach (D. H. Kronstadt, Tartlau (Bielz); Karlsburg, Hammersdorf, Előpaták, Búcses (c. a.); Alsó-Bákos (Deubel); Marosgebirge (Müllert).

var. *laeta* Panz. Búcses (c. a.).

elongata Tourn. Szudupass, Hammersdorf, Szováta (c. a.).

flavicollis Kiesenw. Kronstadt (Zinne, Deubel).

marginata F. Bodnargebirge (Valea Vinului, Deubel).

549. *Microcara Thomson*.

testacea L. Götzenberg, S.-Regen (Bielz); Vargyasfal, Honigberg (Deubel); Szováta (Quelle auf Sumpfpflanzen, 5. Juni, c. a.).

550. *Cyphon Payk.*

variabilis Thunb. Hermannstadt, Fogaraseh, Tartlau, Oláhfal, Gyeké (Bielz); Marosujvár, Előpaták, Schässburg, Szováta, Kronstadt (c. a.); Michelsberg, Baumgarten (Ormay).

padi L. Kronstadt, Gyeké, Záh (Bielz); Schässburg, Oláhfal (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *discolor* Panz. Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

coarctatus Payk. Hermannstadt, Fogaraseh, Tartlau, Oláhfal, Záh (Bielz); Szováta, Alsó-Bákos (c. a.); Hätzeg, Törzburg (Deubel).

Paykulli Guer. Rotenturm, Borszék (c. a.); Schulergebirge, Noa (Deubel).

var. *macer* Kiesenw. Kronstadt (Zinne, Deubel).

551. *Prionocyphon Redtenbacher*.

serricornis Mull. Rotenturm unter der Rinde eines Haselnussknüppels, der tief in Laub eingebettet war, c. a.); Kronstadt (Zinne, geküschert, Deubel).

552. *Hydrocyphon Redtenbacher*.

deflexicollis Mull. Topánfalva, Balánbánya (c. a.), Nagyhagymás (Deubel).

553. *Scirtes Illiger*.

hemisphaericus L. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg am Ufer eines Quellabflusses auf Sumpfpflanzen in ausserordentlich grosser Menge), Kronstadt (c. a.); Hermannstadt (Lázaret, Ormay), Schulergebirge (Deubel).

Eubriini.

554. *Eubria Latreille*.

palustris Germ. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Paringul an einer Quelle im Moos, nahe der Schutzhütte), Előpaták (c. a.); Kronstadt, Törzburg, Zernest (Deubel).

Eucynetinae.

555. *Encyetus Germar*.

haemorrhous Duft. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg an feuchten Stellen, Atelschull, Gross-Altscher Kuppen, unter dem Wietelberg aus Moos und Laub gesiebt, c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

XL. Dryopidae.

Potamophilini.

556. *Potamophilus Germar*.

acuminatus F. Dobra, Mediasch (Bielz); Schässburg (Kokel, an Eichenbohlen, welche im fliessenden Wasser standen, Juli, c. a.); S.-Regen (Müller).

Dryopini.

557. *Dryops Olivier*. (Parnus F.)

Die Arten leben an Gesteinen unter Steinen und Gestein.

striatopunctatus Heer. Hätzeg, Dobra (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm (c. a.); Bistritz, Vargyas, Kerzer Gebirge (Deubel).

viennensis Heer. Schässburg (Bielz); Bistritz, Rotenturm, Kronstadt (c. a.); Boos (Deubel).

tutulentus Er. Hätzeg, Hermanns-Alt (Bielz); Vargyas (Deubel).

auriculatus Geoffr. (prolificicornis F.). Hermannstadt, Fogaraseh, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Halvclagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

luridus Er. Hätzeg, Reys (Bielz).

rufipes Kryn. pilosellus Er.). Schüttal, Dobra (Bielz).

Ernesti Gozis (auriculatus Panz.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

nitidulus Heer. Reys (Bielz); Schässburg, Naszód, Petrozsény (c. a.); Hätzeg, Törzburg (Deubel).

558. *Helichus Erichs.*

(*Dryops* Leach, *Potaminus* Strm.)

substriatus Müll. Talmesch (Altufer, Bielz); Kronstadt (Bagado, Deubel).

Helminthini.

559. *Esolus Mulsant.*

angustatus Müll. Balánbánya, Csukás, Előpatak (an klaren Quellrieseln unter Steinen, c. a.); Kronstadt (Ragadó, Deubel).

parallelepipedus Müll. Skore (Altufer), Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Ragadó, Deubel).

560. *Latelmis Reitter.*

Perrisi Dufour (Germari Er.). Balánbánya (Quelle unter Steinen, c. a.); Nagyhagymás (Ocsém), Zernest, Kronstadt (Ragadó, Deubel).

Volkmar Panz. Porcesest (Bielz); Alsó-Rákos (Tepe-Bach), Kronstadt (Ragadó, c. a., Deubel).

opaca Müll. Csukás (c. a.).

561. *Riolus Mulsant.*

cupreus Müll. Kronstadt (?) (Bielz); Salzburg (Ormay).

subviolaceus Müll. Kronstadt (Ragadó, Zernest (Deubel).

562. *Helmis Latreille.*

Latreillei Bedel (Mangeli Er.). Csukás (c. a.); Nagyhagymás, Bucsecs, Zernest (Deubel).

Maugei Bedel.

var. *Megerlei* Duft. Alsó-Rákos (Tepe-Bach, c. a.).

var. *aenea* Müll. Michelsberg, Ober-Sebes, Unter-Kerz, Hévíz, Kronstadt (Bielz); Bucsecs, Balánbánya, Csukás, Schässburg (c. a.); Heltau (Ormay).

XLI. Georyssidae.

563. *Georyssus Latreille.*

Die Arten leben an Gewässern im Uferschlamm, im Sonnenschein kriechen sie, mit einem Erdklumpchen bedeckt, auf den Letten umher.

crenulatus Rossi (pygmaeus F.). Schiefthal, Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg (Kokel, Schaaserbach, Bielz); Honigberg (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); S.-Regen (Müller).

substriatus Heer. Klausenburg (Bielz).

laesicollis Germ. Dobra (Mietesch), Rotenturm (Altufer, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.).

caelatus Er. Hátszeg (Bielz).

XLII. Heteroceridae.

564. *Heterocerus Fabr.*

Die Arten graben an Gewässern im Uferschlamm.

H. bicornis Curtis? Fuss ist nicht aufgeklärt; vielleicht bezieht sich diese Art auf *H. fossor* Kiesenw., dessen ♂ gehörte Mandibeln besitzt.

fossor Kiesenw. Déva, Gross-Schenk, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Rotenturm, Schässburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Dees, Krizba, Honigberg (Deubel).

flexuosus Steph. (femorialis Kryn). Torda, Déva, Marosujvár, Malomváz (Lunka negra, c. a.).

Das Vorkommen dieser auf Salzboden lebenden Art in Malomváz lässt sich nur so erklären, dass sich daselbst eine mir unbekannte Salzquelle befindet.

obsoletus Curtis. Salzburg, Záh (Bielz); Kronstadt, Schässburg (c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

marginatus F. Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Hátszeg, Rotenturm, Karlsburg, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Nagycsüd (Ormay); Baróth (Méhely); Honigberg (Deubel); Klausenburg (Müll.).

fenestratus Thunb. (laevigatus Panz.). Rotenturm, Fogarasch (Bielz); Déva, Unter-Kerz (c. a.); Hátszeg, Honigberg (Deubel).

(Littorinus.)

hispidulus Kiesenw. Dobra (Bielz); Hammersdorf, Remete (Nagycsüd, Ormay); Schässburg, Unter-Kerz, Karlsburg (c. a.).

pruinosis Kiesenw. Unter-Kerz (Altufer, c. a.); Dees, Kronstadt (Gespreng, Deubel).

crinitus Kiesenw. Schässburg (c. a.).

marmota Kiesenw. Schässburg, Karlsburg (c. a.); Várhegy (Deubel).

sericans Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Dees, Honigberg (Deubel).

565. *Micilus Mulsant.*

murinus Kiesenw. Hátszeg (Bielz).

XLIII. Dermestidae.

Dermestini.

566. *Dermestes Linné.*

Die Arten leben auf tierischen Stoffen, oft in Häusern, selten in Ameisennestern.

vulpinus F. Hermannstadt (Bielz).

Frischi Kugel. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

murinus L. Marpod, Szakadat, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schanta, Szamosujvár, Salzburg (Ormay).

lanarius Illig. Kronstadt (Umgebung, auf Feldwegen, Deubel); Klausenburg (Müller).

undulatus Brähm Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Gyeké (Bielz), Hammersdorf, Nagycsöl (Ormay).

atomarius Er. tessellatus Gyll. Schässburg (1. März, c. a.).

Erichsoni Ganglb. tessellatus Er. Schässburg, Marpet, Mediasch (Bielz).

hiem.or L. Hermannstadt, Schässburg (1. Mai, von einem blühenden Kirschenbaum geklopft, c. a.); Bistritz (Müller).

lardarius L. Durch das ganze Gebiet, namentlich in Häusern und Vorratskammern).

Montadon.

latissimus Bielz, Michelsberg, Götzenberg, Zood, Prasche, Porsest, Surul, Fogarasch, Kronstadt (Bielz), Szurdokpass (c. a.), Schanda (Ormay); Rotenturm, Schulergehänge (Famiaschlucht, Deubel).

Attagenini.

567. *Attagenus Latreille*.

Die Arten leben ähnlich wie die vorigen, häufig finden sie sich auf Blüten.

Schäfferi Herbst. Hätzeg, Borszék, Schässburg (Bielz).

piceus Ohw. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H. Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oßthalu (S.-Regen (Bielz)); Hammersdorf, Nagycsöl, Gyögy, Szamosújvár (Ormay); Puj (b. Hätzeg, c. a.).

var. dalmatinus Kust. marginatus Kust. Köniestem (Méhely); Hermannstadt (c. a.).

pellio L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, oft in Häusern, oft auf Blüten. (Lanorn.).

punctatus Scop. (vignitigittatus F.). Hermannstadt (Bielz).

pantherinus Abt. Hammersdorf, Girelsau, Unter-Kerz, Schässburg (Bielz, soll in den Nestern von Erdbeien vorkommen, ich sammelte eines meiner Exemplare an einer Hausmauer).

Megatomini.

568. *Megatoma Samouelle*.

undala L. Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Schenuern, Girelsau, Holzmeugen, Gross-Schenk, Marienburg b. Kr., Gyeké (Bielz), Schässburg (kokeliten, unter der Rinde eines abgestorbenen Weidenbaumes, c. a.), Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

569. *Globicornis Latreille*.

(Hadnotoma.)

marginata Payk. Hermannstadt (Ormay, Erdövidék (Méhely), Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Globicornis - s. str.)

nigripes F. Hermannstadt (Bielz), Schässburg (Eichenschwamm oder aus Blättern gesiebt, 20. April, c. a.).

570. *Trogoderma Latreille*.

versicolor Creutz. Dolra (Bielz); Karlsburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

nigrum Herbst. glabrum Herbst, elongatum F. Hermannstadt, Holzmeugen, S.-Regen (Bielz), Schässburg an einer Hausmauer, 1. Juli, c. a.); Kronstadt (in der Schmetterlingssammlung, Deubel).

571. *Ctesias Stephens* Tiresias Er.

serra F. Hermannstadt, Gyeké (Bielz); Schässburg, Breib, aus dem Holze einer alten Eiche, c. a.).

Anthrenini.

572. *Anthrenus F.*

Die Arten leben auf Blüten, in Häusern, die Larven einiger Arten in Tiersammlungen als Zerstörer.

pimpinellae F. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Sächls.-Regen (Bielz), Schanda-Kerzer-Geb. (Ormay).

scrophulariae L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Nathrenus.)

verbasci L. Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.).

Deubel bezeichnet, dass A. verbasci in Buzenlode (Kronstadt, Tartlau) und in Fogarasch vorkomme.

(Floridanus.)

muscorum L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Balichánya, Puj (bei Hätzeg, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

(Helocerus.)

fuscus Ohw. Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg auf Blüten und in Sammlungen als Zerstörer derselben, Bielz; Rotenturm, Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Trinodini.

573. *Trinodes Latreille*.

hirtus L. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz), Homberg (Altfuer, Deubel).

Orphlini.

574. *Orphilus Erichs*

niger Rossi. glabratus F. Hermannstadt (Bielz), Zood (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XLIV. Nosodendridae.

575. *Nosodendron Latreille.*

fasciculare Oliv. Präsbe, Holzungen, Marosgebirge (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (am ausfliessenden Saft der Eichen, Mai, c. a.); Várhegy (Deubel); Hermannstadt (Albrecht); S.-Regen (Müller).

XLV. Byrrhidae.

Limnichini.

576. *Pelochares Mulsant.*

versicolor Walzl. Hätzeg, Dobra, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm (Altuf, c. a.); S.-Regen (Müller).

577. *Limnichus Latreille.*

Die Arten leben wie die vorigen am Ufer der Gewässer.

pygmaeus Sturm. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

sericeus Duft. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Tartlau, Schässburg (Bielz); Nagyenyed, Bistritz (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Byrrhini.

578. *Simplocaria Marsham.*

Bielz führt *S. maculosa* Er. für Siebenbürgen an; es ist aber wahrscheinlich, dass diese Art bei uns nicht vorkommt, indem sie bei uns vertreten wird durch *S. Deubeli*, welche Bielz nicht kannte.

metallica Strm. Hätzeg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Deubeli Ganglb. Bucsecs, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Buleatal), Schässburg (Citendell), Retjezat (unter Moos, besonders Baummoos, c. a.).

semistriata F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Alsó-Bákos, Balánbánya, Rodnagelbirge, Előpaták, Schässburg, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rotenturm (Ormay); Bodzner Gebirge (Deubel).

acuminata Er. Rodnagelbirge (oberhalb der Baumregion aus Grashüscheln gesiebt, c. a.); Rotenturm (Ormay); Hätzeg (Deubel).

(Trinaria.)

carpathica Hampf. Präsbe (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea), Paringul, Malomviz, Bistra (c. a.).

579. *Morychus Erichs.*

aeneus F. Schiellhal, Zibinsgebirge, Rotenturm, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Zernest, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

580. *Pedilophorus Steffalmi.*

(Lamprobyrrhulus.)

nitidus Schall. (nilens Panz.). Hätzeg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg (Kokelfuher unter Blättern), Baassen (c. a.).

(Pedilophorus s. str.)

auratus Duft. Retjezat, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bucsecs (Bielz); Alsó-Bákos, Búdös, Frecker Gebirge (Serbota), Malomviz, Topánfalva, Schässburg, Előpaták, Paringul (c. a.); Schanta (Ormay); Schulergebirge (Deubel); Bistritz (Müller).

581. *Carpathobyrrhulus Ganglbauer.*

transylvanicus Sutfr. Rodnagelbirge, Fogarascher Gebirge (Bielz, c. a., Deubel); Klausenburg (Müller).

582. *Cytilus Erichs.*

(Cistela Geoffr. Seidl.)

sericeus Forster (varius F.). Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Königstein, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Schanta, Porumbacher Geb., Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Balánbánya (c. a.).

583. *Byrrhus Linné.*

fasciatus Forst. Zibins-Gebirge, Ober-Sebes, Surul, Bucsecs, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Porumbacher Gebirge (Ormay), Retjezat, Paringul, Rodnagelbirge (c. a.).

arietinus Steff. Hätzeg, Broos (Bielz); Bucsecs, Paringul, Retjezat (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

pustulatus Forst. Busch, Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, Bozauer Pass (Krasna, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Tordaer Schlucht, Bükszád, Rodnagelbirge, Szurdokpass (c. a.); Paringul (Deubel).

pilula L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **aurato-punctatus** Reitt. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

a. **auruliscus** Reitt. Hermannstadt (Ormay).

Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa. IV. 71) zieht diese beiden Aberrationen als Synonyme ein.

var. **regalis** Steff. In allen höheren Gebirgen unseres Gebietes.

var. **laevigatus** Ganglb. Rodna-Gebirge (hochalpin, c. a., Deubel); Pietrosul (Deubel).

var. *herculeanus* Ganglb. Szurduk-Pass (c. a.).

luniger Germ. Zibinsgebirge, Hosszufalu (Bielz); Kronstadt (Deubel, c. a.); Schulergebirge, Hätzeg (Deubel); Szurduk-Pass, Rotenturm, Borszék (c. a.).

glabratus Heer. ornatus Panz. Zibinsgebirge, Fogarasz, Kronstadt, Königstein, Maros-Gebirge (Bielz); Rodnagelberge (Deubel).

584. *Porcinolus Mulsant*.

murinus F. Freck (Bielz); Schässburg (bei einer Ueberschwemmung der Koken in Anzahl gesammelt, c. a.); Hätzeg (Deubel).

585. *Urimus Erichs.*

decorus Steph. Schielthal, Dobra (Bielz); Schanta (Ormay); Retjezat, Rodnagelberge (c. a.); Schulergebirge, Rosenau, Kerzer Gebirge (Deubel).

Erichsoni Reitter. Kronstadt, Zalutna, Torockó, Rodnagelberge (c. a.); Nagybagymás, Hätzeg (Deubel).

erinnaceus Duft. Erzgebirge (Boicza, Bielz).

586. *Syncalypta Stephens.*

Die Arten leben unter Moos und Blättern. (Crimopsis.)

paleata Er. Hätzeg, Rotenturm (Altufcr), Schässburg, Kokenur, Bielz; Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

setosa Waldl. Kerzer Gebirge (Bielz); Unter-Kerz (Altufcr, c. a.).

setigera Htg. Gross-Scheuern, Fogarasz (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg, Karlsburg, Fogarasz, Hoppack, Schässburg, Borszék (c. a.); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).

Syncalypta i. sp.

spinosa Rossi. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasz, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Rodnagelberge, Kronstadt (Deubel).

XLVI. Dasciliidae.

Dascillini.

587. *Dascillus Latreille.*

cervinus L. Zibinsgebirge, Götzenberg, Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Csukás, Bozauer Pass, Marosgebirge (Bielz); Retjezat, Paringul, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

XLVII. Eiateridae.

Agrypnini.

588. *Adelocera Latreille.*

punctata Hbst. atomaria F.) Klausenburg, S.-Regen (Bielz).

lepidoptera Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Bistra unter Fichtenrinde, c. a.; Kelenengebirge, Kovászna (Deubel).

fasciata L. Zibinsgebirge, Negovan, Sierpu, Fogarasz, Tuschád, Gyergyó, Borszék, Marosgebirge, Borgoer Pass (Bielz); Rodnagelberge, Bistra, Balanbanya unter Fichtenrinde, c. a.; Kelenengebirge (Deubel).

quercea Hbst. Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Schässburg Fuchslotz, März, unter Eichenrinde, c. a.; Nussbach (Deubel).

589. *Brachylacon Molschulsky*

murinus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Ludiini.

590. *Dima Eschscholtz.*

elateroides Charp. Retjezat, Heltan, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Bielz, c. a.); von Erlengebusch geklopft, Mai; Rotenturm (Ormay); Zernest (Deubel).

591. *Corymbites Latreille.*

virens Schrank. signatus Schrank) Präshe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schulergebirge, Balanbanya (Ösém, Bielz); Szurduk-Pass, Schässburg, Bente, Bollenche, wenn sich ihr Laub eben entwickelt hat, c. a.); Zibinsgebirge (Ormay).

pectinicornis L. Götzenberg, Präshe, Kerzer Gebirge, Fogarasz, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Marosgebirge (Bielz); Zibinsklausen, Paringul, Rosenauer Gebirge, Szurduk-Pass, Schässburg (c. a.); Resmar, Gyergyó-Fölgyes (Ormay).

Heyeri Saxon. Retjezat (Bielz); Rodnagelberge (c. a.); Zernest (Crepatura, Deubel).

capreus F. Michelsberg, Götzenberg, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Buesers, Rodnagelberge (Deubel).

var. *aeruginosus* F. Retjezat, Schielthal, Präshe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Meditsch, Bistritz, Boes (Bielz); Götzenberg, Schanta, Gyergyó-Fölgyes (Ormay); Rodnagelberge, Borszék, Balanbanya, Paringul, Frecker Gebirge, Serbota, c. a.); Pietrosul (Deubel).

var. **transsylvanicus** Szombathy. Vulkan-Pass, Fogarascher Gebirge, Bihar'er Gebirge (Szombathy).

(Anostirus.)

purpureus Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **atropilosus** Buyss. Schullergebirge (c. a.).

haemapterus Illig. Rotenturm, Rodnagel. (Bielz); Schanta, Remete, Nagyenyel, Ormay; Bucsecs (subalpin). Zernest (Deubel); Szurdokpass (Deubel, c. a.); Vulkánpass (Csiki).

castaneus L. Hermannstadt, Holzungen, Zood, Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf blühendem Alorn, c. a.); Rodnagelgebirge (subalpin, Deubel).

testaceipennis Duf. (sulphuripennis Germ.). Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Vargyastal (auf Blumen in der Nähe der Almascher Höhle, Deubel).

(Actenicerus.)

sjaelandicus Müll. (tessalatus F. nec L.). Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, S. Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Stolzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdokpass, Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

var. **assimilis** Gyll. Heltau, Nendorf bei H., Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Klausenburg, Paringul (c. a.); Kronstadt (Deubel).

592. *Selatosomus Stephens.*

(Metanomus.)

montivagus Rosenh. Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge (Bielz); Nagybagymás, Bucsecsgebiet, Schullergebirge (Deubel).

(Selatosomus s. str.)

impressus F. Klausenburg (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

nigricornis Panz. Dolra (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Fj-zékely b. Sch. (c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

melancholicus F. Hermannstadt (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Schässburg (c. a.).

ampliocollis Germ. var. Buyssoni Szombathy. Kronstadt (Bielz); Schullergeb. (Deubel); Rotenturm, Pilis (bei Nagyenyel, c. a.).

aeneus L. Hátszeg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Marosgebirge, Borszék (Bielz); Rotenturm, Schanta, Bistra (Ormay); Pilis (Nagyenyel, Szurdok-Pass, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kelemengeb., Nagybagymás (Deubel).

a. **germanus** L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Csiker Gebirge, Balánbánya (Bielz); Pilis (Nagyenyel), Rodnagelgebirge, Tordauer Schlucht (c. a.).

a. **coeruleus** Schilsky. Pilis (Nagyenyel), Rotenturm (c. a.).

latus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

cruciatus L. Gyeke, Záh (Bielz).

globoicornis Germ. Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Calanibus.)

bipustulatus L. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Reps, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rodnagelgebirge, Alsó-Rákös (Deubel).

(Haplotarsus.)

affinis Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Kronstadt, Bucsecs (c. a.); Nagybagymás, Schullergebirge (Deubel).

Ganglbaueri Rybinski. Frecker Geb. (Serbota, c. a.).

(Neopristilophus.)

depressus Germ. (insitivus Germ.). Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, S. Regen (c. a.).

(Paranomus.)

guttatus Germ. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Arpascher Gebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Paringul, Rodnagelgebirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Csukás), Schullergebirge, Königstein (Deubel).

593. *Prosternon Latreille.*

tessellatus L. (holosericeus Oliv.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **bifasciatus** Küst. Kerzer Geb. (Bielz).

594. *Orithales Kiesenwetter.*

serraticornis Payk. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Papóci hegység (Méhely).

595. *Hypogannus Kiesenwetter.*

cinctus Payk. Dees (Bielz); Alsó-Rákös (in einer alten Eiche), Schässburg (aus einem Eichenpfahl, c. a.); Kronstadt (Deubel).

596. *Sericus Eschscholtz.*

S. subaeneus Rehl. ist aus dem Verzeichnis gestrichen, da er irrtümlich in dasselbe aufgenommen worden ist.

brunneus L. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Szunyokszék (Burzenland, c. a.); Nagybagymás, Schullergebirge, Bodzaer Gebirge (Deubel).

597. *Dolopius Eschscholtz.*

marginatus L. Durch das ganze Gebiet auf Gesträuch.

598. *Agriotes Eschscholtz.*

(Ettius.)

aterrimus L. Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge, Serbota, (c. a.); Rodnagelbige, Buceses (Deubel).

Agriotes s. str.

gallicus Lac. Döllény-Fal, Ober-Lömösch (Möhely).

Schässburg (s. Fundort dieser Art ist zu streichen; vielleicht gehört auch Möhely? Angabe auf einer Fälschung. Ich habe den ersten *A. pallens* erst später in natura vor mich gehabt).

ustulatus Schall. Blandus Germ. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf Schirmlbäumen gemein.

var. **flavicornis** Panz. Rothberg, Mediasch, Schässburg, Borgoer Pass, Klausenburg, wohl überall mit der Stammform zusammen.

var. **sputator** Redt. Mit der Stammform.

pilosus Panz. pilosellus Schönh.). Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Präße, Schässburg, S-Begen, Buces, Kronstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schant, Stolzenburg (in Holzschlägen auf Gestrüch, auch auf Schirmlbäumen).

acuminatus Steph. sobrinus Kiesenw.). Kerzer Gebirge (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg von blühendem Moorn geklopft. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pallidulus Illig. Zibinsgebirge (Bielz).

sputator L. Durch das ganze Berg- und Hügel land verbreitet.

sordidus Illig. Kerzer Gebirge (Bielz).

Das Vorkommen dieser dem Südwesten Europa angehörigen Art bei uns ist kaum anzunehmen; vielleicht wurde der Käfer mit *A. obscurus* verwechselt, dem er ähnlich ist.

lineatus L. Durch das ganze Berg- und Hügel land verbreitet.

obscurus L. Kerzer Gebirge (Leita-Fal, Fogarasch, Kronstädter Gebirge, S-Begen (Bielz), Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay), Szanyokszék, Schässburg (c. a.), Rodnagelbige (Deubel).

599. *Indius Latreille.*

Stenoderus Eschscholtz.

ferrugineus L. Hermannstadt, Neppendorf (Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz), Hätzeg (Hasschagen, c. a.); Schulergebirge (Deubel), Lotru-Fal (Csiki).

600. *Synaptus Eschscholtz.*

Auf Gestrüch und Struchwerk.

filiformis F. Durch das Berg- und Hügel land verbreitet.

601. *Adrastus Eschscholtz.*

limbatus F. nitidulus Marsh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S-Begen

(Bielz); Hammersdorf, Nagycsevel (Ormay); Előpatak (c. a.)

var. **axillaris** Er. Reps, Schässburg (Bielz); Borsók, Balándánya, Kronstadt (c. a.); Nagyhagyás (Deubel), Szováta (Csiki).

lacertosus Er. Kukulcszeg, Dicsoszentmarton (Csiki).

nitidulus Marsh.

Die Nomenclatur des *Adrastus nitidulus* Melsin, der als *Synaptus*, zu *A. limbatus* gestellt wird, ist von Szombathy folgendermassen geändert worden:

pallens F. opsius Herbst, Zibinsgebirge, Fogarasch, Reps, Schässburg (Bielz); Hätzeg, Kronstadt, Vargyasal (Szombathy).

var. **lateralis** Herbst, Sándorpass (Csiki).

var. **Paykullii** n. sp. (limbatus Payk.: nec F.). Dicsoszentmarton (Csiki).

var. **pallens** Er. Zibinsgebirge, Fogarasch, Reps, Schässburg (Bielz); Hätzeg, Kronstadt, Vargyasal (Deubel).

rachifer Geoffr. nanus Herbst, minutus Oliv. Fug. b. Hätzeg, Karlsburg, Kronstadt (Zinner), Reps, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay), Dicső-Szent-Marton (Csiki).

montanus Scop. humilis Er.). Grossscheuern (Bielz); Schässburg, Reps (c. a.), Hammersdorf, Gyógy (Ormay).

Cardiophorini.

602. *Cryptohypnus Eschscholtz.*

riparius F. Kerzer Gebirge (Bielz).

frigidus Kiesenw. Surul (Bielz), Rodnagelbige (oberhalb der Baumregion auf kieseligen Grasboden, c. a., Deubel), Buceses, Schulergebirge (Deubel).

603. *Hypnoidus Stephens.*

Hypnoidus s. str.

tenuicollis Germ. Schässburg (Kokelfuher, gekotschert, 29. Mai, c. a.).

4-pustulatus F. Hätzeg, Gross-Schenk, Törzburg, S-Begen (Bielz).

(Negritius.)

pulchellus L. Hätzeg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz).

var. **exiguus** L. Szabudeli, Boh. Rejs (Altufuher, Bielz), Schässburg (Kokelfuher im Gemste, c. a.); Honigberg (Deubel).

(Zorocheus).

dermestoides Hbst. Hätzeg, Kerzer Geb. (Leita-Fal), Kronstadt, Tartlau, S-Begen (Bielz), Rotenturm (Ormay); Buceses, Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); Rodnagelbige (Deubel).

var. **tetrgraphus** Germ. (5-guttatus Lap.) Dobra (Bielz), Hermannstadt, Csukás, Balándánya (auf feuchten, sandigem Boden, c. a.), Baumgarten, Kakova (Ormay); Rodnagelbige, Zernest (Deubel).

meridionalis Lap. Hätzeg, Rotenturm, Porumbach, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Flussufer im Sande, c. a.).

(*Quasimus*.)

minutissimus Germ. Gross-Scheuern, Rotberg b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, S.-Regen, Schässburg auf Gesträuch; Michelsberg, Rotenturm, Präshe, Gyógy (Ormay); Kronstadt (Deubel).

604. *Cardiophorus* **Eschscholtz.**

gramineus Scop. Hätzeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Dees, Maros-Gebirge, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Rakovicza, Nagy-enyed, Szamosujvár (Ormay).

ruficollis L. Déva, Gross-Pold (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Nagyagymás (Deubel, von Fichte geklopft).

rufipes Geoffr. (*vestigialis* Er.). Déva, Hätzeg, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf blühender Ulme und Eiche, c. a.).

nigerrimus Er. Rotenturm (Ormay); Hermannstadt (a. Berg, c. a.).

atramentarius Er. Mediasch (Bielz).

(*Platynchus*.)

cinereus Illst. Neudorf, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Alsó-Rákös, Kronstadt (c. a.).

var. **testaceus** F. Hätzeg (Bielz).

equiseti Herbst. Hermannstadt, Rothberg b. H., Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

rubripes Germ. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Wietenberg, von Eichen geklopft, April, c. a.).

Elaterini.

Elaterina.

605. *Melanotus* **Eschscholtz.**

rufipes Herbst (*castanipes* Payk, *longipennis* Küst.). Hätzeg, Hermannstadt, Kronstadt, Hosszufalu, Előpatak, Bükszál, Schässburg, Záh (Bielz); Salzburg (Ormay); Csukás, Karlsburg, Rotenturm, Schanta, Bistra, Borszék (c. a.); Tudnád (Deubel).

a. **subrufus** Schwz. Ober-Kerz (Glashütte, c. a.).

crassicollis Er. S.-Regen, Dees (Bielz); Klausenburg, Karlsburg, Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

punctolineatus Pelerin (*niger* F.). Müllbach, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen, Dees, Gyeke, Záh (Bielz); Klausenburg, Karlsburg, Hammersdorf, Szováta (c. a.); Stolzenburg, Schanta, Rotenturm (Ormay).

brunnipes Germ. Kerzer Gebirge, Előpatak, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Klausen-

burg, Schässburg, Tordae Schlucht, Hermannstadt, Kronstadt (c. a.); Stolzenburg (Ormay).

tenebrosus Er. Hätzeg (Deubel, c. a.).

monticola Mén. Rosenau (Burgherg, Juli, Mchely).

606. *Idolus* **Desbrochers.**

picipennis Bach. Schielthal, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Schässburg, Balánlány, Alsó-Rákös, Frecker Gebirge (Serbota), Nagyenyed (c. a.); Rosenau (Burgherg, Mchely); Rothagebirge (Deubel).

Mchely muss übersehen haben, dass Bielz und Ormay den *Betharmon* *picipennis* Bach unter dem Subgenus-Namen *Idolus* *picipennis* Bach in der Gattung *Aglyptus* auführen, da er behauptet, dass Seidlitz (Fauna transs.) zwar den Käfer aus Siebenbürgen anführte, aber Fundorte desselben nicht bekannt seien (Endely uj eszirla bogatjai 1895. II.).

607. *Betarmon* **Kiesenwetter.**

ferrugineus Scop. (*bisbimaculatus* Schönh.). Zibins-Gebirge, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Rotenturm, Nieder-Eidisch (c. a.); Hermannstadt (Ormay). Ich sammelte die Art auf Gebüsch an Flussufern.

608. *Drasterius* **Eschscholtz.**

Auf trockenen, sandigen Grasplätzen und an sandigen Flussufern.

bimaculatus Rossi. Hätzeg, Hermannstadt, Neppendorf, Porumbach, Gross-Schenk, Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz).

609. *Portmidius* **Germar.**

austriacus Schrank. Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.).

610. *Anchastus* **Leconte.**

acuticornis Germ. Hermannstadt, Mediasch (Bielz).

611. *Megapenthes* **Kiesenwetter.**

lugens W. Redtenb. Hermannstadt (Bielz).

612. *Procræus* **Reitter.**

tibialis Lac. Hätzeg, Dees (Bielz); Schässburg, Fuchslöchl, Gross-Michaeler Kuppen, im Holz alter Eichen, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

613. *Isehnodes* **Germar.**

sanguinicollis Panzer. Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz).

614. *Elater* Linné.

cinnabarinus Esch. Hätzeg, Götzenberg, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Klausenburg (Bielz); Borszék, Szováta, Schässburg (im Holze eines alten Apfelbaumes, c. a.)

sanguineus L. Hätzeg, Hermannstadt, Götzenberg, Talmesch, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schulergebirge, Hosszufalu, Bozauer Pass, Mediasch, Marosgebirge, Schässburg, Rodnagelb. (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

var. **rubidus** Cand. Schässburg (in morschem Eichenholz).

praeustus F. Tartlau, Kerzer Gebirge, Piatra mare, Mediasch, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); in morschem Eichenholz).

pomoniae Steph. Schässburg (in morschem Eichenholz), Előpatak (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

sanguinolentus Schrank ephippium Oliv.). Hätzeg, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Marosujvár, Schässburg (morsches Eichenholz (c. a.); S. Regen, Marosgebirge (Müller).

ferrugatus Lac. (pomorum auct.). Unterkerz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rodnagelb. (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

elongatus F. Hätzeg, Talmatschel, Rotenturm, Schässburg, Záh (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Szunnyokszék, Kronstadt (Zinne, c. a.).

balteatus L. Präsche (Bielz); Borszék (in Fichtenstümpfen); Gyergyó-Szt-Miklós (c. a.); Rodnagelb. (subalpin, Deubel); Bistritz (Müller).

nigroflavus Goeze (erocatus Lac.). Präsche, Kronstadt, S. Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Schässburg (31. Januar, in einem Erlenstumpf am Mühlenkanal, c. a.).

quadrisignatus Gyll. Schässburg (auf der Burg einmal im Fluge gefangen, c. a.); S.-Regen (Müller).

satrapa Kiesenw.

var. **dibaphus** Schioedte. Schässburg (zwei Exemplare, Fuchsloch, 14. Mai im Holze eines Apfelbaumes, c. a.)

Sombathy (Annal. mus. hung. VIII. 1910) bezeichnet *Elater forticornis* Schwarz als Synonym des *Elater satrapa* var. *dibaphus* Schioedte. Die Varietät unterscheidet sich von der Stammform durch die schwarze Behaarung der Ober- und Unterseite. Ich betone hier ausdrücklich, dass meine Exemplare nicht etwa Umformungen des *Elater pomoniae* sind, die ich auch besitze, denn das dritte Fühlerglied ist ebenso gross und fast so breit wie das vierte.

elegantulus Schönh. Hätzeg, Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (Ormay).

sinuatus Germ. Déva, Gross-Pold (Bielz); Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

iristis. Borszék (im modernden Holze alter Fichtenstümpfe, ? und $\frac{1}{2}$, c. a.)

? $\frac{1}{2}$ var. **basalis** Mannh. Borszék (mit dem vorigen, c. a.).

erythrogonus Müll. Zibins-Gebirge, Talmatschel, Girelsau, Gross-Schenk, Hosszufalu, Bozauer Pass (Bielz); Königstein (Crepatura, 21. Juni, von Gestränch geklopft, Deubel).

ruficeps Muls. Hermannstadt (Bielz).

nigrinus Payk. Götzenberg (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay); Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Malomviz, Buceses, Balánbánya (c. a.); Papole (Méhely); Paringul (Deubel).

nigerrimus Lac. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Präsche, Bistra (Ormay); Schässburg (in morschem Eichenholz, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel) (Ectamenogonus).

Megerlei Lac. Hermannstadt (Bielz); Resinar (Ormay); Schässburg (c. a.); Keresztényhavas (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Athetaina.

615. *Limonius* Eschscholtz.

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen.

pilosus Leske. Hätzeg, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Bistritz, Dees, Záh (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg, Szurduk-Pass, Szunnyokszék (c. a.).

aeruginosus Oliv. Gross-Scheuern, Holzungen, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel); Szurduk-Pass (c. a.).

minutus L. Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

purvulus Panz. Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Bistritz (Bielz); Hermannst. (Ormay); Szunnyokszék, Gross-Alisch bei Sch., Alsó-Rákös (c. a.); Hätzeg (Deubel).

616. *Phleletes* Kiesenwetter.

aeneoniger Degeer. Bruckter (Panz.) Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat (c. a.); Nagyhagymás, Negon, Paringul, Hätzeg, Kronstadt, Vargastal (Deubel).

quercus Oliv. (lythroides Germ.). Porcesest (Bielz); Retjezat, Malomviz (c. a.); Rotenturm (Ormay); Hätzeg (Deubel).

617. *Harminius Fairmaire.*

(Diacanthus Reitter.)

undulatus Degeer. Kerzer Gebirge, Maros-Gebirge (Bielz); Retjezat, Bistra, Kronstadt, Rodnagelbirge (c. a.); Zernest Bodzaer Gebirge, Schulergeb. (Deubel).a. **bifasciatus** Gyll. Zoodgebirge, Präsbe, (Bielz).a. **limbaticollis** Motsch. Siebenbürgen.618. *Athous Eschscholtz.*

(Stenagostus.)

villosus Geoffr. (rhombus Oliv.). Oláh-falu, Oláhlaposhánya Strimbul, Bielz); Schässburg Breite, 29. Juni, unter der Rinde einer gestürzten Eiche, c. a.); S.-Regen (Müller).

(Athous s. str.)

hirtus Hbst. (porrectus Thoms.). Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Előpatak, Mediasch, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay), Karlsburg, Schässburg (auf wildem Wein, c. a.); Nagybagymás, Rodnagelbirge (Deubel).**niger** L. (alpinus Reitt.) Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Bistra, Kerzer Gebirge (Ormay); Balánbánya, Retjezat, Bucsecs, Rodnagelbirge, Előpatak, Rosenau, Schässburg (auf Gebüsch, besonders auf Himbeergesträuch, c. a.).var. **scrutator** Hbst. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg (Bielz); Zernest (Deubel).

(Grypocarus.)

vittatus F. Hätzeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Hermannstadt, Magyar-Bükkös (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Klausenburg (c. a., auf Gebüsch, namentlich in Holzschlägen); Vargyastal (Deubel).var. **Ocskayi** Kiesenw. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (c. a.).**haemorrhoidalis** F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Szunyokszék, Klausenburg (c. a.); auf Gebüsch wie der vorige.

(Anathrotus.)

subfuscus Müll. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Szurdok-Pass, Retjezat, Balánbánya, Szunyokszék, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).**Zebel** Bach. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

A. Zebei Bach findet sich in meinem gesammelten, ziemlich reichen, von Reitter revidierten Materiale nicht. Er gehört den mitteleuropäischen Gebirgen an, und ich besitze ihn z. B. aus dem böhmisch-sächsischen Erzgebirge. Da von Reitter viele neue Arten beschrieben worden sind, dürfte das Vorkommen des A. Zebei bei uns sehr fraglich sein, jedenfalls empfiehlt sich eine diesbezügliche Revision der Fundorte.

mollis Reitter. Tesla (Bodzaer Gebirge, Mähely); Rodnagelbirge, Schässburg, Kronstadt (Zinne), Retjezat, Balánbánya, Borszék (c. a., ♂ ♀); Hätzeg, Nagybagymás (Deubel).**carpathicus** Reitter. Klausenburg, Rotenturm (c. a.).**austriacus** Desbr. (circumscribitus Reitter). Puj (b. Hätzeg), Rotenturm, Borszék, ♀ Előpatak (c. a.).**circumductus** Men. Schiefthal (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Bodzaer Gebirge (Deubel).

(Enplathous.)

difformis Lac. Zibins-Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay).

A. Dejeani Lap. dürfte bei uns nicht vorkommen und verwechselt worden sein mit A. carpathophilus Reitter, den ich aus Klausenburg besitze, woher Bielz seinen A. Dejeani anführt. Zweifelhafte ist auch das Vorkommen des A. difformis bei uns, wenigstens bedarf dasselbe weiterer Nachweise.

(Grypocarus.)

longicollis Oliv. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (?), Tartlau (?), S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Stolzberg (Ormay); Karlsburg (c. a.); Vargyastal (Deubel).**picipennis** Reitter. Schässburg, Ratosnya (c. a.).**carpathophilus** Reitter. Klausenburg, Rotenturm (c. a.).**plagipennis** Reitter. Schässburg (Fuchsloch, 18. Juni, c. a.).**circumscribitus** Cand. Kerzer Geb. (Bielz), Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).**Denticollini.**619. *Denticollis Piller.***rubens** Piller. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Fogarasch Gebirge, Kronstadt, Maros-Gebirge (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hermannstadt, Retjezat, Balánbánya (c. a.); Rodnagelbirge, Zernest, Bodzaer Gebirge, Schulergebirge (Deubel).**linearis** L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

XLVIII. Cerophytidae.

620. *Cerophytum Latreille*.

elateroides Latr. Schässburg (Witenberg, 3. April, an einem Ahornstamm unter Rinde, c. a.).

XLIX. Eucnemidae.

Melasini.

621. *Melasis Olivier*.

buprestoides Lap. Zood, Rotenturm, Kerzer-Gebirge, Kronstadt (Zinne), Mediasch (Bielz); Besmar Ormay; Előpatak, Schässburg (Seehofberg, 1. Mai, aus dem morschen Holz einer Weissbuche, c. a.); Alsó-Bákos (Magy. Tepe, Deubel).

622. *Isorhipis Lacordaire*.

(*Tharops* Laporte.)

melasoides Lap. Hätzsieg (Páros, Bielz), Kronstadt (Zinne, Deubel).

Eucnemini.

623. *Eucnemis Ahrens*.

capucina Ahn. Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

624. *Dirrhagus Latreille*.

(*Microdirrhagus*.)

lepidus Rosenh. Rotenturm (Bielz), Hongberg (Deubel).

pygmaeus F. Héviz, Rotenturm (Bielz); Kronstadt, Balánlány, Rátosnya (unter Blättern des in buschelförmigen Gruppen stehenden Haselgestranches, 18. Juli, c. a.).

(*Dirrhacus*.)

clypeatus Hampe Hermannstadt (Bielz).

attenuatus Muls. longicornis Hampe, Hermannstadt (Bielz).

625. *Hypocoelus Lacordaire*.

procerulus Muls. Borgoer Pass (Bielz); Előpatak (im Holze eines gefällten, morschen Weidenstammes, Juli, c. a.).

Trixagini.

626. *Trixagus Kugelann*.

Die Arten finden sich unter Rinde, unter Blättern, in und am Holz.

brevicollis Bony. Kerzer-Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rátosnya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

dermestoides L. Hätzsieg, Hermannstadt, Kronstadt, S. Regen (Bielz), Hammersdorf (Ormay); Rotenturm, Schässburg

(einmal in grosser Menge unter Rinde auf der Breite, c. a.).

earinifrons Bony. Hätzsieg, Hermannstadt (Bielz); Rodnagelberge, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Rátosnya (Müller, c. a.).

elateroides Heer. Dolra, Hätzsieg, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm, Bistra, Karlsburg (c. a.).

var. *Bonvouloiri* Desbr. modestus Weise, Hermannstadt (Bielz).

exul Bony. Kronstadt (Deubel).

Duvali Bony. Bony - Nyires (Méhely), Schässburg in Baummulde, Kokeleufer unter Gerste, c. a.).

obtus Curt. Mezöség (Gyeken, Zib, Bielz); Marosujvár, Karlsburg, Schässburg (Witenberg, Adelsbühl, c. a.); Kronstadt, Hammersdorf (Deubel).

627. *Drapetes Redtenbacher*.

biguttatus Piller. mordelloides Host. Klausenburg (Bielz); Kerzer-Gebirge (Ormay), Schässburg, Előpatak (in jungen Holzschlägen auf Eichentrieben, c. a.); Kronstadt, Hongberg, Nussbach (Deubel).

L. Buprestidae.

628. *Chalcophora Solier*.

mariana Lap. Talmatschel (Bielz)

629. *Perotis Spinola*.

(*Aurigena* Laporte.)

lugubris F. Mühlbach, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S. Regen, Mezöség (Gyeken, Zib), Hermannstadt, Buzd (Unterweissenburger Komitat), Nagynyed, Magyarforró (Unterweissenburger Komitat), Haró (Hunyader Komitat), Schässburg an Obstbäumen, c. a.); Dicső-Szt. Marton (Csiki).

630. *Capnodis Eschscholtz*.

lencbrionis L. Reussmarkt, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasz, Kronstadt, Erdlau, Mediasch, S. Regen, Mezöség (Zib, Bielz), Szamosujvár (Ormay), Karlsburg (Weingarten, c. a.).

631. *Dicerea Eschscholtz*.

aenea L. Mühlbach, Reussmarkt, Hermannstadt, Zood, Unter-Ketz, Kronstadt (Bielz); Tuzsád (Deubel).

berolinensis Hbst. Karlsburg, Mühlbach, Gross-Peld, Hermannstadt, Fogarasz, Kronstadt (Bielz), Schässburg (Schrankel, 6. Mai, c. a.), Alsó-Bákos (Deubel).

632. *Poecilnota Eschscholtz.*

- variolosa* Payk. Zood. (Bielz); Hermannstadt (J. W., c. a.).
rutilans F. Hermannstadt, Neudorf bei H., Kerzer Gebirge, Klausenburg (Bielz); Schässburg (2. Juni, c. a.); Rosenau (Deubel).

633. *Buprestis Linné.*

- aurulenta* L. (splendida Payk). Zilinsgebirge (Bielz).
rustica L. Talmesch, Zood, Kerzer Geb., Törzburg, Kronstadt, Hosszufalu, Tusnád, Borszék, Marosgebirge (Bielz); Bistra (Ormay). Frecker Gebirge (Schöbner). Schässburg, Rodnagelbirge (auf frisch geschnittenen Brettern c. a.); Schulergebirge (Deubel).
haemorrhoidalis Herbst. Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel); Tusnád (Müller).

634. *Eurythyrea Sol.*

- austriaca*. Zilinsgebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tusnád, Marosgebirge (Bielz); Rodnagelbirge (auf frisch gesäeten Fichtenbrettern, c. a.).
scutellaris Oliv. Hermannstadt, Zood, Kerzer Gebirge (Bielz).
marginata Oliv. (unicans F.). Talmatschel (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (untere Wenck, August, c. a.).

635. *Melanophila Eschscholtz.*

- acuminata* Deg. Zood, Kronstadt (Bielz); Rodnagelbirge, Kovászna (Deubel).

636. *Phaenops Lacordaire.*

- cyanea* F. Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Gyergyó, Marosgebirge (Bielz).

637. *Anthaxia Eschscholtz.*

Die Arten findet man in den Blüten niederer Pflanzen bei Sonnenschein, besonders der Compositen.

- olympica* Kiesenw. Hammersdorf auf Wucherblumen, Chrysanthemum, 3. Juli, Ormay).
cichorii Oliv. Hätzeg, Rothberg b. H., Schässburg (Bielz); Baassen (c. a.); Gyógy (Bad), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).
millefolii F. Vásárhely, Nyáradtal (Bielz).
inculta Germ. (? umbellatarum F.). Gross-Pold (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Paj (bei Hätzeg), Schässburg (c. a.).
aurulenta F. Déva (Bielz).
manca F. Gross-Pold, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.).

Hackeri Friv. Siebenbürgen.

salicis F. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Szunyokszék b. Kr., Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas (Deubel).

var. *speciosa* Csiki. Siebenbürgen.

fulgurans Schrank. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet auf Blüten.

grammica Lap. Gross-Scheuern (Bielz); Vargyasbach (Almásér Höhle, Deubel).

nitidula L. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyék, Bielz); Gyógy (Ormay).

var. *signaticollis* Kryn. Gross-Scheuern, Rothberg b. H., Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

funerula Ill. Kronstadt (Zinne, Deubel).
morio F. Keresztényhavas, Schulergebirge (Méhely); Hätzeg (Deubel).

plicata Kiesenw. Siebenbürgen (Bielz).

sepulchralis F. Klausenburg (Bielz); Bálvány, Borszék (c. a.).

quadripunctata L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

Polycestini.

638. *Ptosima Solier.*

- 11-maculata* Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen (unter den Weingärten am Stamme eines Pflaumenbaumes, 11. Juni, c. a.).

639. *Aemaeodera Eschscholtz.*

convolvuli Walth. (cylindrica auct.). Fogarasch (Bielz).

degener Scop. (18-guttata Piller). Gross-Scheuern, Giresau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Baassen (unter den Weingärten gekötschert, c. a.).

pilosellae Bon. Klausenburg (Bielz).

flavofasciata Pill. Hermannstadt, Rothberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf Chrysanthemum-Blüten am Wieteberg), Baassen (ebenso), Vargyasbach (Almásér Höhle, Deubel), Sachs.-Regen (Müller).

640. *Sphenoptera Solier.*

antiqua Illg. Hermannstadt, Unter-Kerz, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Nagylak (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

Chrysobothrini.

641. *Chrysobothris Eschscholtz.*

chrysostigma L. Gyergyó, Borgoer Pass (Bielz); Rodna-Gebirge (auf abgehauenen Tannenstämmen, c. a.).

affinis F. In unsern Vorgebirgen und im Bergland verbreitet.

Solieri Lap. Matrosgebirge (Bielz).

Ob. Solieri-Lape ist dem C. a. f. i. sehr ähnlich, durch weit erbreitete Hals- und Flügeladern; zu Spitz-gerade verengte Flügeldadern, deren Gabelchen leicht eiförmig, verschieden. Das Vorkommen dieser Art bei uns, erscheint mir nicht ausser allem Zweifel.

Trachydini.

642. *Corabus Laporte*.

lampsanae Bon. elatus F.) Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neuorf, Mezösg (Gyke, Bielz), Hätzeg, Schässburg (c. a.), Kronstadt (Zinne, Deubel).

643. *Agrilus Curtis*.

Die Arten finden sich auf verschiedenen Holzarten, in denen ihre Larven leben, auch auf Blüten.

sexguttatus Brahm. biguttatus Rossi). Gross-Pold, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S-Begen (Bielz).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier ein Irrtum eingeschlichen ist zwischen A. biguttatus Rossi = sexguttatus Brahm und biguttatus F.; Schässburg wenigstens ist aus der Reihe der Fundorte gestrichen.

biguttatus F. (pannonicus Piller) Hermannstadt, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau (Bielz); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller); Klausenburg (Deubel).

sinuatus Oliv. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Nagyenied (Ormay); Kronstadt (Zinne, c. a.).

subauratus Gobl. Hammersdorf (Bielz).

viridis L. Kronstadt, Schässburg (Deubel), Hermannstadt, Gyögy-Bad), Eulasee-Kerzer-Gebirge (Ormay).

var. **novicus**. Ratzeburg, Schässburg (Bielz), Zibinsgebirge (Ormay); Borszék, Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **fagi** Ratzeb. Hermannstadt (Bielz), Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel), Borszék (c. a.).

coeruleus Rossi. Hammersdorf, Rotenturm, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

? **fissifrons** Ab. Borszék (3 Exemplare, c. a.).

Roberti Chev. Hammersdorf (Deubel, 22. Juni).

elongatus Herbst. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz).

angustulus Illig. Grossau, Gross-Schenk, Hosszufalu, Schässburg, Sachs-Begen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Hermannstadt (c. a., Ormay); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

var. **rugicollis**. Dobru (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Remete (Nagyenyed, Ormay).

laticornis Illig. Honigberg-Altfluss, 21. Juni, (Deubel).

olivicolor Kiesenw. Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

hastulifer Ratzeb. Kronstadt (Zinne, Deubel).

graminis Lap. Schässburg (1 Exemplar, c. a.); Reps-Seeditz).

derasofasciatus Lac. Gross-Scheuern, Garsau (Bielz); Klausenburg, Baassen (c. a.).

antiquus Muls. Hermannstadt (von Eichen geklopft, Ormay); Kronstadt, Erösd-Alt, (Deubel).

sericans Kiesenw. Bence-Nyires (Méhely), Torda (Deubel).

aurichalceus Redtenb. Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

integerrimus Ratzeburg, Klausenburg, Borszék (c. a.).

hyperici (Cz. Zibinsgebirge (Bielz); Hammersdorf, Gyergyó-Tolgyes (Ormay).

obscuricollis Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

Trachyini.

644. *Trachys Fabr.*

minuta L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

pygmaea F. corusca Panz.). Zood (Bielz).

troglodytes Gyll. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Gyergyó (Ormay); Kronstadt (Deubel).

pumila Illig. Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Előpaták, Schässburg (Bielz), Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Erösd-Altfluss, Deubel).

645. *Habroloma Thomson*.

nana Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Ll. Lymexylidae.

646. *Hylocoetus Latreille*.

(Elateroidea Schäffer.)

dermestoides L. In unsern Gebirgen und im Bergland verbreitet.

var. ? **Marci** L. Rodnagelbirge (Deubel).

var. ? **Morio** F. Rodnagelbirge (Deubel).

647. *Lymexilon Fabr.*

In altem Holze.

navale L. Hermannstadt, Gotzenberg, Zood, Gross-Schenk, Kronstadt, Sachs-Begen (Bielz); Zernest (Deubel).

LII. Bostrichidae.

Psoini.

648. *Psoa Herbst.*

viennensis Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Vajda-Hunyad, Schässburg (von Hecken geklopft und aus alten Weinrebentrieben gesiebt, c. a.).

Bostrichini.

649. *Stephanopachys Waterhouse.* (*Dinoderus* Kiesenw., Seidlitz.)

substriatus Payk. Hermannstadt, Zood, Präsbo, Sterpu, Girku, Kronstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

650. *Bostrichus Geoffroy*

capucinus L. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.

651. *Xyloniites Lesne.*

(*Xylopertha* Kiesenw., Seidlitz.)

retusus Oliv. (♀ *sinuatus* F.). Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz); Haró (Hunyader Komitat), Remete (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Zimme, Deubel).

652. *Sinoxylon Duftschmid.*

perforans Schrk. (*bispinosum* Oliv.) Klausenburg (Bielz); Schässburg (Fuchsloch von einer Hecke geklopft, c. a.).

LIII. Lyctidae.

653. *Lyctus Fabr.*

linearis Goeze. (*unipunctatus* Hbst.). Fogarasch, Retjezat, Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Bistritz, Mezöség (Záh, Bielz).

Nach meinem Material erhalte ich die Uebersetzung, dass *L. linearis*, dessen Fühlerkeule so lang sein soll, als die übrigen Glieder zusammen, bei uns gar nicht vorkommt, sondern nur *L. pubescens*. Besonders machen mich die zahlreichen Fundorte, die Bielz für diese Art angibt, stutzig, während er für *L. pubescens*, der nicht selten vorkommt, nur wenige Fundorte angibt.

pubescens Panz. Hätzeg, Retjezat, Schässburg, Mezöség (Gyeko, Bielz); Mós-Rákos, Előpatak (auf frisch geschältem Weidenholz oder auf frischen Wunden der Weiden, auch an Telegraphenstangen (c. a.); Kronstadt, Honigberg (an Eichenstämmen, Deubel).

LIV. Ptinidae.

Gibbiini.

654. *Gibbium Scopoli*

psylloides Czempinski. Hermannstadt (Lazareth), Klausenburg (auf Sumpfpflanzen, Bielz); Hammersdorf, Salzburg (Ormay).

Ptinini.

655. *Niptus Boieldieu.*

hololeucus Faldern. Kronstadt (Deubel, aus dem Kehrlicht einer Spezereihandlung, vielleicht importiert).

656. *Ptinus Linné.*

(*Pseudoptinus*.)

lichenum Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay).

coarcticollis Sturm. Schässburg (Wietenberg, 25. Februar, wahrscheinlich an einer alten Eiche, c. a.); Rotenturm, Bucecs (subalpin, Deubel).

(*Bruchoptinus*.)

rufipes Oliv. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Marosujvár, Hammersdorf, Vajda-Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Ptinus* i. sp.)

fur L. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.

pusillus Sturm. Schässburg (30. März Wietenberg, 11. April Breite, wahrscheinlich aus alten Eichen, c. a.).

bicinctus Strm. Kronstadt (Bielz).

Der Fundort Schässburg ist aus dem Verzeichnis zu streichen.

latro F. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.

brunneus Duft. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

villiger Reitter. Hermannstadt (Februar), Kerzer Gebirge (Juli, Ormay); Unterkers, Bistra, Baassen, Schässburg, Hätzeg (in Eichen, c. a.)

perplexus Rey. Hermannstadt (8. März), Klein-Pold (24. Oktober, Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Hätzeg, Schässburg (März, unter alten Reben, c. a.).

pilosus Müller. Hätzeg (Bielz); Klein-Pold (Ormay); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Rotenturm (Deubel).

subpilosus Strm. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bucecs (subalpin, Deubel).

(*Glynopterus*.)

dubius Sturm. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz).

variegatus Bossi. S. Regen. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (c. a.)
ypoleuc.

raptor Sturm. Bidens Sturm. Fogaraseh. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Hermannstadt, Heban, Schanta (Ormay); Paringul, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (alpin); Rosenau (Deubel).
Pr. bidens Oliv. scheint bei uns nicht vorzukommen.

Schlerethi Reitter. Hermannstadt 17. Mai (Ormay); Schässburg April, Eichenuhu (c. a.); Alsó-Rákös (Deubel).

LV. Anobiidae.

Die Arten leben grossenteils in altem Holz.

Hedobitini.

657. *Hedobia* Sturm.

imperialis L. Michelsberg, Schässburg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Schulergebirge, Zinne (Deubel).
regalis Duft. Gross-Scheuern (Bielz)

658. *Dryophilus* Chevrolat.

pusillus Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.); Schuler P'ojana, von Fichten geklopft, (Deubel).

659. *Gastrallus* Duval.

immarginatus Müll. Gross-Scheuern (Bielz); Hätzeg (Deubel).
laevigatus Oliv. Hermannstadt (Ormay).

660. *Xestobium* Molschulsky.

Hyperius.

plumbeum Ill. Paringulgebirge, Kronstadt (Zinne); Rosenau (Deubel); Szováta (5. Juni, c. a.).

Xestobium l. sp.

rufovillorum Deg. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

austriacum Reitter. Negoi (1 Exemplar, c. a.).

661. *Ernobius* Thomson.

Kiesenwelleri Schulsk. (pini) Muls. Paringulgebirge (subalpin, Deubel).

nigrinus Sturm. Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

ar. politus Redth. Rodnagebirge (c. a.)

abietinus F. Kronstadt, Borszék (Bielz); Schanta (Ormay); Rodnagebirge, Paringulgebirge, Schulergebirge, Buceses alpin, gesiebt, (Deubel).

abretis F. Schanta (Ormay); Schulergeb., Königstein (Crepatura, Deubel).

mollis L. Zubinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Baassen, Schässburg, Borszék (c. a.)

662. *Anobium* Fabricius.

Die Arten leben in altem Holz.

Anobium l.

denticolle Panz. S. Regen, Dees (Bielz); Kerzer Gebirge, Gyözy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel).

pertinax L. In unseren Geadgen und im Berglande verbreitet.

Anobium s. str.

striatum Oliv. (domestuum) Geoffr. Hätzeg, Hermannstadt, Eiter-Kerz, Fogaraseh, Lattlau (Bielz); Schässburg, Olahfalu, Hélyiz, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne); Paringul (subalpin, Deubel).
(Hedobregmus)

rutipes F. Gross-Scheuern, Fogaraseh, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Givergyó-Tolgyes (Ormay); Schässburg (in altem Weissbuchenholz); Szováta, Kronstadt (c. a.).

nitidum Hbst. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (Pessell 25. Juli, in altem Lindenholz, c. a.);

fulvicorne Sturm. Fogaraseh (Bielz); Kronstadt (c. a.) Hätzeg (Deubel); Klausenburg (Müller).

var. **rubrum** Reitter, Hätzeg (Deubel).

var. **rufipenne** Duft. Götzenberg (Ormay).
fagi Muls. Kronstadt (Zinne, Deubel).

663. *Oligomerus* Redtenbacher.

ptilinoideus Woll. Reyi Bris., Hermannstadt (Mai, Ormay).

brunneus Oliv. Hätzeg, Präsebe, Kronstadt (Zinne, Bielz); Hammersdorf (Ormay); Baassen, Schässburg (Lattenzaun, 6. Juli, c. a.).

664. *Sitodrepa* Thomson.

panicea L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Kronstadt (Zinne), S. Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Karlsburg, Schässburg Wohnhaus, 6. August, (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

Xyletinini.

665. *Trypopitys* Redtenbacher.

carpini Herbst. Zood (Bielz); Schässburg (im Hause); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); S. Regen (Müller).

666. *Ptilinus* Geoffroy.

pectinicornis L. Hätzeg, Götzenberg, Zood, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Lattlau, Mediasch, Schässburg, S. Regen (Bielz); Malonviz (c. a.).

fuscus Geoffr. (costatus) G. Ill. Hätzeg, Präsebe, Lattlau (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg, Kronstadt, Frecker Gebirge (Serbota); Malonviz, Alsó-Rákös (c. a.)

667. *Xyletinus Latreille.*

- maculatus* Kiesenw. Siebenbürgen (Catalog. col. Europae 1906, 131).
afer Panz. Rotenturm (Juli, Ormay); Rodnagelberge, Schässburg, Scheuereberg, gekotschert, Mm, Breite, 1. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
brevitarsis Schilsky. Hermannstadt (2 Ex. c. a.).
pectinatus F. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Wolkendorf (Deubel).
laticollis Duft. Gross-Scheuern (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kalán, Schässburg, Scheuereberg 23. Mai, gekotschert, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
oblongulus Muls. Schässburg (1 Exempl. c. a.).

668. *Lasioderma Stephens.*

- obscurum* Solsky. Baassen (Juli, 1900, c. a.).

669. *Ochina Stephens.*

- Latreillei* Bon. Klausenburg (Bielz).

Dorcatomini.

670. *Dorcatoma Herbst.*

- flavicornis* F. Holzungen (Bielz); Wolkendorf (Deubel).
chrysomelina Sturm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Előpatak (c. a.); Hammersdorf (Ormay).
dresdensis Herbst. Schielthal, Petrozsény, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

671. *Coenocara Thomson.*

- bovistae* Hoffm. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
subglobosa Muls. Schässburg (Siechhofwald, 20. Juli, auf Bovist, c. a.).

Heteromera.

LVI. Oedemeridae.

Calopini.

672. *Calopus Fabricius.*

- serraticornis* L. Gyergyó (Bielz); Kis-Somlyó (Méhely); Schuler (oberhalb der Wolfsschlucht unter Fichtenrinde), Präsche (oberhalb der Schutzhütte von trockenen Fichten geklopft, Deubel).

673. *Sparedrus Serville.*

- testaceus* Andersch. Gross-Pold (Bielz); Bistritz (Müller).

Oedemerini.

674. *Anoncodes Duponchel.*

Auf blühenden Pflanzen: Disteln, Schirmlilien etc.

(Nace-da.)

mehanura L. Hätzeg (Bielz).

(Anoncodes.)

rufiventris Scop. Dobra, Kerzer Gebirge, Borgoer Pass, Dees (Bielz); Balánbánya, Arpascher Gebirge, Rotenturm, Baassen, Malomviz, Rodnagelberge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

ustulata F. Talmatschel, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Kronstadt (Gesprenge), Busees, Retjezat (c. a.); Vargyas (Almäser Höhle), Hätzeg (Deubel).

fulvicollis Scop. Dobra (Bielz); Nagy-Bagymás, Schuler (Aarna im Fómös-Tal, Deubel).

(Pachychirus.)

adusta Panz. Gross-Scheuern, Mediasch, Borszék, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Hätzeg (Deubel).

675. *Ischnomera Stephens.*

sanguinicollis F. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schnulgergebirge, Malomviz, Schässburg (Eichrücken, c. a.).

coerulea L. Zibinsgebirge, Präsche, Kerzer Gebirge, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt, Zernes (Deubel).

676. *Chrysanthia Schmidt.*

- viridissima* L. Fogarasch, Sächs.-Regen, Gyergyó (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Hätzeg, Nagybagymás (Öcsén), Zernes (Plaja foi, Deubel).
viridis Schmidt. Zibinsgebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Tartlau, Oláhfaln, Borszék, Borgoer Pass, Kerzer Gebirge, Bulea, Bielz; Balánbánya, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagybagymás (Öcsén, Deubel).

677. *Oncomera Stephens.*

(Dryops Fabr.)

femorata F. Kronstadt (Deubel, Zinne, geklopft, Abend aus Licht geflogen im Schützenhaus).

678. *Oedemera Olivier.*

Auf blühenden Pflanzen.

(Oedemerona.)

flavipes F. Hätzeg (2 ♀♀, c. a.).

(Oedemerastrea.)

podagrariae L. Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfaln, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Retjezat, Előpatak (c. a.).

(*Oedemerella*).

croceicollis Gyllb. Gross-Schenern, Bielz, Schässburg, Schenenberg, 13. Mai, auf Schirfrohre, (c. a.)

(*Oedemera* i. sp.).

flavescens L. (*femorata* Ganglb.). Hermannstadt, Zibensgebirge, Gürtelsau, Kerzer Gebirge, Fogarisch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Olabfalu, S. Regen, Bielz, Stolzenburg, Bistra (Ormay), Hatzeg, Előpatak, Nagvenyed (c. a.).

subulata Oliv. Gross-Schenern, Rotenturm, Olabfalu, Bielz, Schässburg, Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

trisilis Schmidt, Rodnaggebirge, Deubel.

Deubeli Ganglb. Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.).

(*Oedemerina*).

virescens L. Hermannstadt, Marpöl, Fogarisch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, Olabfalu, S. Regen, Bielz, Rotenturm, Zool, Resinar (Ormay).

lurida Marsh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Schässburg, Sachs.-Regen, Bielz; Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

LVII. Pythidae.

Pythini.

679. *Pytho Fabricius*.

depressus L. Zool, Präsche, Fogarascher, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schulergebirge, Görgényer Tal und Gebirge, Marosgebirge (Bielz).

Salpingini.

680. *Lissodema Curtis*.

4-pustulatum Marsh. Karlsburg (unter den Weingärten aus abgeschnittenen alten Reben in grosser Anzahl gesicht, 28. Mai, S. Regen, Vajda Hunyad (c. a.)).

cursor Gyll. Schässburg aus Astuckeln, 28. Juni, (c. a.), Kronstadt (Zinne), Honigberg (23. Juni, Deubel).

681. *Spaeriestes Stephens*.

Was für eine Art Bielz mit *Salpingus* (*Colposia*) *ruficollis* Panz. meint, kann ich nicht eruiert; nachdem er auch Schässburg unter den Fundorten aufzählt, hat es den Anschein, dass mit dieser Art *Rhinostmus ruficollis* L. gemeint ist.

foveolatus Ljungh (Fogarisch, Bielz), Szováta, Schässburg (Februar und April, Wieteburg, aus morschem Weissbuchenholz, c. a.).

682. *Rhinostmus Latreille*.

Die Arten leben im Holz, namentlich in den Aesten verschiedener Bäume.

viridipennis Latr. Rotenturm, Schässburg, Musler, Fuchsloch, Buche, (c. a.); Kronstadt, Hatzeg, Schuler, Deubel, Bistritz (unter Eichenrinne, Müller).

ruficollis L. Gross-Schenern, Götzenberg, Kronstadt, Gyergyó, Bielz, Csukás, Budös, Schässburg (im Weissbuche), Rodnaggebirge, Retjezat (c. a.), Tuszád (Deubel).

planirostris F. Gross-Schenern, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Retjezat, Gross-Altscher Kugen bei Sch., Torockó, Klausenburg, Bucecs (c. a.); Bistritz (Müller).

Mycterini.

683. *Mycterus Olivier*.

curculionoides F. S. Regen, Klausenburg (Bielz).

umbellatarum F. Talmatsche, Sächs.-Regen (Bielz); Gyergyó-Fölgyes (Ormay).

LVIII. Pyrochroidae.

684. *Pyrochroa Geoffroy*.

coccinea L. Durch das Bergland verbreitet.

serralicornis Scop. (*purpurata* Müll.). Hermannstadt, Gross-Schenern, Neudorf b. H., Holzungen, Fogarisch, Kronstadt, Mediasch, Maros-Gebirge (Bielz); Schässburg, Hammersdorf, Rotenturm (c. a.), Vargyasbach (Almásér Höhle, Deubel).

pectinicornis L. Retjezat, Zibensgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz), Schässburg, Hermannstadt (c. a.), Schulergebirge, Rodnaggebirge (Deubel).

LIX. Hylophilidae.

(*Pedilidae*.)

685. *Phytobaenus Sahlberg*.

amabilis Sahlb. Klausenburg (Bielz).

686. *Hylophilus Berthold*.

Englenes Westwood.

(*Aderus*.)

populneus Panz. Schässburg (im Holze alter Eichen), Klausenburg, Előpatak (c. a.); Rosenau (Deubel, S. Regen, Müller).

pygmaeus Degeer, Zibensgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay), Kronstadt (Deubel).

var. **oculatus** Panz. Zibensgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Baassen, Schässburg (c. a.).

LX. Anthicidae.

687. *Notoxus Geoffroy.*

biinterruptus Pic. Rotenturm (auf Weiden am Alt), Kronstadt (c. a.).

monoceros L. Hätzeg, Hermannstadt, Neppendorf, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Batosnya (c. a.).

brachycerus Fald. Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Meliasch (Bielz); Bistritz (Müller).

cornutus F. (trifasciatus Rossi). Hätzeg, Elöpaták, Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Rotenturm, Nagyenyed (c. a.).

miles Schmidt. Elöpaták (c. a.); Kronstadt (Bielz).

688. *Mecynotarsus Laferté.*

serricornis Panz. Hermannstadt, Holzmenzen (Bielz).

689. *Formicomus Laferté.*

pedestris Rossi (formicarius auct.). Hermannstadt, Schässburg, Dees, Mezőség (Gyeke, Bielz); Déva, Nagyenyed (c. a.); Vajda-Hunyad (Deubel).

690. *Anthicus Payk.*

humilis Germ. Déva, Salzburg, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Deesakua, Baassen (c. a.).

floralis L. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Kronstadt, Schässburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Remete (Nagyenyed, Ormay).

var. **formicarius** Goeze. Kronstadt, Schässburg, Klausenburg (c. a.).

gracilis Panz. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt, Schässburg (c. a.).

hispidus Rossi. Schässburg (einmal im Körper einer abgestorbenen *Sitaris muralis*, 1. Oktober, c. a.); Hätzeg (Deubel).

antherinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

bifasciatus Rossi. Hätzeg, Neudorf bei H., Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed, Karlsburg (c. a.).

ater Panz. Rotenturm (c. a.).

fenestratus Schmidt. Hermannstadt (Bielz).

flavipes Panz. Rotenturm (Altfer, Bielz); Kronstadt (c. a.).

axillaris Schmidt. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz, Nagyenyed, Schässburg (c. a.), Breindorf (Priesterhügel, Deubel).

sellatus Panz. Honigberg (Altfluss, Deubel).

unicolor Schmidt. Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).

691. *Ochthenomus Schmidt.*

tenuicollis Rossi. Fogarasch (Altfer, Bielz).

LXI. Meloidae.

Meloini.

692. *Meloë Linné.*

Die Käfer findet man unter Blättern und im Gras, die Larven leben parasitisch in verschiedenen Bienenestern.

(*Proscarabaeus*.)

proscarabaeus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

violaceus Marsh. Wie der vorige verbreitet.

autumnalis Oliv. Neudorf, Hosszufalu, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay).

(*Meloë* i. sp.)

hungarus Schnrk. Hermannstadt (a. B.), Hammersdorf, Mediasch, Torda, Mezőség (Gyeke, Bielz); Salzburg, Buzd (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Schässburg (in Weingärten, c. a.).

uralensis Pall. Zabinsgebirge (Bielz); Salzburg (Ormay).

decorus Brandt. (pygmaeus Redtenb.). Präsbe, Fogarascher Gebirge, Marienburg, Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt, Schässburg (c. a.).

cicatricosus Leach. Gross-Scheuern, Neudorf, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

coriarius Brandt. Hammersdorf, Resinar (Ormay).

variegatus Donovan. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marienburg b. Kr., Mediasch, Dees (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel); Klausenburg (Müller).

brevicollis Panz. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Szunyokszék b. Kr., Karlsburg (c. a.); Bodola (Deubel).

rugosus Marsh. Hätzeg, Déva, Talmatschel, Fogarasch, Hosszufalu, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Nagylak (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt (c. a.); Klausenburg (Müller).

scabriusculus Brandt. Zood, Marienburg b. Kr., Schässburg (Bielz); Karlsburg, Hammersdorf, Orlat (c. a.); Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Lythni.

693. *Cerocoma Geoffroy.*

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen an sonnigen Bergabhängen.

Schreberi F. Gross-Scheuern (Bielz) (Heszeg, c. a.).

Schäfferi L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Nendorf b. H., Fogarasch, Mediasch (Bielz).

Mühlfeldi Gyll.
var. *Kunzei* Friv. Klausenburg (Bielz)

694. *Zonabris Harold.*

variabilis Pallas. Gross-Scheuern (Bielz); Mezöség (Gyeken, Méhely).

floralis Pallas. Poplaka, Resmar, Repts, Mezöség (Záh, Gyeken, Bielz); Regezat auf einer Bergwiese im Tale des Rimare auf blühenden Pflanzen, wenn ich mich recht erinnere, vornehmlich Scabiose, c. a.).

var. *spartii* Germ. Gross-Scheuern (Bielz, 1 Ex. aus der Fuss'schen Sammlung, c. a.).

695. *Lydus F.*

trimaculatus. Nendorf b. H. (Bielz), Mezösámsond (Méhely).

(*halosinus*.)

collaris F. Gross-Scheuern (Zakelsberg? (Bielz)).

chalybaeus Lusch. Mezöség (Gyeken, Bielz).

Lyttini.

696. *Lytta Fabr.*

vesicatoria L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

697. *Zonitis Fabr.*

immaculata Oliv. (mutua Scriba) Mediasch (Bielz)

698. *Enzonitis Semenow.*

sexmaculata Oliv. Gross-Scheuern (Bielz); Hätzeg, Vurfu Urea, Bergabhang oberhalb des Bahnhofes Aradja-Hätzeg auf blühenden Pflanzen, c. a.)

fulvipennis F. Klausenburg (Bielz).

699. *Stenodera Eschscholtz.*

caucasica Pal. Gross-Scheuern, Hermannsdorf, Kronstadt, S. Regen, Mezöség (Záh, Nagyenyed, Bielz), Hahnbach (Albrecht).

Deutel zweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

700. *Hapalus Fabr.*

bipunctatus Germ. Mediasch, Klausenburg (Bielz)

bimaculatus L. S. Regen (Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay)

necydaleus Pall. Schässburg (Bielz).

Das Tier befindet sich jetzt wärzig nicht mehr in meiner Sammlung, weshalb auch eine nochmalige Ueberprüfung unmöglich ist. Da die Zeit der Bestimmung des Tieres in die ersten Jahre meiner Sammeltätigkeit fällt, ist inwiefern das Vorkommen dieser Art bei uns nicht sichergestellt.

creticus Friv. S. Regen (Bielz).

Das Vorkommen dieser Art erscheint sehr fraglich, eher dürfte H. *spectabilis* bei uns zu finden sein.

701. *Sitaris Latreille.*

muralis Forst. Mediasch, S. Regen (Bielz).

Schässburg. Ich sammelte diese Art mehrermale an Häusern, deren Dächer mit Schindeln gedeckt und innen mit Wespennestern besetzt waren im August, c. a.). Hermannstadt (Albrecht), S. Regen (Müller)

LXII. Rhipiphoridae.

Pelecotomini.

702. *Pelecotoma Fischer.*

fennica Payk. Klausenburg, Gyalu (Bielz); Hätzeg (an einem geschälten alten Weizenstamm, c. a.); Kronstadt (Burzen, Viehweide, Deutel).

Rhipiphorini.

Die Arten leben parasitisch in den Nestern einer Erdwespe.

703. *Metocens Gerstläcker.*

paradoxus L. Kronstadt, Schuler (Gyeken, Bielz); Pogane, Schuleran, von einer Fichte geklopft, Deutel

LXIII. Mordellidae.

Seraptin.

704. *Seraptia Latreille.*

fuscata Müll. Holzmengen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Broos (Ormay); Baassen (in morschen Holze eines alten Nussbaumes, c. a.).

705. *Tomoxia Costa.*

biguttata Gyll. Gross-Scheuern, Kerzer (Gyeken, Kronstadt, Budos (Bielz), Borszék (Fichtenstumpf), Szováta (aus einem verpalzten Rothbuchenstumpf herausgehauen, 5. Juni, c. a.).

706. *Mordella Linné.*

perlata Sulz. Kronstadt (c. a.).

maculosa Naezen. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk (Bielz); Flecker Gebirge (an den Wurzeln einer Fichte); Bistra, Borszék, Rotenturm (an den Schwämmen, welche an den Fichtenstämmen der Uferbefestigung wuchsen, in Mehrzahl, c. a.); Nagybagymás (Deubel).

aurofasciata Comoll. Baróth (Méhely).

bisignata Rdlb. Gross-Scheuern, Reps (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.).

fasciata F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

aculeata L. Durch das ganze Gebiet, wie die vorige Art auf blühenden Pflanzen.

707. *Conalia Mulsant.*

Baudii Muls. Rotenturm (an Schwämmen der Uferbefestigung, wie *Mordella maculosa*, Ende Juni, c. a.).

708. *Mordellistena Costa.*

abdominalis F. Kronstadt, Zernest, Vargyastal, Hätzeg (Deubel); Szováta (auf Schirmpflanzen des Bachufers, 5. Juni, c. a.).

Das ♀, welches ich mit zahlreichen normal gefärbten Weibchen bei Szováta sammelte, ist bis auf die Dornen der Hinterschenen ganz dunkel; die Fühler sind vom vierten Gliede an der Unterseite dicht, kurz, weiss gewimpert.

a. *maculicollis* Schilsky. Szováta (c. a.).

humeralis L. Zood, Fogarasch (Bielz).

a. *axillaris* Gyll. Porumbach, Kerzer Gebirge (Bielz).

lateralis Oliv. Girelsau, Marpod, Kronstadt (Bielz).

neuwaldeggiana Panz. (brunnea F.). Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

nana Motsch. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

parvula Gyll. Hätzeg, Neudorf b. H., Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Schässburg (c. a.); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).

a. *inaequalis* Muls. Klausenburg (Bielz); Schässburg (18. August, c. a.).

episternalis Muls. Dees, Szamosujvár, Gyeke (Méhely).

brevicauda Boh. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Reps (Seidlitz); Baassen, Schässburg, Alsó-Rákos, Borszék (c. a.).

micans Germ. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Salzburg, Gyógy (Bad, Ormay); Kronstadt, Hätzeg, Schuler-Gebirge (Deubel).

pumila Gyll. Hätzeg, Gross-Scheuern, Mediasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz);

Hermannstadt (Ormay); Schässburg Baassen, Borszék (c. a.).

stenidea Muls. Hermannstadt (Seidlitz); Borszék, Petrozsény (c. a.).

Anaspini.

709. *Pentaria Mulsant.*

badia Rosenh. Hätzeg, Zibins-Gebirge (Bielz).

710. *Cyrtanaspis Emery.*

phalerata Germ. Kronstadt (im Flieder-gässchen und auf der Zinne geklopft, (Deubel).

711. *Anaspis Geoffroy.*

frontalis L. Retjezat, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Előpatak, Bükszád, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Borszék, Baláubánya, Rotenturm, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

a. *lateralis* F. Puj (bei Hätzeg, c. a.).

a. *verticalis* Fald. Kronstadt (Deubel).

pulicaria Costa. Hermannstadt (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

thoracica L. Retjezat, Mühlbach (roter Berg), Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

ruficollis F. Zibinsgebirge (Bielz); Puj (b. Hätzeg), Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas (Deubel).

Kiesenwetteri Em. Schanta (auf blühender *Spirea* und *Asranta*, Ormay); Bistra, Retjezat, Borszék (c. a.); Kronstadt, Hätzeg, Nagybagymás, Zernest (Deubel).

(Nassipa.)

flava L. Hätzeg, Negovan, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, S.-Regen (Bielz); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel); Bistritz (Müller); Szováta (c. a.).

rufilabris Gyll. Hätzeg, Gross-Scheuern, Marktschelken, Előpatak, Bükszád (Bielz); Schanta, Gyógy (Ormay); Retjezat, Schuler-Gebirge, Schässburg, Kronstadt (c. a.); Zernest (Deubel).

melanostoma Costa. Schulergebirge, Schässburg, Szováta (c. a.).

(Spania.)

subtilis Hampe. Siebenbürgen.

(Larici.)

palpalis Gerhardt. Hätzeg, Schässburg (c. a.).

(Silaria.)

brunnipes Muls. Petrozsény, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hätzeg (Deubel).

varians Muls. Fogarasch, Kronstadt, Partau (Bielz). Hätzeg, Schässburg (c. a.; Vargyas Almásy Hölle, Deubel).
a. collaris Muls. Borszék, Rotenturm (c. a.)

LXIV. Melandryidae.

Tetratomini.

712. *Tetratoma Fabr.*

fungorum F. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, S-Biegen (Bielz). Präsche, Ormay; Kronstadt (Zinne, Deubel).
ancora F. Präsche, Porumbach, Surul Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz, besonders auf getrockneten, verpilzten Buchenästen). Rothgebirge, Csukás, Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Eustrophini.

713. *Eustrophus Latreille.*

dermestoides F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Fogarasch, Görgény-Gebirge (Bielz); Schässburg am Fusse alter Eichen unter Moos, entschlüpfen sehr leicht durch ihre putzenden raschen Bewegungen, (c. a.). Kronstadt (Deubel).

714. *Hallomenus Panzer.*

hinotatus Quens. Negoi, unterhalb der Schulzhütten, an Pilzen, (Deubel). Bistra, an den Wurzeln eines verpilzten Fichtenstumpfes, (c. a.). Nagybagynás (von einer Fichte geklopft, Deubel).
axillaris Illig. Zibinsgebirge (Bielz, Kronstadt (Deubel)).

Orchesini.

715. *Orchesia Latreille.*

Die Arten leben an vertrockneten und verpilzten Aesten und Baumstämmen.

micans Panz. Zibinsgebirge, Neudorf, Kronstadt, S-Biegen (Bielz).
aeicularis Reitter (picea Seidlitz, nec Herbst). Rotenturm, Büdös, Schässburg, Oláhfalú, Rosenau b. Kr. (c. a.).

Die 7 Exemplare meiner Sammlung konnte ich mit *Orchesia micans* Panz. aus Bessau vergleichen. Sie stimmen mit den Merkmalen, welche Seidlitz F. transs. 569 von *O. picea* Herbst hervorhebt, vollkommen überein. Da *O. picea* Herbst jedoch zu *O. micans* Panz. als Synonym gehört, habe ich zu *O. aeicularis* als synonym gesetzt *O. picea* Seidl. Dagegen ist nur *O. micans* Panz. aus Siebenbürgen nicht vorgekommen.

19 a.

minor Walk (sep. c. a. Roenh.) Schässburg, Belső, Bistra, Kronstadt (c. a.). Schanta (Ormay). Bucsos (su alpin). Nagybagynás, Zernest (Deubel).

undulata Kr. Rühvi b. Kr., Büdös, Schässburg (c. a.); Zernest, Kronstadt (Rothgebirge, Deubel).

fasciata Payk. Gozenberg, Anna-See (Bielz). Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.; Bucsos (su alpin, Deubel)).

blandula Braesek. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz). Bucsos (su alpin, Deubel). Ratosnya, Borszék (c. a.).

var. transsylvaniae Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta, Gyógy (Biel, Ormay); Schässburg, Büdös (c. a.).

var. carpathica Reitter. Schindlergebirge, Csukás (c. a.).

grandicollis Roenh. Kerzer Gebirge, Kronstadt (?) (Bielz).

716. *Abdera Stephens.*

carida.

affinis Payk. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

flexuosa Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Aculea i. sp.

quadrifasciata Curt. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Praszka b. Zabita, aus verpilztem Buchenholz geschl. (c. a.). Zinne (Deubel).

717. *Direaea Fabr.*

australis Fairm. 1-guttata Reitenb. nec Payk. Oláhfalú, Oláhlaposhánya (Bielz).

Seidlitz (F. transs. p. 571) führt, für warrenenheiten, dass sich die Angabe Bielz's, welcher die D. 1-guttata Payk. für Siebenbürgen anführt, auf 1-guttata Reitenb. bezieht; ihm folgend, nenne ich daher nur letztere in unser Verzeichnis auf.

718. *Phloeotrya Stephens.*

rufipes Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz).

scaber n. sp. Schässburg (Breite, 2 Ex., c. a.).

Phloeotrya scabra n. sp. Länge 9–10 mm.

Dem *Ph. rufipes* ähnlich, aber grösser, mehr cylindrisch, Oberseite mit weniger dichten, feineren und kürzeren gelblich-brauner Benennung. Kopf bis über die Augen in den Halsschild einzuliegen. Stirne mit 1; fein und dicht, in der Mitte sparsamer punktiert, glänzend, heller oder dunkler braun gefärbt. Oberlippe im letzteren Falle kleiner. Antenne mit 10 Gliedern, nicht ausgesenket, am Augengelenke eine seichte Fühlerfurche. Fühler schlanker als bei *Ph. rufipes* und etwa länger als Kopf und Halsschild zusammen. Bei *Ph. rufipes* etwas kürzer, das dritte Glied mehr als 1 so lang als das zweite und so lang als das vierte, die 10-

genden etwas kürzer, aber alle fast doppelt so lang als breit, hell rötlichgelb so wie die Taster, deren messerförmiges, gerades Endglied etwa so lang ist als das zweite und dritte Glied zusammen. Halsschild dunkelbraun, fast so lang als hinten breit, die Seiten gerundet, nach hinten wenig mehr als nach vorn verengt, der Vorderrand stark gerundet vorgezogen, der Hinterrand ist gegen das Schildchen etwas vorgezogen und gegen die Hinterecken schief, aber geradlinig abgeschnitten, die Hinterecken dadurch sehr stumpfwinklig, etwas abgerundet, der Seitenrand bis in die sehr stumpfen Vorderecken deutlich, die Scheibe gewölbt, vor dem Hinterrand schwach quer niedergedrückt und mit einer seichten, nach vorn abgekürzten Mittelfurche und jederseits derselben mit seichten Längsrinnen, ziemlich dicht grob, rauhkörnig querrunzelig punktiert, matt. Die Flügeldecken dunkelbraun, an der Basis kaum breiter als der Halsschildhinterrand, cylindrisch, mit kaum ange deuteten Streifen, wesentlich feiner und sparsamer, querrunzelig rau punktiert, glänzender als der Halsschild. Die Unterseite bei dem einen Exemplar samt den Beinen hell rötlichgelb, bei dem andern Exemplar mehr hell bräunlichgelb.

Demnach unterscheidet sich die neue Art von *Ph. rufipes* durch bedeutendere Grösse, mehr cylindrische Gestalt, wesentlich gröbere und rauhere Punktierung der Oberseite, die auf den Flügeldecken merklich feiner ist als auf dem Halsschild, hellere Färbung, längere und schlankere Fühler, längeres Maxillartasterendglied usw.

Ich sammelte zwei Stück dieser Art, das eine unter Eichenrinde, das andere an einem Weissbuchenstumpf, letzteres am 12. August.

719. *Xylita Paykull*.

buprestoides Payk. (*laevigata* Panz.). Klausenburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a., 3 Ex.); Rodnagebirge (Valea Vinului, Deubel); Marosgebirge (Müller).

livida Sahlb. Königstein (Juli, unterhalb Kápu-Tamás von Fichten geklopft, Deubel).

720. *Serropalpus Hellenius*.

barbatus Schall. Hermannstadt, Zibinsgeb., Kronstadt, Hosszufalu, Marosgebirge (Bielz); Schässburg (im Zimmer eines neugebauten Hauses, dessen Fussboden vor kurzem gelegt worden war, daher wahrscheinlich im Fichtenholz lebend, 24. Juni 1897); am Gyilkostó im Fluge gefangen, Nagybagmás und Schulergebirge geklopft (Deubel).

Hypalini.

721. *Hypulus Paykull*.

quercinus Quens. Hermannstadt, Neudorf b. H., Götzenberg, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (im Moos alter Eichen, wie der folgende), Alsó-Rákos (c. a.).

bifasciatus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Resinar (Ormay); Rotenturm, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); S. Regen (Müller).

722. *Marolia Mulsant*.

variegata Bosc. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezal, Bucsecs, Prásbe, Paringul (von Latschen und Fichten geklopft, Deubel).

723. *Zilora Mulsant*.

sericea Sturm (Eugeniae Ganglb.). Schulergeb. (Ganglb., Deubel, an Schwämmen und unter der Rinde gestürzter Fichten); Zernest (Königstein 30. Mai 1891 am Kamme der Spirle, ebenfalls unter Fichtentrinde, Deubel).

Melandryini.

724. *Melandrya Fabr.*

Die Arten leben in verpilztem, morschem Holz, namentlich der Weissbuchen.

dubia Schall. Prásbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Szováta (c. a.); Bodzaer Gebirge (Agárka), Rosenauer Gebirge (Götzentempel, Deubel).

caraboides L. Hátszeg, Zibinsgeb., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Görgénygebirge, Dees (Bielz); Rosenauer Gebirge, Honigberg, Szurdok-Pass, Schässburg, Szováta (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

barbata F. (*flavicornis* Duft., *rufibarbis* Seidl. nec Schall.). Götzenberg (Bielz); Csukás (aus dem Holze einer gestürzten Rotbuche unter einem Schwamm herausgehauen, c. a.); Schässburg (einmal aus einem Weissbuchenstumpf, einmal aus Espenholz gewonnen, c. a.); Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

coerulescens n. sp. Schässburg (1 Exemplar Langheltgraben unter Espenrinde, ein 2. Exemplar Mühlenham aus einem verpilzten Weissbuchenstumpf, c. a.).

Melandria coerulescens n. sp.

Melandriae barbatae Fabr. proxima, colore, prothorace medio elytrisque non sulcatis et statura angustiore sat diversa. Nigra, palpi tarsorumque articuli ultimi testacei, elytra coerulescentia. Angusta, apicem versus haud ampliata. Frons dense subtiliter punctata medio fovea rotunda instructa. Antennarum articulus 3. quarto nonnihil brevior. Prothorax convexus, basi elytris vix angustior, lateribus usque ad medium parallelus, alinde ad apicem rotundato-angustatus, nitidus, modice punctatus, medio sublaevigatus, ante basin utrinque fovea subrotunda impressus. Elytra parallela, dense punctata, striata, haud sulcata, striis basin versus apice obsoleteioribus. Länge 10—11 mm.

Durch die schmale, parallele, nach hinten nicht erweiterte Körperform der *Melandria barbata* F. nahestehend, von ihr jedoch unterschieden durch noch schmälere Gestalt, durch schwarze Fühler, an denen höchstens die Spitze des letzten Gliedes heller ist, schwarze Beine mit rötlichgelbem dritten und vierten Tarsenglied, erst von der Mitte nach vorn verengtes Halsschild, dessen Mittellinie höchstens in der Mitte schwach geglättet ist, kürzere etwas rundliche, tiefe Basalgrüben am Halsschildhinterrand, weniger tief gestreifte bläulichschwarze Flügeldecken, deren Streifen gegen Basis und Spitze seichter werden, verschieden.

Verglichen mit *Melandria barbata* F. vom Csukás, *M. caraboides* L. von verschiedenen Fundorten und mit *M. dubia* Schall. aus Szováta. Zwei Exemplare, das eine jedoch nicht ausgefarbt, ganz braun mit bläulichem Schimmer auf den Flügeldecken, aber auch bei diesem sind Fühler und Beine bis auf die beiden letzten Tarsenglieder dunkelbraun gefarbt und nicht hellrotlichgelb, wie bei *M. barbata* F.

725. *Pryganophilus Sahlb.*

ruficollis F. Kerzer Gebirge (Bielz)

Osphrini.

726. *Osphyia Illiger.*

bi-punctata F. (= *clavipes* Oliv.). Kronstadt (Zinne), Mediasch, Klausenburg (Bielz); Reps (c. a.).

LXV. Lagriidae.

Lagriini.

727. *Lagria Fabr.*

atripes Muls. Hermannstadt (Bielz), Dees, Szamosújvár (Méhely); Bistritz (Deubel).

hirta L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf Gebüsch nicht selten.

Agnathini.

728. *Agnathus Germ.*

decoratus Germ. Hätzeg (Bielz).

LXVI. Alleculidae.

Alleculini.

729. *Allecula Fabr.*

morio F. Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay)

(Upinella.)

aterrima Rosenh. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Zood., Kronstadt, S. Regen (Bielz); Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

730. *Prionychus Solier. Eryx*

ater F. Salzburg, Hermannstadt, Hiltau, Zood. (Bielz); Schässburg Juli (Breite, unter der Rinde eines Eichenstumpfes, c. a.); Kronstadt (Hornissenmestl), Honigberg (angeflogen an einem Hause), Nussbach (im Walde unter Spänen, Deubel)

Fairmairei Reiche (laevis Seidl.). Marosgebirge (Ratosnya, Bielz)

731. *Hymenalia Mulsant.*

rufipes F. Erzgebirge (B. Holt), Kronstadt (Zinne), Nussbach, Kitzba (Bielz) Puj (bei Hätzeg, c. a.).

732. *Gonodera Mulsant.*

(Pseudocistela.)

ceramboides L. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Tömöser Pass, Freisch. S. Regen (Bielz); Nagyenyel (c. a.)

var. *serrata* Chev. Hosszufalu (Bielz); Előatak, Schässburg, Borzék (c. a.) Tusná, Büdös (Méhely), Bodnagel., Kronstadt, Nussbach (Deubel).

(*Gonodera* i. sp.)

luperus Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(*semira*.)

antennata Panz. Kronstadt (Bielz)

murina L. Hermannstadt, Kronstadt, Tömöser Pass, Klausenburg (Bielz), Rotenturm (c. a.), Erzgebirge (Müller)

a. *evonymi* F. Kronstadt (Zinne), Honigberg (Deubel).

a. *maura* F. Rosenauer Burgherg (Méhely); Puj (bei Hätzeg), Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. *thoracica* F. Kronstadt (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

733. *Mycetochara Berthold.*

Die Arten leben an Pilzen in altem Holz.

(*Mycetophila*.)

flavipes F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präste, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstädter Gebirge, S. Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Paringul (subalpin, Deubel)

axillaris Payk. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz)

var. *morio* Redt. Zalatna, Schässburg (Breite, auf Eichenschwämmen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(*Enolius*.)

humeralis F. (bi-punctata Htg.) Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzberg, Zool., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg, Mező-ész (Záh, Bielz); Szováta (c. a.), Klausenburg (Müller).

graciliformis Reitter. Zalatna, Paringul, Rejczat 3, 4, c. a., vidit Reitter

linearis Ill. Hätzeg, Poplaka, Resinar, Götzberg, Talmesch, Girelsau, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz), Hermannstadt (Ormay), Schässburg, Karlsburg, Brassen (c. a.).

pygmaea Redt. Kronstadt (Deubel), Hätzeg (c. a.).

Omophilini.**734. Podonta Mulsant.**

nigrita F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Gyergyó-Tölgyes, Nagyenyed (Ormay).

735. Cteniopnus Solier.

sulphureus L. Mühlbach (r. Berg), Neppendorf, Kronstadt (Zinne), Hargitta, Schässburg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kerzer Geb. (Ormay); S.-Regen (Müller).

a. *sulphuratus* Gmel. (bicolor F.). Kronstadt (Zinne, Méhely, Deubel).

736. Omophilus Solier.

(*Odontomophilus*.)

lepturoides F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Michelsberg, Götzenberg, Talmatschel, S.-Regen, Dees, Mezöség (Gyeke, Bielz); Alsó-Rákos, Karlsburg, Nagyenyed, Szurdok-Pass (Pilis, c. a.).

(*Omophilus* i. sp.)

rugosicollis Brull. Ober-Komana (Méhely, 11. Mai).

LXVII. Tenebrionidae.**Blaptini.****737. Blaps Fabricius.**

lethifera Marsh. (similis Latr.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

mortisaga L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

mucronata Latr. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

halophila Fisch. (*longicollis* Slev., *confusa* Men.). Kronstadt (Bielz); Karlsburg (c. a.).

Platyscelini.**738. Platyscelis Latreille.**

gages Fischer. Torda (Bielz). Klausenburg (Müller).

Pedinini.**739. Pedinus Latreille.**

femoralis L. Déva, Csib (Erzgebirge), Hammersdorf, Gross-Scheuern, Zood, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Rehó b. H., Nagyenyed (Remete), Gyógy (Bad, Ormay); Pilis (Nagyenyed), Karlsburg (an trockenen

Bergabhängen unter Steinen und im Grase, c. a.).

Opatrinl.**740. Melanimon Steven**

(*Microzoum* Redt.)

tibiale F. Kronstadt (Bielz).

741. Opatrum Fabricius.

sabulosum L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, an trockenen, sandigen Orten.

742. Opatroides Brullé.

punctulatus Brull. Szombat (Bielz).

743. Lichenum Blanchard.

pictum F. Hammersdorf (Bielz).

Crypticini.**744. Crypticus Latreille.**

quisquilius L. Im Berg- und Hügelland auf trockenen Grasplätzen.

Boletophaglinl.**745. Boletophagus Illig.**

reticulatus L. Durch das ganze Gebiet in Baumschwämmen.

interruptus Illig. Retjezat, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, Eichenschwamm, 1. Mai, c. a.).

armatus Panz. Rotenturm (Deubel).

746. Eledona Latreille.

agaricola Herbst. Hermannstadt, Reys, Kronstadt, Hosszufalu, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Marosújvár, Schässburg (in trockenen Eichenschwämmen, c. a.); Nussbach (Deubel).

Diaperini.**747. Scaphidema Redtenb.**

metallicum F. Hátszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Klausenburg, Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm (unter Baumrinden, c. a.).

748. Diaperis Müll.

An Baumschwämmen.

boleti L. Präsbe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Borszék, Bükszád, Mediasch, Schäss-

burg, S.-Regen, Borszék (Bielz), Balánbánya (c. a.); Hermannstadt, Szamosújvár (Ormay).

749. *Platydemia* Lap.

violacea F. (dytiscoides Rossi?). Gross-Scheuern (Bielz), Kronstadt, Klausenburg, Schässburg unter Baumrinden, Zwetschken, Maulbeerbaum), Rotenturm (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel); Bistritz (Müller).

Dejeani Lap. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsche, Ober-Seles, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszá, Schässburg (Bielz), unter der Rinde und an den Wurzeln alter Hollundersträucher, in morschem Eichenholz); Alsó-Rákos, Rotenturm, Szurdok Pass (c. a.), Sachs.-Regen (Müller).

750. *Arrhenoplita* Kirby.

(*Haplocephala* Laporte.)

haemorrhoidalis F. enl. Syst. Zibinsgeb., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszá (Bielz); Rotenturm, Bistra, Alsó-Rákos (in einem alten Buchenschwamm, c. a.).

751. *Alphitophagus* Stephens.

bifasciatus Say (= *pustulatus* Steph.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Karlsburg (c. a.); Bistritz (Müller).

752. *Pentaphilus* Latreille.

testaceus Hbllw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a., im Holze alter, kranker Eichen); Kronstadt (Deubel).

Ulomini.

753. *Hypophloeus* Fabr.

(*Corticeus* Crotch).

unicolor Piller (= *castaneus* F.). Unter Baumrinden durch das ganze Gebiet verbreitet.

(*Paraphloeus*.)

pini Panz. Retjezat, Borszék, Bergóor Pass (Bielz).

suturalis Payk. (= *ovittatus* Reitter). Siebenbürgen.

bicolor Oliv. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasz, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter der Rinde der Eiche und der italienischen Pappel, des Maulbeerbaumes, des Ahorns, c. a.).

fasciatus F. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.); Neustadt, Honigberg (Deubel).

linearis F. Kronstadt, Tómoser Pass (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Baassen (c. a.).

versipellis Baudi. Schässburg (Hainbuche, Oktober, c. a.).

754. *Caenocorse* Thomson.

Palorus Duval.

depressus F. Hätzeg, Zibinsgebirge, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz), Baumgarten (Ormay), Baassen, Alsó-Rákos, Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

755. *Tribolium* Mac Leay.

navale F. (= *ferrugineum* L.). Hermannstadt, Zood, Fogarasz, S.-Regen (Bielz).

756. *Melasia* Mulsant.

(*Uloma* Lap.

culinaris L. Hätzeg, Talmatschel, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Schässburg, Hargitta, Oláhfal, Kérol, Sachs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Perroudi Muls. Oláhfal, Kronstadt (c. a.); Zernest (Colius-Chalilor, Méhely).

757. *Alphitobius* Stephens.

piceus Ol. (= *diaperinus* Panz.) Zibinsgebirge, Bükszá (Bielz).

ovatus Hbst. (= *diaperinus* Muls., Seidl.) Klausenburg (Bielz).

testudineus Piller (= *chrysomelinus* Hbst.) Hätzeg, Zibinsgebirge, Csiker Gebirge (Bielz).

Tenebrionini.

758. *Menephilus* Mulsant.

cylindricus Hbst. (= *curvipes* F.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Talmatschel, Bükszá, Mezőség (Győr, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Pársaner Gebirge (Deubel).

759. *Tenebrio* Linné.

opacus Duft. Retjezat (Bielz), Schässburg (im trockenen, mehligem Holz einer alten Eiche in Mehrzahl, c. a.).

obscurus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

mollitor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

picipes Herbst. Salzburg, Hermannstadt, Kronstadt, Mezőség (Záh, Bielz), Hätzeg, Schässburg (c. a.); Brád (Ormay); S.-Regen (Müller).

760. *Bius Mulsant.*

thoracicus F. Kovászna (Juli 1893, beim Sägewerk Gyulafalva unter trockenen Fichten? oder Tannenrinne 2 Exempl., Deubel)

761. *Boros Herbst.*

Schneideri Panz. Kronstadt (in der Stadt im Fluge gefangen, Deubel).

Helopinae.

762. *Laena Latreille.*

viennensis Sturm (pimelia F.). Hätzeg, Heltau, Michelsberg, Kronstadt (Bielz).
Ormayi Reitter. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Königstein, Kronstadt, Tömöser Pass (Bielz); Schässburg, Borszék, Ratosnya, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Hermannstadt, Torockzó, Szováta, Szurduk-Pass (c. a.); Baumgarten, Michelsberg, Heltau, Gyógy (Bad), Felső-Orbó (Ormay); Klausenburg (Müller).

L. Reitteri Wse. wurde nicht in das Verzeichnis aufgenommen, da Bielz die **L. Ormayi** Reitter nicht kannte, welche die in Ungarn vorkommende **L. Reitteri** zu vertreten scheint.

Hopfgarteni Weise. Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (c. a.); Szurduk-Pass (Deubel).

763. *Enoplopus Solier.*

(*Acanthopus* Latr.)

velikensis Pillar (caraboides Petag, dentipes Rossi). Hätzeg, Déva, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Sächs.-Regen (Bielz); Hätzeg (an Eichenstümpfen, c. a., Deubel); Schässburg (c. a.).

764. *Helops Fabr.*

Helops hadius Redt. scheint irrtümlich in unser Verzeichnis aufgenommen worden zu sein, da Deubel erklärt, die Art nur in Herkulesbad gesammelt zu haben, nicht aber in Kronstadt. (*Stenomax.*)

Ianipes L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

(*Nalassus.*)

laevioctostriatus Goeze (striatus Geoffr. Fourcr., caraboides Panz.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz).

quisquilius Sturm (Fabricii Germ. Bielz). Hätzeg, Neudorf b. H., Holzmengen, Talmatschel, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mező-ég (Gyeke, Bielz). Kronstadt (Deubel).

picipes Küst. Kronstadt (Bielz).

Auch **Helops picipes** Küst. ist Deubel aus Kronstadt nicht bekannt; demnach ist das Vorkommen auch die er Art in Siebenbürgen zweifelhaft.

Phytophaga.

LXVIII. Cerambycidae.

Spondyliini.

765. *Spondylis Fabr.*

buprestoides L. Heltau, Bükszád (Bielz).

Prionini.

766. *Prionus Geoffroy.*

Auf Weidenbüsch.

coriarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

767. *Aegosoma Serville.*

scabricorne Scop. Erzgebirge (Guraszada, Bielz).

Lepturini.

768. *Rhagium Fabricius.*

sycophanta Schnrk (mordax F.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Holzmengen, Heltau, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Mező-ég (Záh, Bielz); Nagyenyel (an Eichen und auf Gebüsch in der Nähe alter Eichen, c. a.).

mordax Deg. Schielthal, Hermannstadt, Götzenberg, Präshe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Görgény (Bielz); Rotenturm, Bistra (Ormay); Szováta, Rodnagerbirge (c. a.).

(*Rhagium* s. str.)

bifasciatum F. Klausenburg (Bielz).

(*Hargium.*)

inquisitor L. In unseren Gebirgen auf Fichten.

769. *Rhamnusium Latreille.*

bicolor Schnrk. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Klausenburg, Mező-ég (Záh, Bielz); Rodnagerbirge (Kiságyatak, Deubel).

770. *Xylostens Fivaldszky.*

Spinolae Friv. Präshe, Kronstadt (Zinne, Zaison, Kirchgärten an einer alten Fichte, Scheeser, c. a.); Königstein (Propaster Schlucht an den Steinwänden und auf Buchen), Görgénygeb. (Bielz); Rodnagerbirge (Teszla, Deubel).

771. *Oxymirus Mulsant.*

- cursor* L. Retezat, Zibinsgebirge, Kerzer, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Bistra, Frecker Gebirge (Serbota); Schässburg (auf trockenem, abgestorbenen Holz, Reissig etc., c. a.).
var. Verneuli Muls. Rodnagebirge (Deubel).

772. *Stenochorus Fabr.*

- (*Stenochorus s. str.*)
meridianus L. Durch das Berg- und Hügel-land verbreitet.
 (An-orus.)
quercus Goetz. Gross-Pold, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Târl (Inter-weissenburger Komitat, Ormay).

773. *Pachyta Stephens.*

- lamed* L. Kerzer, Fogarascher, Kronstadter Gebirge, Bükszad, Csiker Geb., Gyergyó (Bielz); Balanbánya (Deubel); Bistra (Ormay, c. a.); Marosgebirge (Müller).
quadrimaculata L. (bisbisi-gnata Bielz). In unseren Gebirgen verbreitet.
a. bimaculata Schönh. Bistra (c. a.); Hatzeger Gebirge, Lunka negra (Deubel).

774. *Evodinus Leconte.*

(Brachyta Fairmaire.)

- clathratus* F. Zibins-Gebirge, Präsbe, Retezat, Frecker Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadter Gebirge, Hosszufalu (Bielz); Malonviz, Schulergebirge (c. a.); Götzenberg, Bistra (Ormay); Rátosnya (Müller).
var. brunnipes Muls. (nigrescens Grell.). Präsbe, Kronstadter Gebirge (Bielz).
var. reticulata F. Kronstadt (Zinne, Deubel).

775. *Acmacops Leconte.*

- pratensis* Laich. Zibinsgebirge (Tomnatik, Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Bistra (Ormay).
septentrionis Thoms. Gyulafalva, Papolezu hegység, Mehely; Kronstadt (Hange-stein, Deubel).
 (Dinoptera.)
collaris L. Durch das ganze Gebiet ver-breitet, auf blühenden Pflanzen.

776. *Gaurotes Leconte.*

- virginea* L. (nigricollis). In un-seren Gebirgen verbreitet.
excellens Brancsik. Siebenbürgen (Catalog. col. Europ. etc. 1906, p. 505).

777. *Cortodera Mulsant.*

- femorata* F. Kronstadt (Hangestein, Deubel).
humeralis Schall. Léva (Bielz); Hätzeg Bergabhang oberhalb der Bahnstation Hätzeg-Varalja, c. a.; Vapla-Hunyad (Deubel).
a. suturalis F. Schässburg (c. a.).
holoserica F. Klausenburg (Bielz).

778. *Pidonia Muls.*

- lurida* F. Durch das ganze Gebiet ver-breitet.
a. Ganglbaueri Ormay. Mit der Stamm-form.

779. *Nevellia Mulsant.*

- sanguinosa* Gyll. Malonviz (Lunka negra, Deubel); Rodnagebirge (Scheoser).

780. *Leptura Linné.*

- (Anoploclera.)
rufipes Schall. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).
sexguttata F. Kronstadt (Bielz); Schäss-burg Fuchslotz auf Schirmblüten; Vargyas Almäser Höhle (Deubel).
a. exclamationis F. Neudorf, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kron-stadt (Deubel).
nigroflava Fuss. Zibinsgebirge (Busch, Bielz).
 (Vadonia.)
unipunctata F. Fogarasch, Csiker Geb., S.-Regen (Bielz).
 Ormay (Adatok Erdély bogárfaunájához, 1888) bemerkt in der Fussnote p. 46, es sei im Bielz'schen Verzeichnis statt *L. unipunc-tata* F. „*impunctata* F.“ zu setzen, ohne jedoch seine Notiz näher zu begründen. Welche Art er mit *L. impunctata* F. meint, kann ich nicht enträtseln mit Hilfe der mir zu Gebote stehen-den Literatur; vielleicht *L. tessellata* Chap. *var. impunctata* Heyden nec F., die bei uns auch vorkommen soll?
bisignata Brull. Mediasch, S.-Regen (Bielz).
livida F. Hermannstadt, Kronstadt, Bük-szad, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.).
var. bicarinata Arnold. Hammersdorf (Or-may).
 (Leptura i. sp.)
erythroptera Haggenb. Zood, Csiker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Nussbach (c. a.).
rufa Brull. Kerzer Gebirge (Bielz).
maculicornis Deg. Zibinsgebirge, Foga-rascher Gebirge, Marosgebirge, Kron-stadt (Bielz), Retezat, Balanbánya (c. a.).
 ? *tessellata* Chap. Siehe die Note oben!

rubra L. (testacea L., rubrotestacea Ill.). In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

scutellata F. Zibinsgebirge, Dusch, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád, Tusná, Schässburg, Marosgebirge, Malomviz, Rotenturm, Nussbach, Rodnagebirge.

var. **ochracea** Faust. Bodzaer Gebirge (Agárka, Magura), Sósmező (Méhely und Deubel); Vargyas bei der Almáser Höhle zusammen mit der Stammform (Deubel).

var. **ochraceipennis** Pic. Bükszád (c. a.).

virens L. In unseren Gebirgen verbreitet.

sanguinolenta L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Predeal, Oláhfal, Gyergyó, Borszék, Rodnagebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Bistra, Retjezat, Balámbánya (c. a.).

dubia Scop. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tusná, Gyergyó, Borszék, Maros-Gebirge, Rodna-Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Bistra, Balámbánya (c. a.).

a. **chamomillae** F. Retjezat (c. a.).

(Pachytodes.)

cerambyciformis Schrnk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **transsylvanica** Csiki.

erratica Dalm. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh), Hammersdorf, Stolzenburg (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Torockó (c. a.); Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

(Judolia.)

sexmaculata L. Kronstadt (Bielz); Bistra (Ormay, c. a., auf Schirmpflanzen); Borszék (c. a.); Nagygyimás, Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

(Sphenalia.)

revestita L. Gross-Pold (Bielz); Hátszeg (Bergabhang oberhalb der Station Hátszeg-Váralja, c. a.); Kronstadt (Zinne, von Haselgesträuch geklopft, Deubel).

pubescens F. Zibinsgebirge (Bielz); Götzenberg b. Hermannstadt (Albrecht).

nigripes Deg. Klausenburg (Bielz).

aurulenta F. Zibinsgebirge, Kerzer, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Dongókő, Bükszád, Oláhfal, Schässburg (Bielz).

quadrifasciata L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

maculata Poda. Retjezat, Zibinsgebirge, Talmatschel, Kerzer Geb., Kronstadt, Dongókő, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge, Rodnageb. (Bielz); Rotenturm, Malomviz (c. a.).

arcuata Panz. Präsbe, Talmatschel, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád, Mediasch, Oláhfal, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

aethiops Poda. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Marosgeb.,

Hermannstadt, Michelsberg (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyas (Almáser Höhle, Deubel).

melanura L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

bifasciata Müll. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

nigra L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

septempunctata F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Rotenturm, Malomviz, Schässburg, Baassen (c. a.); Vargyas (Almáser Höhle, Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

a. **quinquesignata** Küst. Hátszeg (Deubel).

(Typocerus.)

attenuata L. Hermannstadt, Neudorf, Talmatschel, Leschkirch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfal, Sächs.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Frecker Geb. (Serbota), Rotenturm (c. a.); Vargyas (Almáser Höhle, Deubel).

781. *Allosterna Mulsant.*

tabacicolor Deg. (chrysomeloides Schrank.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

782. *Grammoptera Serville.*

ustulata Schall. Heltan, Götzenberg (Bielz); Schässburg (c. a.).

ruficornis F. Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Szurdok-Pass (c. a.).

variegata Germ. (femorata Muls.). Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Honigberg (Altfluss, Deubel).

Necydalini.

783. *Necydalis Linné.*

major L. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a., Lazareth); Salzburg (Ormay); Kovászna (an Weidenbäume angellogen), Kronstadt (aus Löchern alter Weiden, Deubel); S.-Regen (Müller).

ulmi Chev. (Panzeri Harold). Karlsburg, Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

784. *Caenoptera Thomson.*

minor L. Hermannstadt, Girelsau, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Birtühn, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Schulergebirge, Rodnagebirge, Szurdok-Pass (auf Fichtenholz, frisch geschnittenen Brettern, c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

(Linonius.)

umbellatarum Schrb. (minima S o.) Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S-Begen, Mező-ék Gyeké (Bielz), Baussen, Szováta, Borszék (c. a.).

Kiesenwetteri Muls. Schässburg (c. a.), Vajda-Hunyad, Deubel (c. a.), unter den Weingärten von Reiszg geklopft.

Cerambycin.

785. *Stenopterus Stephens.*

flavicornis Küst. Mühlbach, Klausenburg (Bielz).

rufus L. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, S-Begen, Hätzeg, Nussbach, Schässburg (Bielz); Szováta, Baussen (c. a.); Remete (Nagyenyed Ormay); Zernest (Deubel).

ater L. (praecustus F.). Hermannstadt (Bielz).

786. *Dilus Serville.*

fugax Oliv. Gross-Pold, Gross-Scheuern, Götzenberg (Bielz); Schässburg (auf blühender Euphorbia cyparissiae, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Rossau, Vargyas, Almásér Höhle, Deubel (c.).

787. *Callimus Mulsant.*

angulatus Schrank. Zibinsgebirge, Csiker Gebirge, Balánbánya (Bielz).

788. *Othrium Curtis.*

cantharinum L. Baróth (Méhely).

brunneum F. Héviz, Kronstadt, Klausenburg (Bielz), Betezat, Schussengebirge (c. a.), Zernest (Cepetana, Deubel).

789. *Cerambyx Linné.*

cerdo L. (heros Scop.). Durch das ganze Gebiet in Eichenwäldern.

miles Bon. Gross-Pold, Hermannstadt (Bielz).

Scopoli Füssl. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

790. *Saphanus Serville.*

piceus Luch. Götzenberg, Kronstadt, Klausenburg (Bielz), Betezat, Rotenturm (auf Rotbuche, c. a.), Vargyas, Almásér Höhle, abends an den Lichtfangapparate angefliegen, Deubel).

791. *Crioceraphus Mulsant.*

rusticus L. Talmatschel, Kronstädter Gebirge, Bükszád, Olábfalu, Marosgebirge (Bielz), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Balánbánya (c. a.), Nagybagymás, Kovasza, Gyutafalu, Deubel).

792. *Asemum Eschscholtz.*

striatum L. Hätzeg, Talmatschel, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay), an Kieferstämmen und deren Wurzeln).

793. *Tetropium Kirby.*

castaneum L. Bistra (c. a.).

var. **luridum** L. Zibinsgebirge, Gurariu, Práshe, Sterpu, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge, Bihar-Geb. (Bielz), Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. **fulcratum** F. Zool, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bozner Pass, Görgény, Marosgeb. (Marosnya, Bielz); Schanta (Ormay); Borszék, Balánbánya (c. a.).

var. **aulicum** F. Zibinsgebirge, Práshe, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge (Bielz), Balánbánya, Pálingu, Borszék, Rohingebirge (c. a.).

fuscum F. Bistra (2 Ex., c. a.); Schussengebirge, Königstein, Koltra, Chihler, Deubel.

794. *Anisarthron Redtenb.*

barbipes Schrank. Rotenturm (Ormay, Juli); Bistritz Müller; Heltau an einer lebenden Buchenhecke, Abrecht.

795. *Phymatodes Mulsant.*

(Lioderes.)

Kollari Redtenb. Kronstadt (Zinne, von Bäumen geklopft, auch auf Blumen, Deubel, c. a.).

(Protocallidium.)

angustus Kriechb. (Borszék, Ormay); Tusnád (Méhely); Bereczk im Olyoz Tal bei der Säge auf Brettern, Deubel).

(Phymatodes Muls.)

glabratus Charp. Klausenburg (Bielz)

pusillus F. abdominalis Bon.). Hammersdorf, Rezs (Bielz)

testaceus L. Hermannstadt, Sachs.-Begen (Bielz, auf Eichenholz); Schässburg (c. a.).

a. **variabilis** L. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, S-Begen, Bistritz, Mezőség Gyeké (Bielz); Salzburg, Nagyenyed (Ormay).

a. **similaris** Küst. Schässburg (c. a.).

a. **praecustus** F. Kronstadt, Schässburg (c. a.).

(Poecium.)

alni L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Schässburg, S-Begen, Dees, Mező-ék Gyeké (Záh, Bielz); Nagyenyed (Ormay); Sanyokszék (c. a.).

rufipes F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Sachs.-Begen, Dees, Mező-ék Gyeké (Záh, Bielz).

Reps, Klausenburg, Schässburg
(Scheneberg), von Zwetschenbäumen
geklöpft, c. a.).

796. *Pyrrhidium Fairmaire.*

sanguineum L. In Eichenwäldern durch das ganze Gebiet.

797. *Callidium Fabr.*

aeneum Deg. Zibinsgebirge (Mai, Ormay);
Schulergelbige, Schässburg, Klausen-
burg (c. a.).

violaceum L. In unseren Gebirgen und
im Bergland verbreitet.

coriaceum Payk. Präshe (Bielz); Busees
(c. a.); Egyeső bei Balánbánya, Ko-
vászna (Deubel).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu
streichen.

798. *Semanotus Mulsant.*

undatus L. Kerzer Gebirge, Kronstadt,
Schässburg (2 Ex. im Zimmer, wohl
vom Brennholz, 1. März, c. a.); Schu-
ler-Gebirge (an das Schutzhaus ange-
flogen, Deubel).

799. *Hylotrupes Serville.*

bajulus L. Hätzeg, Salzburg, Hermann-
stadt, Neudorf b. H., Fogarasz, Kron-
stadt, S.-Regen (Bielz); Frecker Geb.
(Serbota), Karlsburg, Torockó, Abud-
bánya (c. a.); Kerzer Gelbige, Gyógy
(Bad), Nagyenyed (Ormay).

800. *Rhopalopus Mulsant.*

hungaricus Herbst. Klausenburg (Bielz).
clavipes F. Hermannstadt, Grossscheuern,
Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kron-
stadt, Mediasch, S.-Regen, Dees, Me-
zőség (Gyeke, Záh, Bielz); Roten-
turm (Ormay); Klausenburg, Retjezat,
Schässburg (Hennberg auf Zwetschen-
holz, c. a.).

macropus Germ. Hermannstadt, Gross
Scheuern, Hammersdorf, Holzmeugen,
Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen
(Bielz); Rotenturm (Ormay); Schäss-
burg, Szurdok-Pass, Klausenburg (c.
a.); Nagyhagymás (Deubel).

femoratus L. Heltau (Bielz); Vajda-Hunyad
(Deubel).

801. *Rosalia Serville.*

alpina L. Retjezat, Schielthal, Zood, Ker-
zer Gebirge, Arpascher Gebirge, Vister
Tal, Kronstadt, Tusnád, Marosgebirge,
Dees, Bolkatsch (Bielz); Remete (Nagy-
enyed), Szamosujvár, Baassen (Or-
may); Rotenturm, Malomváz (auf ge-
fälltem Rothbuchenholz), Schässburg (c.
a.); S.-Regen (Müller).

a. **prolongata** Reitter. Siebenbürgen.
a. **transsylvanica** Csiki Siebenbürgen.

802. *Aromia Serville.*

moschata L. Im Berg- und Hügelland ver-
breitet.

803. *Purpuriceums Fischer.*

Kaehleri L. Broos (Rumes), Grossscheuern,
Hammersdorf, Neudorf b. H., Girelsau,
Fogarasz, Mediasch, Schässburg (auf
Buche), S.-Regen (Bielz); Salzburg,
Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay);
Haschag (Haschagen), Karlsburg (c. a.).

Clytini.

804. *Plagionotus Mulsant.*

detritus L. Karlsburg, Mühlbach, Zood,
Gross-Schenk, Fogarasz, Kronstadt,
Tartlau, Seps-Sz.-György, Mediasch,
Schässburg, Sächs.-Regen, Dees (auf
Eichenholz, Bielz).

arcuatus L. Durch das ganze Gebiet in
Eichenwäldern.

floralis Pall. Hermannstadt, Grossscheuern,
Hammersdorf, Neudorf b. H., S.-Regen,
Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg
(Juli, auf Schirnbüthen, c. a.).

805. *Xylotrechus Chevrolat.*

rusticus L. Götzenberg, Zood, Präshe,
Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen,
Mezőség (Gyeke, Bielz); Resinar, Ro-
tenturm (Ormay); Nussbach, Schäss-
burg, Bistra (c. a.); Hätzeg (Deubel).

pantherinus Saven. Siebenbürgen (Catalo-
gus col. Eur. p. 513).

arvicola Oliv. Hätzeg (Bielz); Zibinsge-
birge (Ormay).

antelope Zeit. Kronstädter Geb., Schu-
lergebirge (Bielz); Schässburg (auf
Achillea millefolium, c. a.).

806. *Clytus Laicharling.*

tropicus Panz. Hermannstadt, Neudorf, S.-
Regen (Bielz); Schässburg (von einem
Schüler gesammelt, c. a.); Kronstadt
(Deubel).

arietis L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Ham-
mersdorf, Zood, Kronstadt, Hosszu-
falu, Mediasch, Schässburg, Olábfalu,
S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg,
Rotenturm, Marosujvár (auf Blüten, c.
a.).

a. **gazella** F. S.-Regen (Bielz).

tama Muls. Schanta (7. August, Ormay);
Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.);
Papoly, Keresztény-Gebirge (Méhely);
Schulergelbige (Deubel).

rhannl Germ. Neudorf, Zood. Fogarasz, Kronstadt (2), Wolkendorf (b. Kr., Tarlau, Tuszna, Mediasch-Bielz), Radosnya (Müller)

a. **lemesiensis** Germ. Neudorf, Zood. Gross-Schenk (Bielz)

807. *Cyrtoclytus Ganglb.*

capra Germ. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Zood. Kerzer Gebirge, Klausenburg (Bielz). Retezat, Nussbach (c. a.); Vargastal (bei der Almäser Hölle, Deubel, c. a.); Csukás (Deubel, Maroscelinge Müller)

808. *Glythanthus Thomson.*

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen.

varius F. (verbasco L., ornatus Herbst) In Berg- und Hügelland verbreitet.

Herbsti Brahm (verbasco F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

sartor F. (massiliensis L.) Mühlbach, Salzburg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Nagyenyed, Baassen (c. a.); Kovászna (Deubel).

figuratus Scop. Hätzeg, Gross-Scheuern, Girelsau, Talmatschel, Marpod, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Karlsburg, Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay).

speciosus Schneid. Hätzeg, Karlsburg, Mühlbach, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezöség (Záh, Bielz); Salzburg, Gyógy (Ba, Ormay); Puj (b. Hätzeg), Topánfalva (c. a.).

809. *Anaglyptus Mulsant.*

mylicus L. Gross-Scheuern, Michelsberg, Götzenberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Tuszna, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Hammersdorf, Rotenturm (Bielz); Szurdok-Pass, Malomviz, Szunyokszék (b. Kr., c. a.).

a. **hieroglyphicus** Herbst. Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Hammersdorf, Rotenturm, Reschinar, Karlsburg (c. a.)

Lamini.

810. *Neodorcadion Ganglb.*

Die Art lebt auf kieseligen Grashoden, Hutweiden, auf Salzboden.

bilineatum Germ. Déva, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasz, Repe, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Marosnyvár, Kalán, Karlsburg (c. a.), Salzburg (Albrecht)

811. *Dorcadion Dalman.*

Die Arten leben auf Grashoden, namentlich Hutweiden.

aethiops Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

fulvum Scop. Mühlbach, Hammersdorf, Repe, Klausenburg, Torda, Mezöség (Gyke, Záh, Bielz).

Murrayi Küst. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasz, Repe, Kronstadt, Mediasch (Bogeschdorf), Schässburg, Dees (Bielz), Pils-Nagyenyed, Kalán, Karlsburg (c. a.).

Scopoli Herbst. Mühlbach, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasz, Mediasch, Mezöség (Gyke, Záh, Bielz); Marosnyvár, Klausenburg, Schässburg, Kalán (c. a.); Hermannstadt, Szamosnyvár (Ormay); Honigberg (Altfluss, Deubel)

decipiens Germ. Hätzeg (Bielz)

arenarium Scop. Hammersdorf, Örmény-szék (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Fogarasz (Ormay).

Sollte hier nicht etwa eine Verwechslung vorliegen mit *D. pedestre* var. *gogium* Thomson, da an diesen Orten auch viele andere gesammelt haben?

equestre Laxm. Hermannstadt, Rotenturm (Bielz)

a. **transsylvanicum** Ganglb. Wohl an denselben Lokalitäten.

pedestre Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **austricum** Ganglb. (modif. Redtenb.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Salzburg b. Hermannstadt (Deubel), Kalán (c. a.)

var. **gogium** Thomson. Schässburg, Kalán (c. a.); Salzburg bei Hermannstadt (Deubel)

812. *Morimus Serville.*

Man findet die Arten unter Baumstämmen und Holzstücken.

funereus Muls. Hätzeg, Karlsburg, Reschinar, Götzenberg, Prasbe, Kerzer Gebirge, Fogarasz (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Marosvásárhely (Müller)

asper Sulz. Karlsburg (Bielz, c. a.).

813. *Lamia Fabricius.*

textor L. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Freck, Kronstadt, Mediasch, Oláhfalva, Gőrgény, Klausenburg (Bielz); Michelsberg, Reschinar, Miriszo (Unterweissenburger Komitat), Tinó (Unterweissenburger Kom., Ormay); Borszék, Karlsburg (c. a.).

814. *Monachamus Curtis.*

Die Arten leben auf gestürzten Fichten, fliegen bei Sonnenschein gern an den Holzvorräten der Sägemühlen an; doch finden sie sich auch auf anderen Holzarten, z. B. Buchen.

Mulsanti Sdl. Paringul. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Bistra, Rodnagebirge, Borszék (c. a.).

sutor L. Zibinsgebirge, Dusch, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Sepsiszentgyörgy, Mediasch, Marosgeb., Borszék, Gyergyó (Bielz); Bistra (Ormay).

Die ♂♂ unseres *M. sutor* besitzen auf den Flügeldecken in der Regel nur sehr spärliche, kleine, weisse Haarflecken, namentlich an den Seiten und auf der Spitze, reichlicher finden sie sich bei den ♀♀, vollständig scheinen sie nie zu fehlen. Doch besitzen beide Geschlechter einen dunkelbraunen Toment, der bei der Stammform weniger bemerkbar ist, da die Härchen zerstreut sind; bei der Varietät *fuscomaculatus* jedoch sind die Härchen, wie bei *M. saltuarius*, zu zahlreichen grösseren und kleineren Flecken (Bürstenflecken) verdichtet, im übrigen haben die Tiere ganz die Körperform, Grösse und Flügeldeckenskulptur des typischen *M. sutor*, können also nicht mit *M. saltuarius* verwechselt werden. (Vielleicht passt auf diese Varietät *Lamia sutor* Cederh.) Bemerkenswert ist ein sonst normales Exemplar von der Bistra, welches deutlich geteilten Scutellartoment; sehr spärliche kleine Flecken auf den Flügeldecken und nur fein verteilten braunen Toment, aber einen ebenso deutlichen, tiefen Quereindruck im ersten Drittel der Flügeldecken besitzt wie *M. Mulsanti*; ich bezeichne sie als Kreuzungsform zwischen *M. Mulsanti* und *sutor* mit den wesentlichen Merkmalen des letzteren, *M. sutor* v. *hybrida*.

var. **fuscomaculatus** n. Rodna-Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota). Bistra, Borszék (c. a.).

var. **hybrida** n. Bistra (c. a., ♂).

galloprovincialis Oliv. Gyergyó, Borszék (Bielz); Bistra (Ormay).

var. **nitidior** Abeille. Bistra (c. a.).

saltuarius Gebl. Rodnagebirge (Bielz); Zernest (Plaju foi, Deubel).

815. *Acanthoderes Serville.*

clavipes Schrank. Zibinsgebirge, Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Nussbach, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Retjezat, Rodnagebirge, Rosenau (c. a.).

816. *Acanthocinus Stephens.*

Die Arten leben auf gefälltem Holz, Reisig etc.

aedilis L. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Tushád, Girku, Kronstadt, Schässburg, Marosgeb., Marosujvár (Bielz); Rodnagebirge (Valea Vinului), Nagyhagymás (Deubel).

griseus F. Mediasch, Görgény, Marosgebirge (Bielz); Bistra, Borszék (c. a.); Kronstadt, Bodzaer Gebirge, Kovászna (Gyalafalva, Deubel).

817. *Liopus Serville.*

nebulosus L. Hermannstadt, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Szt.-György, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Biassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay, auf Eichenholz und Reisig, Reisigzäunen).

818. *Hoplosia Mulsant.*

fennica Payk. Kronstadt (Zinne, Deubel, Méhely); Schässburg (c. a.); Tordaer Schlucht (Deubel).

819. *Exocentrus Mulsant.*

adpersus Muls. Fogarasch, Héviz, S.-Regen (Bielz); Malomviz, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hátszeg (Deubel).

lusitanus L. (*balteatus* Gyll.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Arpascher Gebirge, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Stierlini Ganglb. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Hátszeg (Deubel).

820. *Pogonochaerus Gemminger.*

Die Arten leben auf gefälltem Holz, Reisig etc.

hispidulus Pfl. (*bidentatus* Thomson). Klausenburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel); Szurdok-Pass, Rotenturm, Schässburg (c. a.).

Eugeniae Ganglb. Kronstadt (Deubel, auf Fichten-Scheitholz).

hispidus L. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Stolzenburg, Mezőfele (Torda), Maros-Ludas (Ormay); Alsó-Bákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

fasciculatus Degeer. Zibinsgeb., Stirpu, Csik, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

ovalus Goeze. Kronstadt, Wolkendorf (Deubel).

821. *Deroplia Rosenhauer.*

(*Belodera* Thomson.)

Genei Arag. Hermannstadt, Michelsberg (Bielz).

822. *Haplocnemis Stephens.*

(*Mesosa* Serville.)

curculionoides L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neu-Forst b. H., S.-Szt.-György, Mediasch, Schässburg, Bistritz, S.-Regen (Bielz); Nagyenvel, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt, Tartlau, Präsbe (Deubel).

nebulosa F. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Kronstadt, Bozsufán Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Klausenburg (Bielz). Szunyoksék b. Kr., Szurduk-Pass (c. a.). Hatzeg (Deubel).

823. *Anaesthetis Mulsant.*

testacea F. Hatzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, Sachs-Regen, Mező-ék Gyeké, Bielz, Betjezat, Klausenburg, Szunyoksék b. Kr. (c. a.); Salzburg (Ormay).

824. *Calamobis Guérin.*

filum Rossi (gracilis Creutz Klausenburg (Bielz)).

825. *Agapanthia Serrille.*

asphodeli Latr. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch (Bielz).

Dahli Richter G. L. utali Ganglb., Carlui F. S. Regen, Mező-ék Gyeké, Klausenburg (Bielz), Bistritz, Meller, Szamosújvár (Ormay), Schässburg (c. a.), Kronstadt (Deubel).

villasoviridescens Degeer lineatocollis Don Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Güelsau, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz), Resinar, Zibinsgebirge, Szamosújvár (Ormay), Bassen (c. a.), Kronstadt (Deubel).

maculicornis Gyll. Kronstadt? (Bielz), Kerzer Gebirge, Stina ursula, Ormay.

violacea F. (cyanea Hbst.) Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Klausenburg (Möller), Mriszlo (Unterwiesenburg), Komita, Mühlbach (Ormay); Torda (Deubel); Vajda Hunyad (Deubel, c. a.). (Calamobidomorphus.)

leucaspis Stév. Klausenburg (Bielz), Schässburg (c. a.).

826. *Saperda Fabricius.*

(Ametere.)

carcharias L. Nagyg, Hermannstadt, Heltau, Gützenberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz), Schässburg (auf Espen, c. a.), Szamosújvár (Ormay).

(Amilia.)

similis Laich. Gross-Schenk (Scheeser).

(Compidia.)

populnea L. Hammersdorf, Botberg (b. H.), Fahmesch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz), Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

(Saperda i. sp.)

scalaris L. Hermannstadt, Hammersdorf, Präsche, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge,

Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz), Gützenberg, Zibinsgebirge, Rosenturm (Ormay); Schässburg, Szurduk-Pass (in Eichenholz, c. a.).

perforata Pall. Fogarasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

(Argia.)

8-punctata Scop. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

827. *Menesia Mulsant.*

bipunctata Zoubk. Hammersdorf, Mediasch, Sachs-Regen, Klausenburg (Bielz).

828. *Tetrops Stephens.*

praeusta L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

a. *nigra* Kr. Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg, Szurduk-Pass, Retjezat (c. a.).

829. *Stenostola Mulsant.*

hirsutula Fröl. Déva, Klausenburg (Bielz), Kronstadt (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Szurduk-Pass, Retjezat (c. a.); Klausenburg, Bistritz (Müller).

830. *Pilemia Fairmaire.*

hirsutula Fröl. Déva, Klausenburg (Bielz). *tigrina* Mulsant. Dees, Mező-ék Gyeké Záh, Bielz).

831. *Phytoecia Muls.*

(Cardoria.)

scutellata F. Hermannstadt (A. B.), Mező-ék Gyeké, Záh, Bielz); Nagyenyel (Ormay).

(Miria.)

Argus Fröl. Kronstadt, Honigberg (Altfluss, Deubel).

rubropunctata Goeze. Mühlbach (c. B.), Hammersdorf (Bielz).

Deubel teilt mir, dass er diese Art in Kronstadt nicht gesammelt habe, der Fundort Kronstadt daher zu streichen sei.

affinis Harzer. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Güelsau, Marpol, Kronstadt, Unterkarz, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Sachs-Regen (Bielz); Karlsburg, Szurduk-Pass (c. a.).

(Phytoecia i. sp.)

virgula Charp. Hatzeg, Gross-Scheuern, Mediasch, Mező-ék Gyeké, Záh, Bielz); Schässburg, Karlsburg, Előpatak (c. a.), Bistritz, Forzburg (Deubel).

pustulata Schrank. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mező-ék Gyeké, Záh, Bielz); Schässburg, Vajda Hunyad (c. a.), von mehreren Pflanzen durch Kotschern erhalten; Kronstadt (Deubel).

rufimana Schrank. Klausenburg, Mező-ék Gyeké, Záh, Bielz), Karlsburg (c. a.).

- ephippium** F. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Rotenturm, Marpod, Fogarasch, Klausenburg, Mezöség (Záh, Bielz); Szováta, Marienburg, Schässburg (c. a.).
- geniculata** Muls. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).
- cylindrica** L. Mühlbach, Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Melisch, Mezöség (Gycke, Záh, Bielz); Stolzsburg (Ormay); Schässburg, Baassen, Marienburg b. Sch., Szováta (c. a.).
- nigricornis** F. Gross-Pold, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinn, Deubel); Borszék, Szidukpass (c. a.).
- (Opil.)
- caerulescens** Scop. (virescens F.). Hätzeg, Rotenturm, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Borszék, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg, Bistritz (Müller).
- a. **obscurus** Bris. Schässburg (Siechhofberg, 25. Mai gekötschert, c. a.).
- uncinata** Redtenb. Schässburg (c. a., Fuchslotz von einer Hecke geklopft).
- molybdaena** Dalm. Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz).

832. *Oberea Mulsant.*

- pupillata** Gyll. Klausenburg, Mezöség (Záh), Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (auf *Lonicera* häufig), S.-Regen (Müller).
- oculata** L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (von einer alten Weide geklopft), Schässburg (Mühlentham von Weibenschösslingen geklopft, Diesö-Szent-Márton (c. a.).
- linearis** L. Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gross-Schenk (Bielz); Kronstadt (Ragado-Eck, Baassen, Schässburg (Postland, von Weibenschösslingen geklopft, c. a.); S.-Regen (Müller).
- euphorbiae** Germ. Gross-Pold, Marpod (Bielz).
- erythrocephala** Schrank. Hätzeg, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Wolkendorf Grund, von Euphorbia myrsinoides gekötschert, c. a.); S.-Regen (Müller).

LXIX. Chrysomelidae.

Eupoëae.

Donaciini.

833. *Donacia Fabricius.*

- crassipes** F. S.-Regen (Bielz); Nagybagynás (Deubel).

- semicuprea** Panz. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Marosújvár (Ormay).
- dentata** Hoppe. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- versicolorea** Brahm. Hermannstadt (Bielz).
- Malinovskyi** Ahr. Honigberg (Altluss, Deubel).
- aquatica** L. Gross-Scheuern, Hahnbach, Branisch-Wald, Unter-Kerz, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
- brevicornis** Ahr. Hermannstadt (Bielz).
- impressa** Payk. Mediasch, S.-Regen (Bielz).
- marginata** Hoppe. (Hnbala Panz.). Gross-Scheuern, Branischwald, Tartlau, Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- bicolora** Zschach. Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
- obscura** Gyll. Mediasch (Bielz).
- antiqua** Kunze. Kronstadt (Deubel).
- thalassina** Germ. Gross-Scheuern, Branisch-Wald (Bielz); Klausenburg (bot. Garten, Müller).
- vulgaris** Zschach. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.).
- simplex** F. Gross-Scheuern, Branischwald (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- cinerea** Herbst. Zool., Mezöség (Gycke, Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

834. *Plateumaris Thomson.*

- sericea** L. Hermannstadt, Neudorf, Kronstadt, Bistritz, Mezöség (Gycke, Bielz); Schässburg (c. a.).
- discolor** Panz. Kerzer Gebirge, Mezöség (Gycke, Bielz); Klausenburg (Deubel).
- braccata** Scop. Klausenburg (Bielz); Szováta (c. a.); Mezö-Záh (Deubel, c. a.).
- consimilis** Schrank. Neudorf b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Klausenburg, Rejczat, Balánbánya, Rodnagebirge, Szováta (c. a.).
- var. **variabilis** Kunze. Bucsecs, Bodzaer Gebirge (Méhely).
- affinis** Kunze. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Honigberg (Altluss, Deubel).

Orsodacnini.

835. *Orsodacne Latreille.*

Die Tiere leben auf Gesträuch.

- cerasi** L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Klausenburg, Zibinsgebirge (Bielz); Bor-

- szék, Schulergebirge, Bistra, Rejezat (c. a.); Kronstadt (Deulel).
- a. *limbata* Ol. Schässburg, Hévez (Bielz); Kronstadt (Deulel).
- a. *glabrata* Panz. Kronstadt (Deulel).
- a. *cantharoides* F. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deulel).
- a. *Duftschmidli* Ws. glabrata F.; Zibinsgelege (Ormay, auf Sparac); Kronstadt (Deulel).
- lineola* Panz. (nigriceps Latr.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (von Schlehe geklopft, c. a.); Klausenburg (Bielz).
- a. *nigricollis* Oliv. Gross-Scheuern, Kronstadt (?) (Zinne, Bielz).
- a. *coerulescens* Duft. Hermannstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf Schlehe, c. a.).

836. *Zengophora Kunze.*

- subspinosa* F. Grossau, S-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden, 11. Juli, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deulel).
- flavicollis* Marsh. Hätzeg, Muldbach (r. B.), Hermannstadt, Kronstadt, S-Regen (Bielz); Borszék, Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden und Schwarzpappel, 11. Juli, c. a.).
- a. *australis* Weise. Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden, 11. Juli, c. a.).

Criocerini.

837. *Lema Lacordaire.*

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen.

- puncticollis* Curt. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Grossau (Ormay).
- Erichsoni* Suffr. Hätzeg, Schiefelnd, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Malomviz, Puj (bei Hätzeg, c. a.).
- septentrionis* Weise. Hätzeg (Deulel).
- cyanea* L. (lichenis Voet.). Kronstadt (Bielz); Schässburg, Petrozsény, Puj (bei Hätzeg, c. a.).
- var. *abseura* Steph. Kronstadt, Zernest, Hätzeg (Deulel).
- tristis* Herbst (flavipes Suffr.). Hermannstadt, Neppendorf, Hosszufalu (Bielz); Schässburg (c. a.).
- melanopus* L. Hätzeg, Muldbach, Hermannstadt, Götzberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Balanbanya, Sachs-Regen, Bistritz, Dees, Klausenburg, Mezöség (Gyöke, Záh, Bielz); Hammersdorf, Grossau, Stolzengurg (Ormay), Baassen, Hätzeg, Rotenturm, Unter-Kerz, Karlsburg, Borszék (c. a.).
- var. *atrata* Waltl. Zernest, Rosenau (Deulel).

838. *Crioceris Geoffroy.*

- lilii* Scop. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Hévez, Kronstadt?, Tartlau, S-Regen (Bielz).
- merdigera* L. Grossau, Neudorf b. H., Götzberg, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Zibinsgebirge, Nagyenyl, Egerpatak (Háromszék), Szamosujvár (Ormay); Präszaka (Zalutna), Klausenburg (auf Türkenbund in Schässburg, Garten, c. a.).
- 12-punctata* L. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S-Regen, Bistritz, Klausenburg (Schässburg auf Spargel, Bielz).
- 14-punctata* Scop. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S-Regen, Mezöség (Gyöke, Bielz); Karlsburg (c. a.).
- 5-punctata* Scop. Hermannstadt, Leschkirch, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, S-Regen, Klausenburg (Bielz); Várhegy (Deulel).
- asparagi* L. Bistritz (Muller).

Camptosomata.

Clytrini.

839. *Labidostomis Redtenb.*

Auf verschiedenen Pflanzen, namentlich Weiden.

- tridentata* L. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Petrozsény, Hätzeg (c. a.).
- humeralis* Schneid. Pécs, Gross-Pold, Gross-Scheuern, Mediasch, Borszék, Mezöség (Gyöke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Klausenburg (c. a.); Paringul (subalpin, Deulel).
- lucida* Germ. Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Nagyenyl (c. a.); Gyögy (Ormay).
- var. *axillaris* Lac. Unter-Kerz (Altufer), Nagyenyl (c. a.).
- longimana* L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Talmat-schell, Fogarasch, Kronstadt, Ausslach, Előpatak, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Oláh-falu, S-Regen (Bielz); Gyögy (Ormay); Dees, Malomviz, Ponor bei Hätzeg (c. a.).
- var. *dalmatina* Lac. Unter-Kerz (Altufer auf Weiden, c. a.).
- var. *pilicollis* Lac. Klausenburg (Bielz).
- cyanicornis* Germ. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

840. *Tituboea Lacordaire.*

- macropus* Illig. Gross-Scheuern, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Südabhang der Breite, 12. August geköschert, 1 ♂ und ♀).

841. *Lachnaea Redtenb.*

sexpunctata Scop. Fogarasch, Mediasch. S.-Regen, Dees, Klausenburg (Bielz); Nagyenyed, Karlsburg (c. a.); Tinód (Unterweissenburger Komitat). Szamos-ujvár (Ormay); Hátzseg (Deubel).

842. *Clytra Laicharting.*

quadripunctata L. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees (Bielz); Talmesch, Zood (Ormay).

appendicina Lac. Kronstadt, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz); Karlsburg, Klausenburg (c. a.).

laeviuscula Ratzburg. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

843. *Gynandrophthalma Lacord.*

cyanea F. (salicina Lef.). Hátzseg, Hermannstadt, Neppendorf, Grossscheuern, Neudorf b. H., Holzungen. Uter-Kerz, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék, Mezöség (Gyeke, Bielz); Karlsburg (c. a.).

transsylvanica Frivaldszky. Siebenbürgen. *flavicollis* Charp. Bodzaer Geb. (Döblény, Méhely); Betjezat, Rotenturm (c. a.).

diversipes Letze. Schulergebirge (Deubel).

aurita L. Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt, Bistritz (Deubel).

affinis Hellw. Hátzseg, Hermannstadt, Grossscheuern, Kronstadt, Schässburg, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

xanthaspis Germ. Hátzseg, Gross-Pold, Grossscheuern, Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyógy (Ormay); Karlsburg (c. a.).

844. *Chilotoma Redtenb.*

musciformis Goeze. Déva, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Wietberg, Fuchsloch, auf niedern Pflanzen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

erythrostoma Fald. Karlsburg (1 ♂, c. a.).

845. *Coptocephala Chevrolat.*

chalybaea Germ. Déva, Mühlbach (r. B.), Grossscheuern, Rothberg, Marpod (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

unifasciata Scop. Hátzseg, Grossscheuern, Fogarasch, Kronstadt, Bükszál, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Petrozsény, Puj (bei Hátzseg, c. a.).

a. *femoralis* Kr. (nec Küster). Kronstadt (Bielz); Hátzseg (Deubel).

Scopolina L. Mühlbach (Szászcsor), Marpod, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay);

rubicunda Laich. Klausenburg (Bielz); Schässburg, Hátzseg, Oláhfalú (c. a.).

846. *Cryptocephalus Geoffroy.*

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen. (Homalopus.)

Coryli L. Hátzseg, Grossscheuern, Thalheim, Reps, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

Alle vier Exemplare meiner Sammlung gehören der Varietät *temesiensis* an; da Bielz die Varietät gar nicht anführt und auch Deubel die Stammform nicht gesammelt hat, so will mir scheinen, als ob die letztere, falls sie bei uns zu finden sein sollte, überaus selten sei.

a. *temesiensis* Suffr. Kronstadt, Schässburg, Borszék, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

cordiger L. Hátzseg, Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, Mezöség (Gyeke, Bielz); Kronstadt (Deubel).

octopunctatus Scop. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Karlsburg, Klausenburg, Szurdok-Pass (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

sexpunctatus L. Gross-Pold, Hermannstadt, Grossscheuern, Kronstadt, Nussbach, Tartlau, Mediasch (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (c. a.).

signatus Laich. (5-punctatus Seidl.) Talmesch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Schanta (Ormay).

distinguendus Schneid. Hátzseg (Bielz).

albolineatus Suffr. Fogarasch (Bielz).

Das Vorkommen dieser seltenen, den Alpen eigenthümlichen Art wäre näher zu prüfen.

laevicollis Gebl. Alsó-Rákos (1 Ex, c. a.).

a. *viennensis* Ws. Vajda-Hunyad (c. a.).

imperialis Laich. Gross-Pold (Bielz).

bipunctatus L. Mühlbach, Hermannstadt, Rotenturm, Marpod, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Bükszál, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék, Dees, Mezöség (Záh, Bielz); Előpatak, Hátzseg, Petrozsény, Puj b. Hátzseg (c. a.).

a. *sanguinolentus* Scop. (lineola F.). Fogarasch, Kronst., Balinbánya (Öcsém), Gyergvó (Bielz); Petrozsény, Karlsburg, Előpatak (c. a.).

biguttatus Scop. Zibinsgebirge. Grossscheuern, Neudorf b. H., Greksau, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, Mezöség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed, Baassen (c. a.).

14-maculatus Schneid. (coloratus Suffr.). Klausenburg (Bielz).

gamma H. Schöff. Boncz-Nyires (Sós-völgy, Méhely); Torda (9. Juni Deubel).

apicalis Gehl. Dobra (Bielz).

(Proctophy-u.)

Schäfferi Schrank. Déva, Gross-Scheuern, Kerzer-Gebirge, Mediasch, Dees (Bielz), Hammersdorf (Ormay); Schässburg, Klausenburg (c. a.), Kronstadt (Deubel).

cyanipes Suffr. Keresztényhavas (Méhely).

villosulus Suffr. Mühlbach (Békite), Gross-Pold, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).

aureolus Suffr. Gross-Scheuern, Nendorf b. H., Kerzer-Gebirge, Kronstadt, Bükszád (Bielz); Schässburg, Oláh-falu, Klausenburg, Rodnagelirge (c. a.).

a. **coerulescens** Schilsky. Zinne, Tömösch-Pass (Vladesz, Méhely).

sericeus L. Hätzeg, Schiellthal, Hermannstadt, Nendorf, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Bükszád, Schässburg, Oláh-falu, S-Begen, Borszék (Bielz); Zibinsgebirge, Bistra, Gyógy (Bad, Ormay); Nagyenyel, Klausenburg, Rodnagelirge (c. a.).

a. **coeruleus** Weise. Előpatak, Nagyenyel, Klausenburg (c. a.); Hätzeg, Rosenau (Deubel).

eristula Duft. (hypochoeridis Suffr.). Mühlbach (Szászcsor), Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Bistra, Gyógy (Bad, Ormay); Malomviz, Előpatak, Bükszád, Rodna-Gebirge, Nussbach, Oláh-falu, Klausenburg (c. a.).

a. **frigidum** Jacobs. (cyanescens Wse.). Kronstadt (Stehil, Méhely).

violaceus Laich. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Nendorf b. H., Gotzenberg, Girdsan, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gycke, Bielz); Hammersdorf, Salzburg, Stolzenburg (Ormay); Nussbach, Schässburg, Balánbánya, Brassen, Klausenburg, Nagyenyel, Karlsburg, Borszék (c. a.).

a. **smaragdinus** Suffr. Előpatak (c. a.).

virens Suffr. Hätzeg, Záh (Bielz).

elongatus Germ. Déva (Bielz); Schässburg (c. a.).

nitidulus F. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer-Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz), Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.).

nitidus L. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg, Salzburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

parvulus Müll. Nendorf b. H., S.-Regen (Bielz); Kerzer-Geb. (Ormay); Schässburg (c. a.).

concinus Suffr. Siebenbürgen (wohl Hätzeg-Tal).

Schütz (F. transs. 1891, p. 766) hat die Art für Siebenbürgen an, ohne eine nähere Fundortangabe zu machen, während er das Vorkommen des *C. marginatus* nicht als vollkommen sichergestellt betrachtet.

marginatus F. Talmesch, Talmeschele, Rotenturm (Bielz).

frenatus Laich. Kerzer-Gebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Nussbach, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.).

a. **flavescens** Schöff. Gross-Pold, Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.); Hätzeg (Deubel).

Moraei L. Durch das ganze Gebiet verbreitet (auch im Rodnagelirge c. a.).

a. **bivittatus** Gyll. Paj (b. Hätzeg), Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **arquatus** Ws. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

oelacismus Bodel (6-pustulatus Bossi, Weise (ec Villers)). Hätzeg, Mühlbach, Gross-Scheuern, Girdsan, Marpod, Fogarasch, Beps, Kronstadt, Tömösch-Pass, Nussbach, Mediasch, Dees, Mezőség (Gycke, Bielz); Brassen, Schässburg, Karlsburg, Nagyenyel, Hermannstadt (c. a.).

4-guttatus Richter. Dobra, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rotherg b. H., Girdsan, Marpod, Fogarasch, Héviz, Fartlau, Előpatak, Mediasch (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

4-pustulatus Gyll. Rodnagelirge, Koronjus, (c. a.).

a. **rhaeticus** Heyd. Kronstadt, Retjezat (c. a.).

var. *c.* Weise. Retjezat (c. a.).

flavipes F. Hätzeg, Hermannstadt, Holzungen, Marpod, Girdsan, Kerzer-Gebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Nussbach, Fartlau, Előpatak, Mezőség (Gycke, Záh, Bielz); Gyógy (Bad, Ormay), Karlsburg, Schässburg, Klausenburg (c. a.).

a. **nigrescens** Grall. Retjezat, Előpatak, Schässburg (c. a.).

vittatus F. Hätzeg, Talmesch, Porcest, Fogarasch, Előpatak, Bükszád, Oláh-falu (Bielz), Hermannstadt, Kerzer-Gebirge (Ormay), Petroszev, Malomviz, Retjezat (Zenoga), Paj (b. Hätzeg), Rotenturm, Kronstadt, Brassó, Ratosnya, Schässburg (c. a.).

bilineatus L. Hätzeg, Mühlbach (Szászcsor), Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay);

- Rotenturm, Puj (b. Hätzeg, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. **moestus** Ws. Rotenturm, Baassen (c. a.).
- a. **armeniacus** Fald. Hätzeg, Puj (bei Hätzeg); Schässburg, Retjezat (c. a.); Nagybagynás (Deubel).
- elegantulus** Grav. Dobra, Gross-Scheuern (Bielz); Déva, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- strigosus** Germ. Schässburg (Wietenberg, 1 ♂, Juli, c. a.).
- chrysopus** Gmel. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rothberg b. H., Holzmengen, Girelsau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Nagyenyei, Klausenburg, Vajda-Hunyad (c. a.).
- frontalis** Marsh. Hermannstadt (Bielz); Hätzeg, Rothgebirge (Koronis, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- ocellatus** Drap. Hätzeg, Hermannstadt, Girelsau, Porcest, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Malomviz, Hammersdorf (c. a.).
- carpathicus** Friv. Hammersdorf, Balánbánya (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- labiatus** L. Gross-Scheuern, Marpoel, Fogarasch (Bielz); Előpatak, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Nagybagynás, Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).
- a. **diagrammus** Suffr. Előpatak, Büdös, (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Baassen (c. a.); Vargyas (Deubel).
- pygmaeus** F. Michelsberg, Talmesch (Bielz); Gyógy (Bad, Ormay).

Wahrscheinlich sind auch die Fundorte von Bielz und Ormay für die Stammform, welche nach Weise dem südlichen Europa angehören soll, auf die beiden Varietäten zu beziehen.

- a. **amoenus** Drap. (vitula Suffr.). Schielthal (Bielz); Petrozsény, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hätzeg (Deubel).
- a. **orientalis** Weise. Schässburg (c. a.).
- connexus** Oliv. Hätzeg, Talmesch, Girelsau, Freck, Klausenburg (Bielz); Gyógy (Ormay); Petrozsény, Schässburg (c. a.).
- var. **fasciatus** n. Petrozsény (c. a.).

Cryptocephalus connexus var. **fasciatus**. Der schwarze Nahtfleck hinter der Mitte der Flügeldecken verbindet sich nicht nur mit der schwarzen Längsbinde, sondern auch mit dem schwarzen Seitenrande, so dass von der gelben Färbung der Flügeldecken nur 6 gelbe isolierte Makeln übrig bleiben, je eine längliche neben der vorderen Nahthälfte und über den Epigleuren und je eine quere vor der Spitze. Der gelbe Halbschildrand ist ziemlich schmal, aber nicht scharf begrenzt, die Stirne trüb rötlichgelb mit der wenig scharfen Zeichnung der Männchen.

- fulvus** Goeze (minutus F.). Gross-Scheuern, Michelsberg, Talmatsch, Tartlau (Bielz); Ratosnya, Frecker Gebirge, Leitatal bei der Sägemühle, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne), Törzlbürg (Deubel).

- populi** Suffr. Fogarasch (Bielz); Karlsburg, Schässburg (Kokel, 26. Juli auf Schwarzpappel, c. a.).
- pusillus** F. Neudorf b. H., Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz).
- a. **Marshami** Weise. Schässburg (Breite, Juli), Toroczko (c. a.).
- rufipes** Goeze. Hätzeg, Hosszufalu, Tartlau (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

847. *Pachybrachys Redtenbacher.*

Die Arten leben auf Gesträuch, besonders Weiden. (Pachystylus.)

- hieroglyphicus** Laich. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mező-ég (Gyeke, Bielz); Karlsburg, Ratosnya (c. a.).
- a. **ictericus** Wse. Schässburg, Ujszéke (b. Keresztur, c. a.).
- a. **tristis** Laich. Vargyas (Almáser Höhle, Deubel); Borszék (c. a.).
- carpathicus** Rey. Schässburg, Ratosnya (c. a.).

Ich beziehe auf *P. carpathicus* Rey, dessen Beschreibung mir unbekannt ist, dem *P. hieroglyphicus* Laich. sehr ähnliche Tiere mit ganz schwarzem Pygidium.

- haliciensis** Mill. (sinuatus Seidl. nec Muls.). Hätzeg, Petrozsény, Karlsburg, Kronstadt, Baassen, Schässburg, Nagyenyei, Ratosnya, Rothgebirge (c. a.); Vilomlák, Tömös, Práznár, Méhely).
- a. **rutimana** Wse. Hätzeg, Karlsburg (c. a.).

- hypophaes** Suffr. Fogarasch, Kronstadt (?) (Bielz).

- tesselatus** Oliv. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Salzburg (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Klausenburg (c. a.).

- picus** Weise (histrion Redtenb.). Siebenbürgen.

Seidlitz (F. transs. 1896, p. 767) führt diese Art für Siebenbürgen ohne nähere Fundortsangabe an.

- fimbriolatus** Suffr. Hätzeg, Gross-Scheuern, Girelsau, Marpoel, Mező-ég (Gyeke, Záh, Bielz); Stulzenburg (Ormay); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

- a. **pteromelas** Mars. Hammersdorf, Schässburg (c. a.).

Cyclica.

Lamprosomini.

848. *Lamprosoma Kirby.*

- concolor** Sturm. Kerzer Gebirge, Héviz, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Gyógy

(Ormay); Rotenturm, Hermannstadt (c. a.).

Eumolpini.

849. *Pachnephorus Redtenb.*

Die Arten leben am Ufer stehender und fließender Gewässer.

pilosus Rossi. Fogarasch, Nussbach, Schässburg (Bielz), Gyógy (Ormay); Matosujvár, Oladtalu, Kronstadt (c. a.).

tesselatus Duft. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz).

a. **sabulosus** Gebl. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Porumbák, Reys, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

villosus Duft. (nec Redt. nec Fairm.). Schässburg, Hermannstadt (c. a.), Várhegy (Deubel).

850. *Bromius Redtenb.*

(*Adoxus* Baly.)

obscurus L. Nagyág, Fogarasch, Kronstadt, Säch.-Regen, Gyergyó, Borgóer Pass (Bielz), Hermannstadt, Rotenturm, Zilinsgebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

a. **villosulus** Schrk. (vitis auct.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Samtliche Tiere meiner Sammlung besitzen bei hellrotlichbraunen Flügeldecken ganz schwarze Beine.

851. *Chrysachus Redtenb.*

asclepiadeus Pall. (*pretiosus* F.), Betjezat, Mühlbach, Gross-Scheuern, Marpod, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Dees, Gyalu, Mező-ég (Záh), Hasság, Schässburg (Wietelerg (c. a.)), Torockzó, Zool (Ormay).

852. *Eupales Lefevre.*

ulema Germ. Gross-Pold (Bielz); Vajta Hunyad (c. a., Deubel).

Chrysomellini.

853. *Colaphus Redtenb.*

sophiae Schall. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

854. *Gastroidea Hope.*

viridula Dey. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

polygona L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

855. *Entomoscelis Chev.*

adonidis Pall. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Günsau, Fogarasch, Persaner Gebirge (Oberkomana), Kronstadt, Iartlau, Schässburg, Mező-ég (Gyke, Záh, Bielz); Klausenburg, Nagyenyel (c. a.), Buzel, Mriszló, Unterweissenburger Komitat), Torockzó (Ormay).

saera L. Fogarasch, Mediasch, Klausenburg, Mező-ég (Nagyenyel, Gyke, Záh, Czege, Bielz).

856. *Timarcha Latreille.*

T. tenebricosa F., welche von Bielz für Schässburg und Kronstadt angeführt wird, ist wohl aus unserem Verzeichnis zu streichen. In Schässburg ist sie von mir nie gesammelt worden, sondern nur *coriaria* Laich., ebensowenig hat Deubel das wegen seiner bedeutenden Grösse kaum zu übersehende Tier in Kronstadt aufgefunden.

pratensis Duft. Hätzeg, Schmelthal, Stolzenburg, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Götzberg, Rotenturm, RuSat, Remete (Nagyenyel), Szamosujvár (Ormay).

coriaria Laich. (*violaceonigra* auct.). Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mező-ég (Záh, Bielz); Rakovieza, Szamosujvár (Ormay).

rugulosa H. Schaff. Surul, Frecker Geb., Fogarascher Geb., Kronstadt, Schulergebirge Tömöser Pass, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Pilis (b. Nagyenyel), Schässburg, Rotenturm, Előpatak, Petrozsény, Hätzeg, Karlsburg (c. a.).

var. **lonniekii** Mill. Porumbach, Surul, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Hermannstadt, Baassen, Schässburg, Tordai Schlucht (c. a.).

metallica Laich. Betjezat, Zilinsgebirge, Práshe, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Fogarascher Geb., Kronstadt, Schulergebirge, Patra mare, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Götzberg (Ormay); Balanbanya, Schässburg, Nagyenyel (c. a.).

gibba Hoppe. Kerzer Gebirge (Bielz).

T. gibba Hoppe, welche auch von Bielz nur vom Kerzer Gebirge angeführt wird, ist seither nicht mehr gesammelt worden; ihr Vorkommen erscheint dabei fraglich.

857. *Timarchida Ganglbauer.*

Deubeli Ganglb. Schulergebirge (Deubel, c. a.).

858. *Chrysomela Linné.*

fimbrialis Küst. Hätzeg (Bielz).

var. **hungarica** Fuss. Mühlbach, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bucsecs, Tesla,

Csukás, Birthälm, Dees (Bielz); Hermannstadt, Grossau, Örményszékes (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Magyar-Forró (Unterweissenburger Komitat), Felső-Orló (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Előpatak, Marosujvár, Szóváta (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

cribrosa Ahr. Mezőség (Gyeke, Bielz).

Weisei Friv. Balánbánya (c. a.); Hätzseg (Deubel).

coerulea Oliv. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **globipennis** Suffr. Präsbe, Előpatak, (Bielz); Kerzer Geb., (Ormay); Rodnagebirge (c. a.); Pietrosul, Nagy-hagymás (Deubel).

lichenis Richt. Fogarascher Geb., Bucsecs (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

a. **nigerrima** Weise. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Bucsecs (alpin, Deubel).

var. **rhypaea** Wse. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

carpathica Fuss. Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz); Nagyagymás, Bucsecs, Rodnagebirge (Deubel).

var. **Hopfgarteni** Wse. Siebenbürgen.

rufa Dult. (opulenta Suffr., menthae Dult.). Erzgebirge, Nagyág, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Talmesch, Retjezat, Bistra, Rotenturm, Rodnagebirge (c. a.)

marcesitica Germ. Retjezat, Zibinsgebirge, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Schulergebirge, Bucsecs, Oláh-falu, Borgóer Pass (Bielz); Porkovitza (Zoodgebirge, Ormay); Bistra, Schässburg, Nagyenyed, Rotenturm, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **turgida** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Nagyenyed, Schuler-Gebirge, Schässburg, Bucsecs, Borszék, Retjezat (c. a.).

a. **pannonica** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).

purpurascens Germ. Bistra, Nagyenyed, Topánfalva (Erzgebirge), Alsó-Rákos (c. a.); Rodnageb., Nagyagymás, Piatra mare (Tamina-Schlucht, Deubel).

crassimargo Germ. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

a. **viridis** Ws. Siebenbürgen.

hemisphaerica Germ. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm, Porkovitza (Zoodgebirge, Ormay); Rodnagebirge (c. a.); Zernester Gebirge (Deubel).

crassicolis Suffr. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Bistra (Ormay); Borszék, Ober-Kerz (Glas-

hütte), Zibinsklamm, Előpatak, Schässburg, Retjezat, Nagyenyed (c. a.)

olivacea Suffr. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Rodnageb. (Bielz); Schauta (Ormay); Klausenburg (c. a.); Marosgebirge (Müller).

a. **umbratilis** Wse. Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

globosa Panz. Zibins-Gebirge (Bielz); Schauta (Ormay).

vernalis Brull. Fogarascher Geb., Kronstadt (Bielz).

var. **Heeri** H. Schaeff. Hätzseg, Fogarascher Gebirge (Bielz).

haemoptera L. Hätzseg, Petrozsény, Hunyad, Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Holzmenzen, Talmesch, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Oláh-falu, Dees (Bielz); Rotenturm, Salzburg, Zibins-Gebirge, Talmesch, Szamosujvár (Ormay); Puj (b. Hätzseg, c. a.).

var. **unicolor** Suffr. Kronstadt (Zinne, Deubel).

goettingensis L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **Sturmii** Westfl. Fogarascher Gebirge, Kronstädter (?) Gebirge (Bielz).

a. **polonica** Wse. Kerzer Gebirge (Bielz).

limbata F. Salzburg, Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Ober-Kerz, Mihályfalva (Grosskokler Komitat), Nagyenyed, Miriszló (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Puj (b. Hätzseg, c. a.).

lurida L. Hätzseg, Salzburg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Remete (Ormay); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

staphylaea L. Hätzseg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Oláh-falu, S.-Regen, Borszék, Bistritz, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Tordae Schlucht (c. a.).

gypsophilae Küst. Déva, Neudorf b. H. (Bielz); Schässburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).

sanguinolenta L. Hätzseg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat, Poplaka, Ober-Kerz (Ormay).

marginalis Duft. Hätzseg, Mezőség (Záh, Bielz).

carnifex F. Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

marginata L. Hätzseg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmenzen, Máród, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Nussbach, Mediasch, Schässburg, Oláh-falu, S.-Regen, Mezőség (tyeke, Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

- orichalcea** Müll. (bulgarensis Schrnk.) Schässburg (c. a.), Bistritz Müller)
 a. **lamina** F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmenzen, Sächsl.-Bielz (Bielz)
morio Kryn. Neudorf b. H. (Bielz); Hät-szeg (c. a.)
chalcides Germ. Alsó-Rákos (c. a. 4 Ex.).
geminata Payk. Gross-Scheuern, Maros-gebirge (Bielz); Schanta, Bistra (Or-may); Schässburg (c. a.; Kronstadt (Deubel)).
 a. **cuprina** Duft Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Vildombák, Keresztényházas Mchely). Schässburg, Retezat (c. a.)
quadrigemina Suffr. Kronstadt, Rosenau (Deubel).
hyperici Forst. (gemellata Geoffr.) Hätzeg, Gross-Pödd, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Schanta Ormay).
americana L. Klausenburg, Kronstadt (Bielz).
cerealis L. Salzburg, Gross-Scheuern, Zood, Fogarasch, Kronstadt (?). Mediasch (Bielz); Hätzeg, Pilis (b. Nagyenyei), Klausenburg (c. a.)
 a. **alternans** Panz. Megerlei F.) Hunyad, Salzburg, Hammersdorf, Zood, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
 a. **ornata** Abr. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hätzeg (Deubel)
 a. **mixta** Küst. (violacea Schall.) Fogarasch, Marosgebirge (Bielz); Falmesch, Rotenturm, Torockó, Remete (Nagyenyei, Ormay).
aurichalcea Mannh.
 var. **asclepiadis** Villa Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge, Hätzeg (Deubel).
coerulans Scrika (violacea Panz.) Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Pilis (b. Nagyenyei), Klausenburg (c. a.).
fastuosa Scop. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
 a. **speciosa** L. (galeopsidis Schrk.) Kronstadt, Rodna-Gebirge, Schuler-Geb. (Deubel).
graminis L. Mediasch, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay).
menthastris Suffr. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
 a. **rugicollis** Weibb. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
varians Schaller. Hätzeg, Retezat, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Rosszudau, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Rodna-Gebirge, Ilyanika (Naszó), Előpatak (c. a.)
 a. **centaurea** Herbst (centaurei F.). Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
 a. **pratensis** Wse. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
 a. **aethiops** F. Rodnagebirge (Deubel)

polita L. Hätzeg, Schelthal, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, S.-Bogen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay). Retezat (c. a.).

859. *Chrysochloa Hope.*

Orina Motsch.

(Allorina.)

iris Fabr. luctuosa Oliv.). Zibinsgeb., Gallina, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagelirge (Bielz); Baassen, Schässburg, Malomviz, Retezat (c. a.), Schulergebirge (Deubel).

rugulosa Suffr. Retezat, Zibinsgebirge, Gallina, Rodnagel. (Kuhhorn, Bielz); Götzemberg (Ormay). Hévíz, Baassen, Schässburg, Rodnagelirge (c. a.)

(Romalorina.)

intricata Germ. Kronstädter Geb., Schulergebirge, Hévíz, Schässburg, Borszék, Borgoer Pass (Bielz); Gyergő-fölgyes (Ormay); Rodnagelirge, Malomviz (c. a.).

var. **Anderschi** Duft Retezat, Zibinsgebirge, Rosinar, Götzemberg, Surul, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Hargitta, Oláhfalú, Borgoer Pass, Rodnagelirge (Kuhhorn, Bielz); Bistra, Gyergő-fölgyes (Ormay); Schulergebirge (c. a.).

alpestris Schum. Kerzer Gebirge (Ormay); Schulergebirge, Borszék (c. a.); Nagyhagymás, Paringulgebirge (Deubel)

a. **rivularis** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

a. **fontinalis** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Hätzeg (Deubel).

a. **bicolora** Ws. Fogarasch, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergeb. (Deubel).

var. **punctatissima** Suffr. Surul (Bielz); Schässburg (c. a.) Hätzeg (Deubel)

a. **anthrisci** Ws. Schulergebirge, Vargyas (Almásér-Höhle, Deubel).

a. **Bodemeyeri** Kr. Schulergeb. (Deubel).

var. **polymorpha** Kr. Kronstädter Geb. (?), Bozauer Pass, Bihargebirge, Piatra Arsa, Bielz); Rodnagelirge (c. a.).

var. **nigrina** Suffr. Hätzeg (Deubel)

gloriosa F. Fogarascher Gebirge (Bielz).

a. **pretiosa** Suffr. Rodnagelirge (Kuhhorn, Bielz).

a. **venusta** Suffr. Zibinsgebirge, Gallina, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

variabilis Wse. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (c. a.).

vittigera Suffr. Zibinsgebirge, Gallina, Rodnagelirge (Kuhhorn, Bielz).

- bifrons** F. (*monticola* Duft.). Bihargebirge (Bielz); Bucsees (alpin, Deubel).
 var. **decora** Richt. Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagelbirge (Deubel).
viridis Duft. Zibinsgebirge, Dusch, Zibinsjaser, Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).
 var. **Merkli** Wse. Kronstadt (Deubel).
 a. **transsylvanica** Wse. Paringul, Rodnagelbirge (c. a.); Hätzeger Gebirge (Deubel).

(Protorina.)

- plagiata** Suffr. Retjezat, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Schulergebirge, Bucsees, Gyergyó, Marosgeb., Rodnagelbirge (Koronjs), Borgoer Pass (Bielz); Schanta (Ormay).
 var. **commutata** Suffr. Kronstädter Geb., Csiker Gebirge, Balánbánya (Öcsém, Nagyhagymás, Bielz); Rodnagelbirge, Topánfalva (Erzgebirge, c. a.).

Jedenfalls bezieht sich Bielz's *Ch. melanocephala* Duft. (= *Peeroleri* Bassi, *commutata* Suffr.) auf var. *commutata* Suffr. mit einfarbig roten Flügeldecken, während *melanocephala* Duft. aus unserem Verzeichnis zu streichen ist. (*Chrysocloa* i. sp.)

- virgulata** Germ. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Zebner Berg, Héviz, Borgoer Pass (Bielz); Schanta, Bisztra (Ormay); Schulergebirge, Retjezat (c. a.).
 a. **serena** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).
 a. **candens** Ws. Tesla, Keresztényhavas (Méhely); Kerzer Gebirge, Zoolgeb. (Ormay); Schulergebirge (Deubel).
 a. **praefica** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz), Schulergebirge, Zernester Gebirge (Deubel).
cacaliae Schrank. Zibinsgebirge, Galbina, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Hargitta, Oláhfalu, Borszék, Borgoer Pass (Bielz); Rodnagelbirge, Schulergebirge (c. a.).
 a. **sumptuosa** Redt. tristis Duft.). Retjezat, Galbina, Schulergebirge (Bielz).
 var. **tussilaginis** Suffr. Hätzeg (Deubel).
 var. **senecionis** Schumma. Retjezat, Galbina, Kerzer Gebirge, Tesla, Hargitta, Borszék (Bielz); Zibinsgebirge, Bisztra (Ormay); Rodnagelbirge (c. a.); Pietrosul, Nagyhagymás (Deubel).
 a. **tristicula** Ws. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).
 a. **fraudulenta** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).
speciosissima Scop. Rodnagelb. (Deubel).
 a. **negrescens** Letrn. Bucsees (Deubel).
 var. **juncorum** Suffr. Retjezat, Präsle, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Hargitta, Oláhfalu (Bielz); Kronstadt (c. a.); Bisztra, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagelbirge, Bucsees (Deubel).

- a. **carpathica** Kraatz. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm, Rodnagelbirge, Bisztra (c. a.).

860. *Phytodecta Kirby*.

- viminalis** L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge, Dees, Nagyenyed, Mezőség (Záh, Bielz); Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
 a. **10-punctatus** L. Kronstadt, (Méhely, c. a.); Schässburg (c. a.).
 a. **Baaderi** Panz. Kronstadt (Méhely, Deubel).
rufipes Deg. Rothberg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Borszék (c. a.).
flavicornis Suffr. Marosgebirge (Bielz); Schässburg (Kokeluter, auf Weiden, c. a.).
Linnaeanus Schrank. (*triandrae* Suffr.). Freck (Rakovitz, Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Méhely).
fornicatus Brüggm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
5-punctatus F. Rosenauer Gebirge (Deubel); Klausenburg (Müller).
 a. **unicolor** Ws. Rosenauer Gebirge (Deubel); Ratosnya, Hermannstadt, Rotenturm (c. a.).
 a. **padi** Penecke. Schulergebirge (Deubel).
 a. **obscurus** Grimmer Piatra mare (Deubel).
pallidus L. Piatra Csaki, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Héviz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Retjezat, Bisztra, Bucsees (c. a.); Zibinsgebirge (Ormay).
 a. **nigripennis** Wse. Nagykőhavas (Méhely); Bisztra (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

861. *Phyllodecta Kirby*.

(Chaetocera.)

- vulgatissima** L. Hätzeg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
 (Phyllodecta i. sp.)
tibialis Suffr. (viennensis Wse.). Unterkers, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **Cornelli** Wse. Krizla, Kronstadt, Baróth (Méhely).
vitellinae L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. **brevicollis** Motsch. Kronstadt (Deubel).
laticollis Suffr. Kronstadt (Méhely); Előpatak, Retjezat, Schässburg (c. a.).
atrovirens Cornel. Kronstadt (auf Crataegus, Méhely); Retjezat, Unterkers, Rodnagelbirge (c. a.).

862. *Hydrothassa Thomson.*

- aucta* F. (S-Regen (Bielz))
a. glabra Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz), Hammersdorf, Stolzenburg (Ormay), Előpatak, Schässburg (Borsos), Borszék, Szováta (c. a.), Kronstadt (Deubel)
marginella L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mezős, Gyéke, Innerkerz (Alfuder, Bielz), Honigberg (Alfluss, Deubel), Borszék, Rátosnya (Schässburg, Szováta (c. a.))
a. germanica Wse. Hermannstadt (Ormay), Balánbánya (c. a.).

863. *Prasocuris Latreille.*

- phellandrii* L. Hermannstadt, Reussener Forst, Schässburg (S-Regen, Mezős (Gyéke, Záh, Bielz); Hammersdorf (Ormay), Kronstadt, Szováta (c. a.))
junci Brahm. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Nendorf b. H., Meliasch, S-Regen (Bielz), Heitau, Michelsberg (Ormay), Előpatak (c. a.; Kronstadt (Deubel))
vicina Luc. Michelsberg, Klausenburg (Bielz); Hätzeg, Kronstadt, Előpatak (c. a.).

864. *Sclerophaedon Weise.*

- Kenderesyi* Kiesenw. Retezat, Hätzeger Gebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.)
a. carpathicus Wse. Rodnagelberge, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.), Schulergebirge, Nagybagymás (Deubel)
carinolicus Germ. Kronstadt, Paringul, Zibinsch, Gölsenberg, Präse, Kerzer Gebirge, Fogarascher Geb., Mediasch, Oláhfalú, S.-Regen, Bistritz (Bielz), Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Balánbánya (c. a.)
a. transsylvanicus Füss. Kerzer Gebirge, Kronstadter Gebirge, Buşseas, Harghita (Paraj), Oláhfalú (Bielz), Schanta, Porkovitza, Zoolgeb., Ormay), Rodnagelberge, Balánbánya (c. a.)
orbicularis Suffr. Hätzeg, Hévíz (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Paringul (c. a.), Nagybagymás (Deubel)

865. *Phaedon Latreille.*

(Sternoplatys.)

- segnis* Ws. Rodnagelberge (Ganglbauer)
Deubeli Weise. Rodnagelberge, Buşseas (alpin, Deubel)
Cnephaedon.
pyritosus Rossi. Gross-Scheuern, Sächsischen-Regen (Bielz), Hermannstadt (Ormay, c. a.), Schässburg (c. a.; Miriszlo (Unterweissenburger Komitat, Ormay), Kronstadt (Deubel)).

(Phaelon i. sp.)

- laevigatus* Duft. *zaleopsis* Seidl., *salma* (c. a.) Suffr. Nendorf b. H. (Schässburg? (Bielz), Brendorf, Honigberg (Alfluss, Deubel))
grammicus Duft. Gross-Scheuern, Nendorf, Kerzer Gebirge (Bielz), Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.; Honigberg (Alfluss, Deubel))
cochleariae F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt (Bielz), Hammersdorf (Ormay), Hätzeg, Maunburg b. Kr., Forster-Schlucht, Borszék (c. a.), Rodnagelberge, Nagybagymás (Deubel).
a. neglectus Sahlb. Klausenburg (Bielz)
armoraciae L. *parvulus* Duft. Götzenberg, Mező-Éz (Záh, Bielz), Gyergyó-Fölgyes (Ormay), Klausenburg (c. a.), Kronstadt, Schulergebirge (Deubel)
var. salicinus H. er. Hermannstadt (Bielz).

866. *Plagiodera Erichson.*

Auf Erlen und Weiden.

- versicolor* Lich. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

867. *Melasoma Stephens*

(Linacidea.)

- aenea* L. Durch das Bergland verbreitet.
a. haemorrhoidalis L. Kerzer Gebirge (Ormay), Retezat, Schässburg, Bistritz, Rodnagelberge (c. a.)
Microlema.
cupreum Hätzeg, Hermannstadt, Rothberg b. H., Kronstadt, Meliasch, S-Regen (Bielz), Gyógy, Gyergyó-Fölgyes (Ormay); Schässburg, Hiderszamos (c. a.)
20-punctatum Scop. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Meliasch, Schässburg, S-Regen (Bielz); Rotenurm, Gyógy (Ormay), Borszék (c. a.)
collaris L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
alpinum Zett. Hätzeg (Bielz)
Das Vorkommen dieser Art bedarf der Bestätigung, zumal dieselbe nur von einem einzigen Fundorte angeführt wird; oder dürfte *M. lapponicum* L. bei uns vorkommen.
(Melasoma i. sp.)
populi L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
tremulae F. *longicollis* Suffr. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet
saliceti Wse. Rodnager Gebirge, Kronstadt, Baróth (Méhely); Klausenburg, Nagyenyed (c. a.).

Galerucini.

Galerucae.

868. *Agelastica Redtenb.*

(Auf Erlen.)

alni L. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.869. *Phyllobrotica Redtenb.**quadrimaculata* L. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen (c. a.); Honigberg (Deubel).*adusta* Creutz. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Rotenturm, Holzungen, Marjol, S.-Regen, Schässburg (Bielz, auf Malve); Kronstadt (Deubel).870. *Luperus Geoffroy.*

(Calomicrus.)

circumfusus Marsh. (nigrofasciatus Wse.) Hátszeg, Mühlbach (r. B.), Talmesch, Girelsau, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Gyógy (Bad, Ormay); Rosenauer Gebirge (Deubel, c. a.); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).*pinicola* Duft. Hátszeg (Csopca, Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Luperus i. sp.)

xanthopus Schrank (rufipes Scop., xanthopoda Schrank, Seill.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Holzungen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mező-ér (Gyeke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Szováta (c. a.).*L. rufipes* Scop. kann zu *xanthopus* Schrank oder zu *longicornis* F. gezogen werden; in Schässburg habe ich bis jetzt nur *longicornis* gesammelt; welche Art Bielz mit seinen *rufipes* meint, kann ich nicht entscheiden; sein *rufipes* findet sich bei Hátszeg, Kronstadt und Sächsisch-Regen.*rugifrons* Wse. Hermannstadt (Seidlitz); Schässburg (c. a.).*longicornis* Fabr. (rufipes Scop.). Schässburg, Alsó-Rákös (c. a.); Kronstadt (Deubel).*niger* Goeze. Rotenturm (auf Erle, *Alnus glutinosa*, Ormay); Marosgeb. (Müller).*flavipes* L. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdok-Pass, Schulergebirge, Borszék (c. a.).*cyanipennis* Küst. Kronstadt (Deubel); Klausenburg (c. a.).*viridipennis* Germ. Paringul, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).871. *Lochmaea Wse.**capreae* L. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.var. *pallidipennis* Küst. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel)*suturalis* Thoms. Baróth (Méhely); Rotenturm (c. a.).*crataegi* Forst. Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Klausenburg (c. a.).a. *binolata* Duft. Mit der Stammform.872. *Galerucella Crotch.*

(Pyrrhalta.)

viburni Payk. Hátszeg, Gross-Scheuern, Heltau, Götzeneberg, Mediasch, Schässburg, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Noa (Deubel).

(Galerucella i. sp.)

nymphaea L. Kronstadt (Bielz).*lineola* F. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.*luteola* Müll. (xanthomelaena Schrank). Kronstadt, Weidenbach, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Hátszeg (c. a.).*calmariensis* L. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Bistritz (c. a.).*pusilla* Duft. Mezőség (Gyeke, Méhely); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).*tenella* L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Heltau, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Tordaer Schlucht, Dees, Karlsburg (c. a.).873. *Galeruca Geoffroy.*

(Galeruca i. sp.)

tanaceti L. Durch das Berg- und Hügel-land, im Grase und an Wegen.*pomoniae* Scop. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.*Dahli* Joann. Kronstadt (Méhely)

(Emarhopa.)

rufa Germ. Mühlbach, Mediasch, Kronstadt (Bielz); Nagy-Lak (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

(Haptoscelis.)

melanocephala Ponz. Hátszeg, Gross-Scheuern, Mediasch, Dees, Mezőség (Gyeke, Bielz); Örményszékes (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg (c. a.); Klausenburg (Müller).874. *Euluperus Weise.**xanthopus* Duft. Gross-Scheuern, Holzungen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

Schässburg ist vorläufig aus der Reihe der Fundorte zu streichen, ebenso Kronstadt.

major Wse. (cyanescens Bielz). Kronstadt, Rosenau (auf Wende häufig Deubel); Busecs (c. a.)

Halticae.

875. *Podagrica Foudras*.

fuscipes L. Hatszeg, Hermannstadt, Holzmeugen (Bielz)

malvae Hlig. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Salzburg, Fogarasch, S. Regen (Bielz)

Schlüpfung ist aus der Reihe der Fundorte vorläufig zu streichen.

a *aenescens* Ws. Vajda-Hunyad (c. a.)

fuscicornis L. Hatszeg, Neudorf, Tahmesch, Mediasch, Schässburg, S. Regen, Mezöség (Gyögy, Zah, Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay). Karlsburg (c. a.)

876. *Deroerepis Weise*.

rufipes L. Gross-Scheuern, Neudorf bei H., Fogarasch, Fathau, Elgotak, Schässburg, Mezöség (Zah, Bielz); Gyögy (Bad, Ormay). Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).

877. *Crepidodera Chevrolat*.

femorata Gyllb. Retezat, Rodnagerbirge (c. a.); Zernest, Kronstadt (Deubel)

transsylvanica Fuss. Präšbe, Kerzer Gebirge (Bielz), Schulergebirge, Rodnagerbirge (c. a.), Botenurm (Ormay); Bodzagebirge (Deubel).

corpulenta Kusch. Paringul, Präšbe, Porcesst, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge (Bielz), Botenurm, Schanta (Ormay), Retezat, Bistritz, Schulergebirge, Balánbánya, Szováta (c. a.). Busecs, Nagybagy-mas (Deubel).

a *opaca* m. Frecker Gebirge (Serbota, 2 Ex., c. a.).

Cr. corpulenta a. *opaca* unterscheidet sich von der Stammform durch feiner punktierte gestreifte Flügeldecken mit fast flachen, fein gerunzelten Zwischenräumen der Punktstreifen, wodurch die Flügeldecken ganz matt, glanzlos erscheinen.

melanostoma Rehnrb. Klausenburg (Bäharer Gebirge, Bielz).

cyanescens Duft. Frecker Gebirge, Frecker Jaser, Kerzer Gebirge (Bielz); Busecs (c. a.)

picea Petri. Kerzer Gebirge. Ufer des Bulea-Sees, aus Grasbüscheln gesammelt (c. a.).

Dr. Holdhaus hat (Unters. über die Zoogeographie d. Kärtippen, K. k. zool. bot. Ges. Wien VI. D. C.) *picea* m. schlechtlin. als Synonym der *Cr. cyanipennis* Kutsch. erklärt. Ich kann mich seiner Ansicht nach nochmaliger Überprüfung und Vergleichung der drei gegenwärtig in meiner Sammlung befindlichen Stücke vom Bulea-See mit *Crepidodera cyanipennis* Kutsch. sowohl, als mit der in der Gestalt ähnlicheren *Crep. cyanescens* Duft. den ich aus Steier-

mark bezitze, nicht anschliessen und erhalte das Ansehen der *Cr. picea* m. aufrecht aus folgenden Gründen:

1. Unter den 3 Stücken ist ein Weibchen, welches ausgefärbt und ganz geschwungen. Tüpfel, Tarsen und die ersten Fühlerglieder etwas leuchtend; die beiden anderen Exemplare erinnern in ihrer Färbung mehr-eigentlich an *Cr. ferruginea* Scop.; von Blau keine Spur.

2. Die Grösse ist geringer als die der kleinsten *Cr. cyanipennis* Kutsch.

3. Der Körper ist gedrungen, erinnert mehr an den der *Cr. cyanescens*, mit der sie auch in der Halsschildpunktion mehr übereinstimmt. Ein Stück der *Cr. cyanipennis* von Balánbánya besitzt eine ähnliche Halsschildpunktion, aber viel gestrecktere Gestalt, anders gebaute Halsschild, viel längere Fühler und die normale Färbung der *Cr. cyanipennis*.

4. Die Fühler sind kräftiger, kürzer als bei *Cr. cyanipennis* oder irgend einer andern Art der Gruppe.

5. Der Halsschild ist am Seitenrande vor den Hinterwinkeln deutlich, wenn auch schwach ausgeschnitten, wodurch die Hinterwinkel spitzer und fast rechtwinklig werden, was bei *Cr. cyanipennis* nie der Fall ist; auch die Schwiele in den Vorderwinkeln ist mehr-weniger abgesetzt und weniger lang.

6. Auch in der Punktion der Unterseite finden sich kleine Unterschiede, denen ich jedoch weniger Gewicht beilege.

7. Die Fältchen an der Halsschildbasis sind viel weniger tief und scharf begrenzt, die Querschnitte zwischen denselben wenig vertieft.

Ich glaube diese Merkmale genügen, um das Ansehen der *Cr. picea* aufrecht zu erhalten und sie von allen Verwandten der Gruppe zu unterscheiden.

Ich war früher geneigt, kleine Stücke einer bläulichgelben *Crepidodera* vom Busecs auch für *Cr. picea* zu halten, und ich glaube zwei solcher Tiere auch als *Cr. picea* versendet zu haben, eines auch steckte noch als fraglich bei *Cr. picea* in meiner Sammlung. Bei nochmaliger Untersuchung dieses zweifelhaften Stückes stellte ich jedoch fest, dass es nicht zu *Cr. picea*, sondern zu *Cr. cyanescens* gehörte, nur ist es etwas kleiner als die Stücke meiner Sammlung.

cyanipennis Kutsch. Kerzer Gebirge (Ormay), Kronstadt, Schulergebirge, Balánbánya (c. a.).

nigritula Gyllb. Hermannstadt, Heltau, Gyögy (Bad, Ormay); Schässburg, Baassen, Topánfalva, Unter-Kerz (c. a.). Szuruk Pass (Deubel)

transversa Marsh. (impressa Duft.). Hatszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Kronstadt (Deubel).

Schässburg, Mdonvitz, Hatszeg, Ratosnya, Karlsburg (c. a. auf Disteln).

impressa F. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Schanta, Gyögy (Bad, Ormay).

Ich habe nach Untersuchung meines Materials und Vergleichung desselben mit spanischen *impressa* den Eindruck erhalten, als ob *impressa* bei uns nicht vorkomme, indem Individuen der *transversa* nur mit einigen wenigen Punkten auf der Mitte des Halsschildes vor dem Quereindruck, die aber größer sind als die des *impressa*, durchaus als *impressa* bestimmt worden seien; solche Exemplare leiste ich aus Karlsburg, aber auch aus Ungarn und aus Süddeutschland (Haltz).

ferruginea Scop. Hatszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marjod, Götzenberg, Fogarasch, Reys, Héviz, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Olábfalu, Sächsen-Regen (Bielz). Baassen, Ratosnya,

Torda, Előpatak, Puj (b. Hátzeg, c. a.); Nagybagymás, Schuler-Gebirge (Deubel).

878. *Lythraria Bedel.*

salicariae Payk. Neudorf b. H. (Bielz); Schässburg (Kokelufer, gekötscherl, 16. Mai), Rotenturm (c. a.); Honigberg (am Altflusssufer, Deubel).

879. *Epithrix Foudras.*

pubescens Koch. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Also-Rákos (c. a.); Histriz (Muller).

atropae Foudr.

a. *4-maculata* Ws. Kronstädter Gebirge (Deubel).

880. *Chalcoides Foudras.*

Die Arten leben meist auf Weiden, auch auf Erlenbusch finden sie sich.

nitidula L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schanta (Ormay); Borszék (c. a.).

aurea Geoffr. (metallica Duft., splendens Wse.) Oláhfalva (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Papolecz (Háromszék, Méhely).

a. *laeta* Ws. Kronstadt (Deubel).

a. *cyanea* Marsh. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

fulvicornis F. (helxines Ws.). Schässburg, Előpatak, Rátosnya, Borszék (c. a.); Hátzeg, Hermannstadt, Grossscheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mező-ég (Gyke, Záh, Bielz); Gölzenberg, Schanta, Szamosujvár (Ormay).

aurata Marsh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Plutus Latr. (chloris Foudr.). Nagyenyed, Karlsburg (c. a.).

881. *Hippuriphila Foudras.*

Modeeri L. Hátzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Marpod, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Petrozsény, Karlsburg, Rotenturm (c. a.).

882. *Orestia Germ.*

alpina Germ. Surian, Präsbe, Kerzer Gebirge, Hargita, Borszék (Bielz).

arcuata Mill. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Balánbánya, Bodzaer Gebirge, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Bucsecs, Königstein (Deubel).

carpathica Reitter. Malomviz (Hátzeg), Rotenturm, Also-Rákos, Szováta, Schässburg (c. a.).

puncticollis Reitter. Kerzer Gebirge, Borszék (c. a.).

O. puncticollis Reitter fehlt im Catalogus col. Europae etc. 1906.

Aubei All. Schiellthal, Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (c. a.); Teppe bei Also-Rákos (Deubel).

883. *Minota Kutschera.*

(*Hypnophila Foudras.*)

obesa Walzl. Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Rotenturm, Kronstadt (Kapeltenberg), Topánfalva (Erzgebirge), Rodnagelbirge (c. a.).

a. *carpathica* Heikertinger. Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelbirge (c. a.).

884. *Mantura Stephens.*

obtusata Gyll. Hátzeg (Bielz); Kronstadt, Rátosnya (c. a.).

chrysanthemi Koch. Hátzeg (Bielz).

rustica L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

885. *Chaetoenema Stephens.*

(*Tlanoma.*)

semicoerulea Koch. Hátzeg, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

concinna Marsh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

tibialis Illg. Karlsburg (c. a.); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

(*Chaetoenema* i. sp.)

compressa Letzn. Schässburg (c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

meridionalis Foudr. Hátzeg (Bielz); Grossau (Ormay); Honigberg (Altfluss, Deubel).

Mannerheimi Gyllh. Hátzeg, Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Honigberg (Deubel).

aridula Gyll. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Oláhfalva (Bielz); Grossau, Orlat (Ormay); Unter-Kerz, Karlsburg, Petrozsény, Baassen (c. a.).

arida Foudr. Rosenau-Gebirge (von Weise bestimmt, Deubel).

hortensis Geoffr. (*aridella* Payk.). Gross-Scheuern, Marpod, Oláhfalva, S.-Regen, Mezőség (Gyke, Záh, Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Hátzeg, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay), Rodna-Gebirge, Kronstadt (Deubel).

886. *Psyllodes Berthold.*

(*Psyllonima*.)

cucullata Illig. Klein-Endburg (Bielz; Nagy-Hagymás-Deubel); Schässburg (Breite, 12. August, c. a.)

(*Psyllodes* n. sp.)

Schwarzi Ws. Paringulgebirge? (c. a.); Rodnagelbirge (Schuler-Deubel)

Fridvaldszkyi Ws. Schulergebirge, Csukas-Paringul, Rodnagelbirge (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).

subaenea Kutsch. Frecker Gebirge (Serbota, Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagelbirge (c. a.); Buceacs, Königstein (Deubel).

attenuata Koch. Hätzeg, Gross-Scheuern, Holzungen, Marpold, Giesau, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Vajda-Hunya, Nagynyel, Baassen, Rodnagelbirge, Szováta (c. a.); Buceacs (Deubel).

chrysocephala L. Hätzeg (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Szamos-ujvár (Ormay).

var. **nucea** Ill. Ratosnya (c. a.).

cyanoptera Illig. Götzenberg, Fogarasch (Bielz).

napi Fabr. Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Borszék, Prászaka (bei Zalatra, c. a.); Vargyas (bei der Almäser Hölle, Deubel).

thlaspis Foudr. Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

picipes Reitenb. Kronstadt (Bielz)

cuprea Koch. Rothberg b. H., Freck, S.-Regen (Bielz).

pyritosa Kutsch. Vajda-Hunya (c. a.).

affinis Payk. Hätzeg, Neudorf bei H., Tartlau, Mediasch (Bielz); Kronstadt (Bielz, c. a.); Borszék (c. a.).

dilemarae Koch. Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

hyoscyami L. Nagy-Hagymás (Deubel).

a. **chalcamera** Illig. Karlsburg, Hermannstadt, Schässburg, Balánbánya (auf Disteln, c. a.)

luteola Muller. Hammersdorf, Előpatak Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Baassen, Büdös (c. a., auf Weiden), Erösd (am Alfluss, Deubel).

picina Marsh. Klausenburg (Bielz); Oláh-falu (c. a.).

a. **melanophthalma** Duft. Götzenberg, Fogarasch, S.-Regen (Bielz)

887. *Haltica Geoffroy.*

quercetorum Foudr. (*eruae* Oliv.). Hermannstadt (n. B.); Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hahnbach b. H. (c. a.).

lythri Aub. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg (c. a.).

tamaricis Schrank. Hätzeg, Mezőség Gyéke, Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Unter-Kerz (c. a.)

lulicola Ws. Schässburg, Klausenburg, Dees, Rodnagelbirge (c. a.)

oleracea L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auch in allen Gebirgen.

888. *Hermacophaga Foudras.*

mercurialis F. Schielthal, Götzenberg (Bielz); Topáufalva (Erzgebirge), Alsó-Bákos, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).

889. *Batophila Foudras.*

rubi Payk. Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Zibinsgebirge, Zool (Ormay); Paringul, Rotenturm, Balánbánya, Alsó-Bákos, Schässburg, Zalatra, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

890. *Phyllotreta Foudras.*

armoraciae Koch. Mühlbach, Gross-Scheuern (Bielz); Ilva mica (Naszód, c. a.).

exclamations Thunb. (*brassicae* Illig.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Hammersdorf, Szováta (c. a.)

ochripes Cmt. Hosszúfalú, Tartlau, Schässburg (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **cruciata** Ws. Schässburg (c. a.).

lefrastigma Con. Kronstadt, Szováta, Borszék (c. a.); Buceacs (Deubel)

flexuosa Illig. Hammersdorf, Holzungen, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Schässburg ist irrtümlich unter die Fundorte der *flexuosa* aufgenommen worden also zunächst zu streichen.

a. **fenestrata** Ws. Kronstadt (Mit der Stammform Deubel)

sinuata S.eph. Hätzeg, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Rodnagelb. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **monticola** Ws. Hätzeg (c. a.).

undulata Kutsch. Fogarasch, Mezőség Záh, Bielz); Hätzeg, Kronstadt (Gespreng, Zinne, Schässburg, Borszék, Ilva mica (Naszód), Zalatra (c. a.), Rodnagelb., Bodzaer Gebirge (Deubel), Erzgebirge (Müller).

vittula Reitenb. Hätzeg, Kronstadt (Gespreng, Bielz); Schässburg, Ratosnya, Klausenburg, Bistritz, Rodnagelbirge, Erdősd (Schuchert, c. a.)

nemorum L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

atra F. (*aterrima* Schrank, *punctulata* Marsh.). Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzungen, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Baumgarten, Klein-Pold, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (c. a.), Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

- cruciferae** Goeze (*obscura* Illig.). Holzmengen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Unterkerz, Kronstadt (Giespreng). Schässburg, Dees (c. a.); Rodnagebirge, Bistritz (Müller).
- aerea** All. (*punctulata* Foudres.). Unterkerz, Schässburg (c. a., in Gärten jungen Pflanzen schädlich, Erdflöhe).
- diademata** Foudr. Unterkerz, Schässburg, Ivamika (Naszód, c. a.); Schulergebirge, Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).
- procera** Reitenb. Retjezat, Hermannstadt, Klausenburg (c. a.).
- nigripes** F. Gross-Scheuern, Mezöség (Záh, Bielz); Vajda-Hunyad, Marosúvár (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

891. *Aphthona Chevrolat*.

Aphthona cyparissiae, Koch. ist aus unserem Verzeichnisse zu streichen, da die Art durch einen Irrtum meinerseits in dasselbe gekommen ist.

- abdominalis** Duft. (*albinea* Thoms.). Hätzeg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Schässburg (c. a.).
- pallida** Bach. Kronstadt (Zinne, Méhely).
- lutescens** Gyllh. Schässburg (Fuchsloch, c. a.); Honigberg am Altfluss (Deubel).
- violacea** Koch. Gross-Scheuern, Marpod (Bielz); Honigberg am Altfluss (Deubel).
- venustula** Kutsch. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Schulergebirge, Rosenauegebirge, Tepe bei Alsó-Rákos (Deubel); Torda (Müller).
- pygmaea** Kutsch. (*atrocoerulea* Thoms.) Kronstadt, Tartlau (Bielz).
- cyanella** Reitenb. Vajda-Hunyad, Tordae Schlucht (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- coerulea** Geoffr. (*monstriata* Harold). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Marpod, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).
- euphorbiae** Schrank. (*hilaris* All.) Hätzeg, Gross-Scheuern, Zood, Präsche, Nussbach, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay), Kronstadt (c. a.); Erzgebirge (Müller).
- ovata** Foudr. Tartlauer Wald (Méhely); Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Bucecs, Schuler, Rosenau, Kronstadt (Deubel).
- Stussineri** Ws. Schulergebirge (Deubel, c. a.).
- atrata** All. Kronstadt (Bielz); Vajda-Hunyad (c. a.).
- herbigrada** Curt. Schässburg (Bielz); Gyógy (Ormay); Rosenauegebirge (Deubel).
- lacertosa** Rosenh. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Rotberg b. H., Kronstadt, Tartlau, Előpatak, Mezöség (Gyeke, Záh). Stollenburg, Gyógy (Bad, Ormay); Vajda-Hunyad, Zalatna, Schässburg, Baassen (c. a.).

892. *Longitarsus Latreille*.

- echii** Koch. Hermannstadt, Neppendorf, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Schässburg (April, Wietenberg, c. a.).
- Linnaei** Duft. Schässburg, Karlsburg, Rotenturm (c. a.).
- anchusae** Payk. Hätzeg, Neudorf b. H., Meliasch, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).
- obliteratus** Rosenh. Rosenau (Deubel).
- niger** Koch. Hermannstadt (Ormay, 2. Aug.); Rotenturm (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).
- parvulus** Payk. (ater Laesh.). Hätzeg (Bielz); Schässburg (17. Mai, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).
- holsaticus** L. Holzmengen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- quadriguttatus** Pontopp. Tartlau, Schässburg (Bielz); Reys (c. a.).
- apicalis** Beck. Gross-Scheuern, Héviz, Oláhfalú (Bielz); Rotenturm (c. a., Ormay); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).
- brunneus** Duft. Retjezat (Bielz); Hermannstadt, Baumgarten bei H. (Ormay); Schässburg, Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- rubellus** Foudr. (*gravidulus* Kutsch.). Kronstadt, Zinne (Deubel); Csukás (c. a.).
- luridus** Scop. Gross-Scheuern, Tartlau, Reys, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Büdös, Schässburg, Ratosnya (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).
- var. **cognatus** Ws. Kronstadt (Zinne), Dees (Méhely); Karlsburg (c. a.).
- a **4-signatus** Duft. Felső-Venice (Méhely).
- stragulatus** Foudr. Schässburg, Hätzeg (c. a.).
- lateripunctatus** Rosenh. var. **personatus** Wse.). Schässburg (Wietenberg, 1. Ex. gesiebt, 11. April, Schrankel, 20. Mai, c. a.).
- nasturtii** F. Mühlbach, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schulergebirge (Deubel); Baassen, Szováta (c. a.).
- suturalis** Marsh. Kronstadt (Deubel).
- atricillus** L. Schässburg (Schulberg, 11. April, c. a.); Kronstadt, Honigberg (Deubel).
- sutirellus** Duft. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Borszék, Balán, Schässburg (aus Kokelgeniste gesiebt 11. November); Schulergebirge, Rodnagebirge, Rosenau (Deubel).
- curtus** All. (*pratensis* All.). Mezöség (Gyeke, Bielz).

- var. *monticola* Kutsch. Kronstadt, Zinne (Deubel).
- melanocephalus* Deg. (*atricillius* Duft). Kronstadt (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, 16. Oktober); Szováta, Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Heltau (Michelsberg, Schmitt) (Ormay).
- var. *atriceps* Kutsch. (*atricillius* Foudr.) Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Baumgarten (Ormay); Kronstadt, Zinne (Deubel).
- nigrofasciatus* Goeze (*lateralis* Illig.). Karlsburg, Schässburg, Alsó-Bákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- tabidus* F. (*verbasci* Panz.). Neudorf b. H., Holzmeizen, Fogarasz, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Schulberg, 24. März; Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. *vulgaris* Ws. (*verbasci* Illig.). Gross-Scheuern, Fogarasz, Mediasch, Schässburg, Olábfalu, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- lycopsi* Foudr. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Wolkendorf (Deubel).
- pratensis* Panz. (*pasilus* Gyll.). S.-Regen (Bielz); Grossau (Ormay); Weidenbach (Méhely); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. *medicaginis* Ak. Schässburg, Borszék (c. a.).
- exoletus* L. (*femoralis* Marsh.). Hermannstadt, Grossau (Juni, August, Ormay); Paj (b. Hätzeg); Karlsburg, Schässburg, Balánbánya, Borszék, Ilva mica (Naszóli, c. a.).
- pectoralis* Foudr. Hätzeg, Kerzer Gebirge, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).
- pellucidus* Foudr. Karlsburg, Klausenburg, Nagyenved, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hätzeg (Deubel).
- aeruginosus* Foudr. Schässburg (c. a.).
- jacobaea* Waterh. (*laevis* Duft). Borszék (c. a.); Kronstadt, Hätzeg (Deubel).
- ochroleucus* Marsh. Schässburg (Bielz, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg, Oberkerz (Glasbütze), Baassen, Szováta (c. a.) (S.-Regen, Müller).
- canescens* Foudr. Hermannstadt (Juni, Ormay).

893. *Dibolia* Latreille.

- Schillingi* Letzn. Hätzeg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- femoralis* Reutenb. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (c. a.).
- Försteri* Bach. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- carpathica* Ws. Borszék, Schässburg (c. a.).
- depressiuscula* Letzn. Hätzeg (Bielz).
- rugulosa* Reutenb. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- cynoglossi* Koch. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen, Bielz; Hammersdorf, Stolzenburg, Gyögy (Bielz, Ormay).
- occultans* Koch. Königstein (Crepatura, Deubel).

894. *Apteropeda* Chevrolat.

- globosa* Illig. Gross-Scheuern (Bielz).
- orbiculata* Marsh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).
- a. *aurichalcea* Ws. Malomváz (Hätzeg); Baassen (c. a.).

895. *Mniophila* Stephens.

Lebt in Moos.

- muscorum* Koch. Schichtthal, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Seibott); Eolnagels, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

896. *Argopus* Fischer.

(*Diclerosis*.)

- Ahrensii* Germ. Götzenberg, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen (c. a.).
- (*Argopus* s. str.)
- bicolor* Fisch. (*discolor* Bielz). Klausenburg (Heuwiesen, Bielz).

897. *Sphaeroderma* Stephens.

- testaceum* F. (*cardui* Gyll.). Muhlbach, Freck, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.). Ich sammelte die Art auf *Carduus acanthodes*. Hätzeg, Zernest (Deubel).

Cryptostoma.

Hispini.

898. *Hispella* Chapuis.

- atra* L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Marjol, Fogarasz, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Hammersdorf, Grossau (Ormay); Marosváros, Baassen (c. a.); Várhegy, Försburg, Persäner Gebirge (Deubel); Bistritz (Müller).

Cassidini.

899. *Hypocassida* Weise.

- subferruginea* Schrank. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kron-

stadt, Tartlau, Mediasch, Dees, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

900. *Cassida* Linné.

(*Odontionycha*.)

fasluosa Schall. Hátszeg, Mühlbach, Heltan, Girelsau, Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

(*Odontionycha* i. sp.)

canaliculata Laich. (austriaca F.). Mühlbach, Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.); Mező-Záh (Deubel).

viridis L. (equestris F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

hemisphaerica Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Talmesch, Schässburg (Bielz).

(*Mionycha*.)

azurea F. (ornata Creutz, lucida Sulfr.) Gross-Scheuern, Tartlau (Bielz), Schässburg (c. a.); Vargyas, Mező Záh (Deubel).

splendidula Suffr. (subreticulata Suffr.) Hátszeg, Holzmengen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

margaritacea Schall. Hátszeg, Hermannstadt (a. B.), Talmesch (Bielz); Hermannstadt (Ormay), Puj (b. Hátszeg), Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Deubel).

(*Cassida* i. sp.)

Murraea L. Retjezat, Mühlbach, Hammersdorf, Porese-t. Surul, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Mirisló (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg, Schässb., Baassen (c. a.); Holc-Rong, Babarunka-Tal (Deubel).

atrata F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt, Rakovitz (Ormay); Rotenturm, Baassen (c. a.); Bistritz (Müller).

denticollis Suffr. Zalatna, Schässburg (c. a.).

rufovirens Suffr. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Zalatna, Klausenburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

stigmatica Suffr. Mezöség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

sanguinolenta Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Schässburg (c. a.).

prasina Illig. (chloris Suffr.). Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zime, Deubel).

sanguinosa Suffr. Hátszeg, Holzmengen, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz).

rubiginosa Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezöség (Záh, Bielz); Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

ferruginea Goeze. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Freck, Elő-patak, Schässburg, S.-Regen (Bielz).

vibex L. Mühlbach, Hermannstadt, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Oláhfalv, Dees (Bielz); Klein-Pold (Ormay); Reys (c. a.).

a. **pannonica** Suffr. Kronstadt (Deubel).

nebulosa L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, S.-Regen, Dees, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz); Klempold, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Marosujvár, Klausenburg (c. a.).

flaveola Thunb. Hátszeg, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

nobilis L. Durch das Berg- und Hügel-land verbreitet.

vittata Villers (oblonga Illig.). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).

LXX. Lariidae.

Lariini.

901. *Spermophagus* Steven.

sericeus Geoffr. (cardui Boh.). Durch das ganze Berg- und Hügel-land, namentlich auf Disteln.

Küsteri Schilsky. Karlsburg (c. a.).

variolosopunctatus Gyll. Hermannstadt (Bielz).

902. *Laria* Scopoli.

(*Mylabris* Geoffr., *Bruchus* L.)

loti Payk. Hátszeg, Girelsau, Marpod (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Torda (Müller).

pallidicornis Boh. Hátszeg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Alsó-Bákös (Tepe, c. a.).

tristricula Fahr. Gross-Scheuern (Bielz); Puj (b. Hátszeg, c. a.).

atomaria L. (seminaria Bach, granaria L.). Girelsau, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Záh), Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Schässburg, Szováta (c. a.).

rufimana Boh. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau (Bielz), Schässburg (c. a.).

affinis Frölich. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Szováta, Nagyenyed, Hátszeg (c. a.).

pisorum L. *episi* L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogaräsch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S. Regen, Bistritz, Klausenburg (Bielz), Salzburg (Ormay); Nagvenyel (c. a.)

viciae Oliv. Mező-ég Gyeke, Záh) Kronstadt (Deubel); Hätzeg, Baassen, Szováta, Schässburg (c. a.)

nubila Boh. (*rufipes* Bauli) Grossscheuern, Holzungen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hätzeg, Klausenburg, Schässburg (c. a.)

luteicornis Illig. Hätzeg, Gross-Scheuern, Fogaräsch, Kronstadt, Schässburg, S. Regen, Mező-ég Gyeke, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay)

903. *Bruchidius Schilsky.*

marginalis F. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod (Bielz), Hammersdorf, Kronstadt (Deubel); Szováta, Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.); Maros-Vásárhely (Müller)

unicolor Oliv. *olivaceus* Germ., *canus* Germ.). Neppendorf, Gross-Scheuern, Marpod (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. **debilis** Gyll. (*canus* Seidl.). Baassen (c. a.).

var. **miscellus** Boh. Hätzeg (Deubel)

bimaculatus Oliv. ♀ *dispergatus* Gyll., *variegatus* Germ.). Fogaräsch, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bistritz (Deubel); Baassen (c. a.).

imbricornis Panz. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Fogaräsch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Győzy (Bal, Ormay), Kronstadt (Deubel); Schässburg, Baassen, Karlsburg (c. a.)

varius Oliv. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg, Rosenau, Kronstadt (Deubel)

pauper Boh. Talinenberg bei Kronstadt (Deubel); Baassen (c. a.)

cisti F. (*villosus* Bach, ater Redtenb.). Girelsau, Fogaräsch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne), Mező-ég Gyeke, Mchely), Schässburg, Borszék (c. a.), Rotenturm (Deubel)

Rhynchophora.

LXXI. Anthribidae.

Urodoninae.

904. *Urodon Schönh.*

suturalis F. Muhlbach (roter Berg, Bielz). **pygmaeus** Gyll. Klausenburg (Bielz).

Anthribinae.

Tropiderini.

905. *Platyrhinus Clairville.*

resinosus Scop. *latirostris* F. Zibinsgebirge, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszá, Mediasch, Schässburg, Oláhfa u. Maros-Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Oker-Kerz Glashütte), Rodnagelirge (c. a.).

906. *Tropideres Schönh.*

bilineatus Germ. Zibinsgebirge, Holzungen, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Vapla-Hunyad (c. a.).

albistrois Herbst. In den Gebirgen und im Bergland verbreitet.

dorsalis Thunb. Kronstadt an einer Hausmauer, Mchely).

marchicus Herbst. (*unctus* Payk.). Kerz (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Rodna, Hätzeg, Kronstadt (Deubel); Marosujvár, Schässburg, Borszék (c. a.).

niveirostris F. Gross-Scheuern, Präsbe, Mediasch (Bielz). Kronstadt, Hätzeg (Deubel); Schässburg, Marosujvár (c. a.).

sepicola F. Hermannstadt, Kronstadt, (Deubel).

(*Endreutes*.)

oxyacanthae Bris. Hermannstadt (Bielz).

Authribini.

907. *Platystomus Schneider.*

Macrocephalus Oliv., **Anthribus** auct.

albinus L. Hätzeg, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Nussbach, Bükszá, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Retezat, Rodnagelirge (c. a.); S. Regen (Müller)

908. *Anthribus Geoffroy.*

fasciatus Forst. Zibinsgebirge, Kronstadt, S. Regen (Bielz); Zinne (Deubel); Schässburg (c. a.).

variegatus Geoffr. (*varius* F., *nebulosus* Seidl.). Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, S. Regen (Bielz); Hermannstadt, Schauta (Ormay); Parmigul-Gebirge, Schulergebirge, Kronstadt (Deubel), Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Schässburg, Borszék (c. a.)

tessellatus Boh. Klausenburg (Bielz); Zinne (Deubel).

nebulosus Küst. Hermannstadt (Bielz); Rossau, Schulergebirge (Deubel); Klausenburg (Müller).

Choraghiul.

909. *Choragus Kirby*.

Sheppardi Kirby. Torockó. Baassen (c. a.); Kronstädter Gebirge (Deubel).

Unsere Art weicht von *Ch. piceus* Kirby der Beschreibung nach ab, ebenso nach der Vergleichung mit zwei Exemplaren von Nord-Ungarn (Brauns), stimmt aber auch mit der Beschreibung des Sheppardi nicht ganz überein, so dass die Annahme einer neuen Art vorliegt.

piceus Schaum. Zinne (Deubel).

LXXII. Curculionidae.

Otiorrhynchinae.

910. *Otiorrhynchus Germ*

(Dodekastichus.)

geniculatus Germ. Oláhfalva (Bielz); Klausenburg (c. a., am Fuss einer Erle unter Laub).

pulverulentus Germ. Schiellthal, Hunyad, Fogarascher Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schanta, Bistra (Ormay); Schulergebirge (Deubel).

a. **periscelis** Gyllh. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schuler-Gebirge, Hosszufalu (Bielz); Porkovitz (Zood-Gebirge), Bistra (Ormay); Rejczat (c. a.).

a. **conspurcatus** Stierl. Zibinsgebirge, Torockó, Topánfalva, Bistra, Vajda-Hunyad (c. a.).

a. **rumicis** Apfelb. Ober-Kerz (Glashütte), Topánfalva, Schulergebirge, Bistra (c. a.).

contractus Stierl. Rothberg b. H., Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Bistra, Paringul (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

moldoviensis Apfelb. Paring (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

(*Otiorrhynchus* i. sp.)

1. **latissimus** Stierl. Kronstadt (Bielz).

Aus der ersten Gruppe der *Otiorrhynchus* i. sp. führt Bielz auch *O. multipunctatus* Stierl. F. an, doch scheint dieser den Alpen eigentümliche Rüssler in Kronstadt nicht vorzukommen.

2.

bisulcatus F. Déva, Grosspolt, Fogarasch, Kronstadt (Zinne), Schulergeb., (Bielz); Klausenburg (Bükkwald), Torockó, Vajda-Hunyad (c. a.).

a. **longicollis** Gyll. Kronstadt (Bielz).

irritans Herbst. Torockó, Girelsau, Talmesch, Rotenturm, Kronstadt, Mediasch, Görgöny-Tal, Dees (Bielz); Götzenberg, Nagyág (Ormay); Klausenburg, Klausenburg, Borszék, Hätzeg,

Szurduk-Pass, Vajda-Hunyad (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

O. griseopunctatus Boh., den Bielz für Kronstadt anführt, scheint bei uns nicht vorzukommen.

hungaricus Germ. Déva, Vidra (Aranyos-Tal), Rothberg b. H., Kerzer Gebirg., Fogarasch, Mediasch, Dees (Bielz); Magyar-Forró u. M. Bükkös (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay); Klausenburg, Schässburg, Schulergebirge, Kronstadt (Zinne, c. a.).

Bielz führt auch *O. clavipes* Bond. (*tenebriosisus* auct. non Herbst) für Kronstadt und Schulergebirge an; doch scheint diese Angabe auf einer Verwechslung mit *O. hungaricus* Germ. zu beruhen; bedarf jedenfalls einer neuerlichen Festätigung, da mein Exemplar, das von der Zinne stammt, ein Weibchen des *O. hungaricus* ist.

niger F. Zibinsgebirge, Seliste, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Borszék, Maros-Gebirge (Bielz); Bucsecs, Rodnagelbirge (Koronis, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

a. **villosopunctatus** Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz).

a. **montanus** Boh. Kerzer Geb., Schulergebirge (Bielz).

a. ♂ **coecus** Germ. Zibinsgebirge (Bielz).

haematopus Boh. Bilargel. (Bielz); Kronstadt (c. a.).

fuscipes Oliv. Schiellthal, Mühlbacher Geb. (Verfu lui Petru), Zibinsgebirge, Seliste, Surul, Frecker Gebirge, Negoj, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schulergeb., Rodnagelbirge (Kuhhorn, Bielz); Borszék, Bucsecs (c. a., auf Fichten häufig); Nagyhagymás (Deubel).

a. **fagi** Gyllh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz).

laevigatus F. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Rodnagelbirge (Koronis, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Előpaták, Schässburg (c. a.); Vargyas (Deubel).

3.

morio F. Schnellthal, Kronstädter Gebirge, Königstein, Bucsecs, Tesla, Marosgeb. (Bielz); Paringul, Rodnagelbirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

var. **ebeninus** Gyllh. Kronstadt, Schulergebirge (Bielz).

var. **memnonius** Gyll. Bucsecs (Bielz).

6.

crinipes Mill. Tömöcher Pass (Bielz).

7.

raucus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

comatus n. sp. Zernester Gebirge (Deubel).

Otiorrhynchus comatus n. sp. Länge 5 mm. ohne Rüssel. Ein Weibchen.

Die Art gehört in die siebente Gruppe Stierlins in die Nähe des *O. lanuginosus*, von dem sie sich durch gedrungeneren Körperbau, kürzeren und dickeren Rüssel, kürzere Fühler, feiner punktierten Halsschild, deutliche Punktstreifen der Flügeldecken mit gewölbten Zwischenräumen, längere, grösseres und anders gefärbtes Haarkleid usw. unterscheidet. Dunkelbraun, Fühler

und Beine rötlichgelb. Rüssel dick, kaum länger als der Kopf, konisch, kräftig gekiebt, Augen klein wenig gewölbt. Stirne gewölbt, doppelt so breit als ein Auge, kaum breiter als der Rüssel zwischen der Fühlerinsertion. Fühler kurz, kräftig, der Schaft gegen die Spitze wenig verdickt, kaum kürzer als die Geißel, welche zur Spitze kaum merklich verdickt ist; die beiden ersten Glieder derselben gleich lang und dick, jedes etwa doppelt so lang als breit, das dritte Glied kurz, verkehrt konisch, so lang als breit, die folgenden quer, die letzten nahezu $1\frac{1}{2}$ so breit als lang. Halsschild fast etwas länger als breit, an den Seiten schwach gerundet, nach hinten wenig, nach vorne stark verengt, stark convex, mässig fein und tief, dicht, fast runzlig punktiert, etwas glänzend, mit gelbbraunlichen, schwach metallisch glänzenden, anliegenden Haaren bedeckt, die sich nicht zu Längsbinden verdichten. Flügeldecken regelmässig oval, etwa anderthalbmal länger als breit, fein chagrinirt, matt, deutlich punktiert gestreift, die Streifen vertieft, die Zwischenräume mässig gewölbt, mit heller und dunkler braunen, anliegenden, schwach metallischen Haaren etwas fleckig bekleidet. Beine kräftig, rötlichgelb, die Schienen gerade, die Vorder-schienen am Innenrande schwach zweibuchtig, an der Spitze nur nach Innen erweitert, an der Innenkante nicht gekiebt.

Deubel sammelte diese Art in einem Exemplar im Zernescher Gebirge.

Die Art hat im Habitus auch Ähnlichkeit mit der zweiten Gruppe des Subgenus *Tournoria*, da jedoch der Unterkörper verhältnismässig weniger gross, die Vorderbeine kaum kräftiger entwickelt und der Rüssel etwas länger als der Kopf ist, hatte ich seine Stellung in der 7. Gruppe des Subgenus *Otiorrhynchus* für die natürlichere. In dieser Gruppe nähert er sich in Form, Grösse und Habitus am meisten dem *O. rancus* F., von dem er aber durch längeres, punktiertes Halsschild, dünnere und feinere Behaarung und kleinere Augen verschieden ist.

8.
perdix Oliv. Retjezat, Talmatschel, Rotenturm, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Arpascher Gebirge, Schantla (Ormay); Zibinskamm, Retjezat (c. a.), Hät-szeg, Szurdok-Pass (Deubel).

10.
banaticus Stierl. Zibins-Gebirge (Mogyásza, c. a.).

chrysomus Boh. Klausenburg (Bielz).

remotegranulatus Stierl. (Peterfi Mallász); Belunata, Bihar Gebirge (Mallász).

12.
conspersus Germ. Gross-Scheuern, Birt-hältn (Bielz); Rotenturm (vidi).

13.
juglandis Apfelb. Rotenturm (Deubel, c. a.). Apfelbeck (Mit. Bosn. 1896, 518) bezeichnet die Schenkel als ungezähnt. Mein Exemplar aus dem Rotenturm und ein zweites von Rhodus besitzen an den Vorderschenkeln zwei dicht nebeneinander liegende, zwar sehr kleine, aber deutliche, scharfe Körnchen.

14.
Ormayi Stierl. (Schweizer ent. Ges. Bd. 8 H. 1.). Porumbacher Gebirge (Sereci, hochalpin, Ormay).

mandibularis Redtenb. Örkény (Unter-weissenburger Komitat, c. a.)

var. granulatus Boh. Klausenburg (Bielz).

16.
dacicus Dan. (*costipennis* Stierl.) Zibins-gebirge (Zibinsjaser, Sterpa). Kerzer Gebirge (Bielz); Präsche, Arpascher

Gebirge (Ormay). Retjezat, Bistra, Frecker Gebirge (Serbotai), Ober-Kerz-Glashuten, Buesses, Rotenturm (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

Nach den Untersuchungen Dr. Daniels (studien 2) kommt *O. costipennis* Rosenh. bei uns nicht vor, da Stierlin denselben nicht gekannt hat. Es gehören also die Fundorte des *O. costipennis* Rosenh. bei Bielz zu *O. costipennis* Stierl. = *O. dacicus* Dan.

albensis n. sp. *Ompolytzatal* bei Zalánna (c. a.).

Otiorrhynchus albensis n. sp. Länge 6 mm. *O. dacicus* Dan. proximus et similis, satissimum differt rostro tenuiore, longiore, subelyndrico, antennis longioribus, gracilioribus, fun-culi articulis ultimis haud transversis, oculis paulo minoribus, prothorace haud sulcato, minus dense irregulariter granulato, granulis paulo maioribus, elythrorum interstitio 2^o et 4^o a sutura plano, ceteris omnibus costis, setulis costarum suberectis, reclatis, fere spatuliformibus, pedibus gracilioribus, longioribus.

1 specimen. Habitat velle ompolyzense prope locum transylvanicum Zalánna.

Einem kleinen *O. dacicus* Dan. der mir von verschiedenen Orten (Buesses, Retjezat, Kerzer Gebirge, Bistra, auch von den Banater Bergen (Merk) vorliegt, recht ähnlich, aber meiner Ansicht nach wegen der obigen Unterschiede kaum als Varietät des *O. dacicus* anzusehen, wie Dr. Karl Daniel, dem ich ein Exemplar der Varietät dieser Art zur Ansicht vorlegte, vorgeschlagen hat.

Der Käfer ist pechschwarz, matt, die Fühler, Schienen und Tarsen rötlichgelb. Rüssel und Fühlerschaft sind mit kurzen, dicken Schuppenborsten nicht sehr dicht bedeckt, der letztere ausserdem mit ziemlich langen etwas abstehenden Porsten. Alle Geisselglieder der Fühler sind mindestens so lang als breit, das erste und zweite am Länge kaum verschieden, jedes von ihnen etwa doppelt so lang als breit, das dritte etwas kürzer als das zweite, aber nicht dicker und viel länger als breit, die folgenden etwas kürzer, aber nicht dicker werdend, abstechend beart. Kopf und Rüssel sind weniger dick als bei *O. dacicus*, der letztere auch länger und von den Augen bis zu den Pterygien äusserst schwach konisch, sein Rücken flach gefurcht, in der oberen Furche fein gekiebt, die Seitenränder der Furche an den Seitenrand des Rüssels gerückt, so dass derselbe dreikeilig erscheint. Die Stirne ist schwach vertieft an der Rüsselbasis, wenig gewölbt und deutlich breiter als das flache Auge. Der Halsschild ist dem des *O. dacicus* ähnlich, aber etwas weitläufiger mit etwas grösseren Körnern von gleicher Grösse bedeckt, eine Mittelfurche nicht erkennbar, jedes Korn trägt ein niedergebogenes dickes Schuppenborstchen, die zusammen die schwarze Grundfarbe nicht beeinträchtigen. Die Flügeldecken sind mit vereinzelten runden grauen Schuppen bedeckt, auf den erhalteneren Zwischenräumen befindet sich eine einfache, regelmässige Körnerreihe und jedes Körnchen trägt ein an der Spitze schwach spatelförmig erweitertes, rückwärts gebogenes Borstchen. Nur der zweite und vierte Zwischenraum der Nahtzwischenraum mitgerechnet ist vollkommen flach und vollkommen ungekornet, die übrigen alle gleichmässig rippenförmig erhaben. Die Beine sind schlanker und deutlich länger als bei *O. dacicus*.

Ein zweites Exemplar aus Topánfalva im Erzgebirge, welches Dr. K. Daniel ebenfalls als Varietät zu *O. dacicus* stellte, betrachte ich als Varietät dieser Art. Durch die dichte, graue, äusserst schwach metallische Beschuppung der Oberseite gewinnt sie grössere Ähnlichkeit mit ähnlich beschuppten *O. dacicus*, aber in der Rüsselform, den schlanken Fühlern und Beinen dem kleinere Kopf und in dem Fehlen der Halsschildmittelfurche stimmt sie mit der neuen Art vollkommen überein. Ich führe sie als Varietät **obductus** n. ein. Auch bei der Va-

rietät ist nur der zweite und vierte Zwischenraum der Punktreifen auf den Flügeldecken flach, die übrigen gerippt, aber ausser der Körnchenreihe auf den Rippen sind Körnchen auch in den Punktstreifen, vereinzelt auch noch auf den flachen Zwischenräumen bemerkbar.

var. **obductus** n. Topánfalva (c. a.).

antennatus Stierl. Paringul, Surian, Mühlbacher Gebirge (V. I. Petru.). Zibinsjaser, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

var. **Rosenhaueri** Stierl. Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Vunetoare), Negoi (Schutzhütte, Deubel).

aratus Dan. Bucsecs (c. a.).

cosmopterus Dan. Zernestgebirge, Königstein (Deubel).

scaber L. (septentrionis Hbst.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

proximus Stierl. (tatricus Reitter). Frecker Geb. (Serbota), Balánbánya, Schullergebirge, Borszék, Paringul, Rodnagel. (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

Da Bielz den nahe verwandten *O. carpathicus* Dan. nicht kannte und daher Fundorte des *O. carpathicus* und *proximus* durcheinander geworfen sein dürften, führe ich nur die seit Bekanntwerden der neuen Art festgestellten Fundorte für beide an.

carpathicus Dan. Bucsecs, Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea-Tal, c. a.); Bodzaer Gebirge, Schullergeb. (Deubel).

hypsiatus Ganglb. Rodnagel. (Deubel, c. a.); die Art wird oberhalb der Baumregion aus Gräsbüscheln gesehen; Schullergebirge (Deubel).

18. **dubius** Ström (maurus Gyll.). Schanta (Ormay); Rodnagel. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Bodzaer Gebirge, Negoi (Schutzhütte), Bucsecs (Deubel).

19. **lithanthracius** Boh. Zibinsgebirge (Bielz); Hätzeger Gebirge (alpin, Deubel).

denigrator Boh. Zibinsgebirge (Zibinsjaser, Negovan, Bielz); Bucsecs, Paringul, Retjezat (c. a.).

var. **Ocskayi** Stierl. Siebenbürgen.

glabratus Stierl. Schellthal, Măla Torda, Marosgebirge, Cibiles, Surian, Zeidner Berg, Kronstadt, Rosenau, Bucsecs, Piatra mare, Tesla (Bielz); Zalatna, Topánfalva, Retjezat, Schuller-Gebirge, Alsó-Rákos (c. a.).

20. (Dorymerus.)

rotundatus Siebold (seductor Stierl.). Schässburg (Schullerg., Siebhofwald, Fuchsloch unter Laub), Vajda-Hunyad, Alsó-Rákos (c. a.); Karlsburg (von Hauptmann Zellich, Deubel).

Die Vergleichung eines aus Danzig stammenden *O. rotundatus* mit dem siebenbürgischen *O. seductor* Stierl. hat die Identität der beiden Arten ergeben, da ich zwischen denselben keinen Unterschied auffinden konnte; die Art besitze ich auch aus Kärnten von Herrn Stierlin.

22. **Kollari** Gyll. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Csiker Geb. (Balánbánya).

Borszék (Bielz); Retjezat, Rotenturm (c. a.).

a. **Küsteri** Stierl. Kronstädter Gebirge (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Bistria (c. a.).

a. **Bielzi** Küst. Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgeb. (Bielz).

Deubeli Ganglb. Rodnagel. (Deubel, Ganglbauer, c. a.); der Käfer scheint im Juni nicht selten zu sein.

Kuenburgi Stierl. Kronstädter Gebirge, Königstein (Bielz).

Schaumi Stierl. Kerzer Gebirge, Csiker Gebirge (Balánbánya, Ócsém, Bielz); Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagel., Schullergebirge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

equestris Richter (aerifer Germ.). Nagybagymás, Kronstadt (Deubel); Klausenburg, Borszék (c. a.).

austriacus F. Schellthal, Gölínest, Csib, Vidra (Aranyostal), Zood, Kronstadt, Schullergebirge (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay).

var. **carinatus** Gyll. Klausenburg (Bielz).

Méhelyi Stierl. (Schweizer Mitt. 1895, 300). Hermannstadt, Tordaer Schlucht, Szurdok-Pass (c. a., am letzteren Orte an den Steinen der Strassenstützmauern gesammelt).

O. Méhelyi Stierl. scheint sich von *O. austriacus* F. nur durch dickere, kürzeren, nach vorne konisch verengten Rüssel und etwas bedeutendere Grösse zu unterscheiden; dann dürfte *O. austriacus* bei uns gar nicht vorkommen und die Fundorte des *austriacus* wären auf *O. Méhelyi* zu übertragen.

amplius Petri. Kronstadt (c. a.).

obtus Boh. Rosenauer Geb. (c. a.).

Mein Exemplar wurde von Herrn Ganglbauer als *O. graniventr* Mill. bestimmt, dessen Beschreibung aber durchaus nicht passt.

graniventr Mill. Csiker Gebirge (Balánbánya, Ócsém, Nagybagymás, Bielz).

23. **longiventr** Küst. Zibinsgebirge (Zibinsjaser, Sterpu), Arsur, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge (Bielz, c. a.).

Schon K. Fuss stellte fest (Verh. u. M. s. V.), dass die subalpine Form des *O. longiventr* in der Regel mehr-weniger beschuppt sei, während die Tiere oberhalb der Baumregion in der Regel unbeschuppt seien, fand jedoch keine weiteren Unterschiede. Meine Untersuchungen ergaben zwar einige Unterschiede, die jedoch nicht bei allen Tieren in gleichem Masse zur Entwicklung gelangen, sondern einen deutlichen Übergang von der alpinen zur subalpinen Form erkennen lassen.

Oberseite der alpinen Form in der Regel unbeschuppt, aber immer mit spärlichen, feinen Borstenreihen auf den Zwischenräumen, ausserdem zuweilen mässig dicht behaart, gegen die Basis etwas sparsamer, aber die Haare kaum schuppenförmig, oder gegen die Spitze zerstreut schuppenförmig behaart, die Schuppen aber viel schmaler, sehr selten fast so gross (Paringul), wie bei der subalpinen Form.

24. Beine kürzer, kräftiger, stärker keulig verdickt, Hintersehnen breiter und kürzer. Innenrand im Basisviertel stark, im 2. und 3. Viertel

schwächer, aber deutlich gebuchtet, der Ausschnitt vor der Spitze wie bei der subalpinen Form.

♂. Kopf und Küssel dicker, letzterer bis zu den Pterygien stärker verjüngt. Hinterschenkel breiter, zur Spitze bald stärker, bald schwächer allmählich erweitert und bald deutlich, bald schwächer gegen die Spitze nach hinten gebogen.

Csiki hat Weibchen mit stark gebogenen und erweiterten Hintertibien als *O. Fussianus* beschrieben, die allerdings grosse Ähnlichkeit mit den Hinterschenkeln des Weibchens von *O. Bessi* und *O. graniventris* besitzen, doch sind die Hinterschenkel des ersteren und die Beine überhaupt bei den Weibchen viel kürzer und kräftiger, die Fühler deutlich kürzer und kräftiger, die letzten Geisselglieder nicht länglich wie bei *longiventris*, sondern rundlich; doch ist immerhin die Unterscheidung der Weibchen beider Arten schwierig.

Die alpinen Tiere meiner Sammlung stammen vom Bulea-See und der Vunetare im Kerzer Gebirge und von Karsia im Paringulgebirge, die subalpinen aus der nächsten Umgebung der Kerzer Glashütte. Die alpinen Tiere wurden aus Grashüscheln gefischt oder unter Steinen gesammelt, während die subalpinen auf Brennnesseln leben.

Riessi Fuss. Kronstädter Gebirge, Buceses, Csiker Gebirge (Bielz).

25.

corruptor Host. (giraffa Germ.). Kronstadt (Bielz).

polycoccus Gyllh. Balánbánya (Vigyázókő, 1 ♀, Mchely).

curvipes Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

rugosus Hummel. Kronstadt (Bielz)

26.

alpigradus Miller. Borszék, Czibles (Bielz); Rodnagelbirge (c. a.).

granicollis Boh. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

a. **pictus** m. Retjezat

O. granicollis a. **pictus** kommt mit der Stammform vor, ist aber an den Seiten der Flügeldecken, namentlich gegen die Spitze hin, mit Gruppen oder einzelnen weissen, schmalen schuppenförmigen, aufliegenden Haaren gezeichnet.

var. **Paringii** n. Paringulgebirge (c. a.).

O. granicollis var. **Paringii** (c. a.) ist kleiner und schlanker als die Form vom Retjezat, die Flügeldecken sind deutlicher gestreift und gegen die Spitze mit vereinzelten runden Schuppen gezeichnet, die breiter sind als bei a. **pictus** oder *O. longiventris*, in den Streifen gekörnt, die Hinterschenkel etwas stärker gezähnt. Von dem ♂ des *O. longiventris*, für welche Ganglbauer diese Form irrtümlich hielt und dem sie sich in der Skulptierung der Flügeldecken nähert, unterscheiden durch die Form und Skulptierung des Rückens, kräftigere Fühler, viel kürzeres 2. Geisselglied, schwächere Bezeichnung der Vorderchenkel, runzig granuliertes Abdomen und den Mangel der sexuellen Auszeichnung der Hinterbeine. Die Form der weiblichen Hinterschenkel nähert sich der des weiblichen *O. Fussianus*.

Krattereri Boh. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagelbirge (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Buceses, Schulergeb. (c. a.); Nagybagmäs (Deubel).

var. **egregius** Mill. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Schuler Gebirge (Bielz); Nussbach, Rodna-Gebirge, Buceses (c. a.).

corvus Boh. Siebenbürgen (Stierlin).

Moesaryi Csiki (montigena Friv.). Görgegy, Oláhfalv (c. a.).

asplesii Mill. Hargita (Mezőhavas, Bielz); Rodnagelbirge (c. a.).

var. **seriepunctatus** m. Rodnagelbirge (c. a.).

O. Asplenii var. **seriepunctatus**. Der an dem kurzen, konischen Küssel und der rechtwinkligen Aussackung der Vorderbeine am sichersten erkennbare *O. Asplenii* ist in der Skulptierung der Flügeldecken variabel. Bei unseren *O. Asplenii* ist die Stierlin'sche Skulptierung selten deutlich ausgeprägt. Besonders auffallend ist eine Form mit fast vollkommen ebenen, glatten Flügeldecken (c. a.) mit Reihen länglicher, tiefer, scharf begrenzter Punkte, deren Zwischenräume sehr breit und vollkommen eben sind. Ich habe sie mit dem obigen Namen belegt.

obsidianus Boh. Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Persanyer Gebirge, Kronstadt, Schulergebirge, Tömöscher Pass, Piatra mare, Hosszufalu, Dongókő, Kelemengeb., Borzoe Pass, Rodnagelbirge (Koronj-s), Lajoscher Gebirge (Oláh-Lajosbánya, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay), Nagybagmäs (Deubel).

27.

dives Germ. Retjezat, Zilinsgebirge, Galbina, Götzenberg, Präsbe, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Marosgebirge, Gyalu (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bistra, Malomviz, Gârbova, Topánfalva, Puj (bei Hatszeg, c. a.).

Die 4 Arten der 27. Gruppe, welche durch Bielz wohl nur irrtümlich durch *O. gemmatus* Scop. vermehrt wurde, da diese Art dem Alpengebiet angehört, lassen sich als solche nicht, auch kaum als Varietäten aufrecht erhalten, da die Uebergänge von der einen zur anderen so mannigfaltig sind, dass sich typische Stücke für die einzelnen Arten selten rein finden. *O. cymophanus* Germ. lagert wohl auf grösseren Weibchen der, dies mit weniger gewölbten Rücken der Flügeldecken. Die Skulptur des Rückens, der Flügeldecken und des Abdomens variiert, ebenso die Stärke des Vorderchenkelzahnes, welchem a. immer schwächer ist als beim ♂; in der Penisform finde ich keine Verschiedenheit. Es wird sich wohl empfehlen, als Stammform *O. dives* Germ. anzunehmen mit mehrweniger dicht beschnittenen Halschild- und Flügeldecken-seiten und mit undeutlich punktierten Flügeldeckenstreifen; dazu gehört als Synonym *O. cymophanus* Germ. Als Varietät kann *O. Fussi* hierauf aufgefasst werden mit sparsam und gleichmässig beschnittenem Halschild, auf den Flügeldecken bilden die Schuppen zerstreute, kleine Flecken; die Streifen der Flügeldecken sind deutlicher und tiefer punktiert, die Vorderbeine etwas kräftiger und ihre Schienen beim ♂ tiefer zweibuchtig, so dass sie am Innerrande oft stumpf gekantet erscheinen. Der Küssel ist bald flach, bald gefurcht mit oder ohne Krl. Elens beschnittenen Stücke mit tieferen, fast vollständig isolierten, grubchenartigen Punkten in den Streifen bilden die Subvarietät *O. opulentus* Germ., wie es scheint stets ♂ des *O. Fussi*. Nach den Vertretern meiner Sammlung findet sich *O. dives* Germ. mit seinen Varietäten an folgenden Orten:

dives Germ. a. **cymophanus** Germ. a. Retjezat, Malomviz, Puj b. Hatszeg, Bistra, Szarduk-Pass, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Topánfalva, Gârbova (Zilinsgebirge).

var. **Fussi** Kuster. Rotenturm, Zilinsklamm, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Schuler Gebirge, Thordaaer Schlucht, S'ofán, Borszék, Rodnagelbirge.

a. **opulentus** Germ. Retjezat, Arpascher Gebirge, Szardukpa, Malomviz, Rodnagelbirge, Borszék, **cymophanus** Germ. Zilinsgebirge, Kerzer gebirge, Oláhfalv (Bielz).

opulentus Germ. Alsó-Grohoi, Oláhfalva (Bielz); Arpascher Gebirge, Rodnagel., Retjezat, Borszék, Szurduk-Pass (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

Fussi Küst. Schielthal, Kerzer Geb., Kronstadt, Schulergebirge, Piatra mare, Borszék, Marosgebirge, Borgoer Pass, Klausenburg (Bielz); Götzenberg, Schanta (Ormay); Szováta, Tordaer Schlucht, Zibinsklamm, Rodnagel., Borszék (c. a.).

^{28.}
populeti Boh. Kerzer Gebirge (Bielz).
O. sulcatus F., der in diese Gruppe gehört, ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da die Anführung desselben für Schässburg auf einem Irrtum beruht.

auricapillus Germ. Bihargebirge (Bielz).
tristis Scop. (nigrita F.). Klausenburg (Bielz); Miriszló (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay).

^{32.}
squamosus Mill.
a. **squamulatus** Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

salicis Ström. (Lepidopterus F.). Mühlbacher Gebirge (Slmor), Präsbe, Borgoer Pass (Bielz); Schanta, Bistra, (Ormay); Borszék, Retjezat (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

tenuicornis Mill. Siebenbürgen.
Dieser Käfer ist seit Bielz in Siebenbürgen nicht mehr konstatiert worden, so dass sein Vorkommen bei uns zweifelhaft erscheint.

^{33.}
Reichei Stierl. Zood, Kronstadt (Salomons-Felsen, Bielz).

^{34.}
fusciventris Fuss. Bucsecs (Bielz); Königstein (Deubel).

var. **Scribae** Klement. Bucsecs (scheint Katalogsname zu sein, da mir eine Beschreibung dieser Varietät unbekannt ist).

rufomarginatus Stierl. Siebenb. (Stierlin).

^{35.}
Hampei Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

^{37.}
marmota Stierl. Paringul, Retjezat (c. a.); Bucsecs.

O. rugifrons Gyll.; welcher der 38. Gruppe angehört, ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da er irrtümlich in dasselbe gekommen ist. (Tithonus.)

chrysocomus Germ. Präsbe, Kerzer Geb. (Bielz); Frecker Gebirge, Retjezat (c. a.).

(Cryphiphorus.)

Ilgustici L. (subrotundatus Stierl.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **agnatus** Gyll. Unter-Tömös (Méhely).
edentatus Seidl. Schässburg, Előpatak, Schulergebirge (c. a.); Balánbánya (Deubel).

cupifer Stierl. Előpatak, Schässburg.

bicostatus Boh. Kronstädter Geb. (Bielz).

orbicularis Hbst. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kronstadt, Schulergebirge, Königstein, Me-

diasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Marosujvár, Karlsburg (c. a.).

(Tournieria.)

velutinus Germ. Siebenb. (Bielz); Karlsburg (Zellich).

fullo Schrank. (Zebra F.). Schielthal, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Hermannstadt, Klausenburg (c. a.).

subsetulosus Stierl. Siebenb. (Stierlin).

coarctatus Stierl. Hermannstadt, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Alsó-Rákös, Topánfalva (c. a.).

scopularis Hochh. Alsó-Rákös (c. a.).

pauxillus Rosenh. In allen Gebirgen im Moos, namentlich unter Fichtenreisig).
var. **rugirostris** Stierl. (Mazuræ Formanek.) Retjezat (c. a.).

maxillosus Gyll. Klausenburg (Bielz).

Nicht zu deuten vermag ich den *O. imitatus* Tourn., den Bielz vom Kerzer Gebirge anführt.

transylvanicus Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

ovatus L. In ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

Schusteri Stierl. Schulergebirge (oberhalb der Baumregion an trockenen, sandigen Stellen unter Steinen, Deubel, c. a.); Bucsecs (Deubel).

911. Stomodes Schönh.

gyrosicollis Boh. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., S.-S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Bad), Kakova (Ormay); Schässburg, Reps, Hätzeg, Vajda-Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).

912. Peritelus Germ.

leucogrammus Germ. Hammersdorf, Klausenburg (Bielz); Kronstädter Gebirge (c. a.); Petersberg b. Kr. (Talinberg, Deubel).

familiaris Boh. Kronstadt (Bielz).

913. Mylaeus Schönh.

seminulum F. Fogarasch, Reps, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Nussbach (auf Himbeergesträuch, c. a.).

rotundatus F. Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Stolzenburg (Ormay); Petersberg b. Kr. (Talinberg, Deubel).

914. Argoptochus Weise.

bisignatus Germ. Klausenburg (Bielz).

bifoveolatus Stierl. Schulergebirge (besonders auf einer Umbellifere, Deubel, c. a.).

subsignatus Boh. Mező-ér Gyeké, Méhely (Henselia).
periteloïdes Fuss. Gross-Scheuern, Marjol. Mező-ér Zah, Bielz). Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Schenkenberg im Juni gekötschert (c. a.); Hätzeg (Deubel).

915. *Phyllobius Schönh.*

glaucus Scop. (calcaratus F.) Durch das ganze Gebiet verbreitet.
urticae Degeer. Hätzeg, Retzezat, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees, Gyeké (Bielz), Hermannst. (Ormay); Schässburg, Mafonviz (c. a.).
nudus Westh. Kronstadt.
transsylvanicus Stierl. Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Schuler-Gebirge, Buceses, Borszék, Balanbánya (c. a.), Nagyharymás (Deubel).
pilicornis Deshr. Rotenturm (Ormay, von Nussbäumen); Hätzeg, Schässburg (c. a.).
hungaricus Stierl. Rotenturm, Schässburg (c. a.).
piri L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
contemptus Stev. Fogarasch (Bielz).
incanus Gyllh. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Hermannst. Ormay, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
scutellaris Redtb. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (a. Bg., c. a.); Kronstadt (Deubel).
alpinus Stierl. Buceses, Rodnag Gebirge (Koronyis, c. a.).
maculicornis Germ. Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Zalatna, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).
argentatus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
a. viridans Boh. Hermannstadt (Ormay).
psittacinus Germ. Kronstadt (Deubel).
aurifer Boh. (breviatus Deshr.). Hätzeg, Schässburg, Marienburg bei Sch., Héviz (c. a.); Kronstadt (Deubel).
lateralis Reiche. Kronstadt (Zinne, Deubel).
betulae F. Hätzeg, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
a. trivialis Boh. Schässburg (c. a.).
oblongus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auf Obstbäumen, namentlich Zwetschen und Pflaumen, häufig.
pictus Stev. Klausenburg (Bielz).
sulcirostris Boh. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
viridicollis F. Prasbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Borszék, Rodnag Gebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pomonae Oliv. Rothberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz), Rotenturm (Ormay), Klausenburg (c. a.).
viridiaeris Larch. Zabinsgebirge (Bielz) (Pseudomylocerus).
cinerascens F. Zabinsgeb. (Bielz); Schässburg (c. a.).
sinuatus F. Klausenburg (c. a.).

Brachyderinae.

916. *Polydrosus Germ.*

Bielz führt einen *P. erodius* Stierl., der sich in keinem Kataloge vorfindet, für Kronstadt an.
 (Metallites.)
impar Gozis. Rodnag Gebirge (Deubel, c. a.). (Chloroto us.)
amoenus Germ. Zool. Kerzer Geb., Harigita (Bielz), Rodnag Gebirge, Borszék, Paringul, Frecker Geb. (Serbota, c. a.), Bodzag Gebirge (Deubel). (Eulipau.)
mollis Stroem. Durch das ganze Berg- und Hügelland auf Gesträuch.
 (Thomsononymus.)
sericeus Schall. Hätzeg, Götzenberg, Rotenturm, Gross-Schenk, Buceses, Mediasch, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).
thalassinus Gyll. Fogarascher Gebirge (c. a.). (Eustous.)
flavipes Deg. Zabinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
confluens Steph. Nendorf b. H., Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay), Hummersdorf (auf Klearten, c. a.).
 Bielz führt auch *P. chrysomela* Oliv. für Klausenburg an, doch dürfte hier ein Irrtum vorliegen, da die Art dem westlichen und südwestlichen marinen Gebiete angehört.
cervinus L. Zabinsgebirge, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
pilosus Geffler. binotatus Thoms., melanos-tictus Chevrl., Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Deubel).
 (Polydrosus f. sp.)
tereticollis Deg. (undatus F.) Durch das ganze Berg- und Hügelland in Wäldern auf Gesträuch.
ruifcornis Bonsl. Rotenturm (c. a.); Zernest, Kronstadt, Rosenau (Deubel).
picus F. Durch das ganze Gebiet auf Gesträuch.
 (Tylosdrosus.)
pterygomalis Boh. Hätzeg, Götzenberg, Szombat, Kronstadt, Elopatak, Mediasch, Schässburg, Dees, Mező-ér (Zah, Bielz).
subalpinus n. sp. Csukás, Rodnag Gebirge.
 (Polydrosus (Tylosdrosus) subalpinus. *P. pterygomali* Boh. similimus, sed magis elongatus, angustior, magis parallelus, minus convexus, im-

primis autem forma clavae antennarum elongata diversus. Länge 4¹/₂ mm. 3 Exemplare.

Dem *P. pterygomalis* Boh. ausserordentlich ähnlich, aber deutlich flacher, gestreckter und mit mehr parallelen Seiten. Behaarung und Beschuppung wie bei diesem, erstere auf dem Kopfe und Halsschilde weniger lang. Fühler und Beine gelb. Das sicherste Unterscheidungsmerkmal jedoch bildet die Fühlerkeule der schlanken Fühler, welche deutlich gegliedert und wesentlich gestreckter, etwa viermal länger als dick ist, während dieselbe bei *P. pterygomalis* höchstens dreimal länger als dick ist.

Die Punktstreifen der Flügeldecken sind bei zwei Exemplaren ebenso fein wie bei *pterygomalis*, beim dritten Exemplar erscheinen die Flügeldecken etwas stärker punktiert gestreift, wodurch sich die Art dem *P. caucasicus* nähert; doch ist bei allen drei Exemplaren die absteigende gelbweisse Behaarung ebenso lang und aufrecht wie bei *P. pterygomalis*.

corruscus Germ. Hätzeg. Grossscheuern, Kronstadt, Meliasch, Schässburg, S.-Regen Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Salzburg, Nagyenyel, Klausenburg (c. a.).

viridicinctus Gyll. Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Baassen, Elöpaták, Nussbach (c. a.).

917. *Stasioidis Gozis.*

parvulus F. Oberkomana (Méhely).

918. *Sciaphobus Daniel.*

barbatulus Germ. Hätzeg (Bielz, c. a., in einem Kleefeld gekötschert).

caesius Hampei. Schässburg, Baassen, Präszaka (Zalatna, von Steinklee? geklopft, c. a.); Gyógy (Bad, Ormay); Dees (Méhely); Kronstadt (Deubel).

var. **Merkli** Stierl. Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

squalidus Gyll. Mediasch (Bielz); Karlsburg, Baassen, Schässburg (auf Obstbäumen, Ahorn, Schlehen etc. schädlich, c. a.); Nagylak (Unterweissenburger Komitat), Remete (Nagyenyed, Ormay).

919. *Scythropus Schönk.*

mustela Herbst. Zibinsgebirge, Talmatschel (Bielz).

920. *Chiloneus Schönk.*

setosulus Germ. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Mezőszék Gyeke, Bielz); Hätzeg (Deubel).

921. *Sciaphilus Stephens.*

Bielz führt für Siebenbürgen auch *S. costulatus* Kiesenw. an, was wohl auf einem Irrtum beruht.

asperatus Bonsdorf (*unicatus* F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, unter Laub.

922. *Paophilus Faust.*

Hampei Seidl. Hammersdorf, Hermannstadt, Marpod, Freck, Porumbach, Fogarasch, Schässburg, Klausenburg (Bielz).

afflatus Boh. Siebenbürgen (Besitz gelbe Schienen und Tarsen, bei Hampei sind sie schwarz).

923. *Brachysomus Stephens.*

(*Platytarsus* Schönh.)

Unaufgeklärt bleibt *Br. Hopffgarteni* Tourn. welchen Bielz für Siebenbürgen anführt.

transsylvanicus Seidl. Hermannst., Heltau, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schulergebirge, Alsó-Rákös, Schässburg, Elöpaták (c. a.).

setiger Boh. Kronstadt, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Hätzeg, Elöpaták, Schässburg (c. a.).

villosulus Germ. Hammersdorf (Bielz); Kalán, Karlsburg, Schässburg, Vajdahunyad (unter den Weingärten aus alten Rebenhaufen gesiebt).

hirtus Boh. (*setulosus* Boh.). Gross-Scheuern, Marpod, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Hammersdorf, Alsó-Rákös, Schässburg, Hätzeg (c. a.).

echinatus Bonsd. Gross-Scheuern, Fogarasch, Elöpaták, Schässburg (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Zellichi Formanek. Karlsburg (c. a.).

hispidus Redtenb. Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Schuler (Deubel).

924. *Pseudoptochus Formanek.*

aurohirtus Seidl. Hermannstadt (Ormay).

925. *Foucartia Duval.*

squamulata Herbst. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz).

926. *Barypithes Duv.*

globus Seidl. (♂ *sphaeroides* Seidl.). Klausenburg (Bielz); Rotenturm (aus dem Wurzelwerk einer Labiate (*Melissa*) gesiebt, c. a., Ormay).

armiger Dan. Hammersdorf (unter Laub, c. a.); Wolkendorf b. Kr., Kronstädter und Rosenauer Gebirge, Alsó-Rákös (Tepe, Deubel).

Chevolati Boh. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Gyógy (Bad, Ormay).

Da Bielz und Ormay den nahe verwandten *B. armiger* Dan. nicht kannten, ist es sehr wahrscheinlich, dass *B. Chevolati* bei uns gar nicht, sondern nur ersterer vorkommt.

mollicomus Ahr. Kronstadt (Bielz).

927. *Ombas Schönherr.*

Hanaki Friv. Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.)

var. **montanus** n. v. Borszék, Radosnya, Balánlány, Egyesko, c. a.)

O. Hanaki n. **montanus** n. v. Bei der Varietät, die im J. v. 1861 49 Exemplare sammelte, sind an sämtlichen Tieren zwei sehr unregelmäßige und mehr oder weniger deutliche zu beobachten. Da diese Varietät im Perl mit Ombas Radosnya übereinstimmt, hegt die Vermutung nahe, dass letzterer nur eine Raute des O. Hanaki sei, da meine Tiere sich nur wenig von der Stammform wenig unterscheiden.

mollinus Boh. Paringul, Rodnagelbirge (c. a.), Kronstadt (Deubel).

pyrorhinus Dan. Hermannstadt (Ormay).

maxillosus Petri. Schässburg, Karlsburg Szováta, Präska Zalatna, Topánfalva (c. a.).

928. *Strophosomus Stephens.*

melanogrammus Förster (coryli F) Durch das ganze Gebiet auf Gebüsch und unter Laub.

(Neivocarus.)

lateralis Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz).

929. *Eusomus Germar.*

ovulum Germ. Durch das ganze Berg- und Hügelland.

930. *Mesagroicus Schönh.*

obscurus Boh. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Holzmeier, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz). Rotenurm, Stolzzenburg (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

931. *Sitona Germar.*

cambricus Steph. Neulorf b. H. (Bielz). **regensteinensis** Herbst. Reys, Bükszäd (Bielz).

tibialis Herbst. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Bükszäd, Schässburg, Oláhfalva (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Előpatak, Rodnagel, Karlsburg (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

a. **umbiguus** Gyllh. Előpatak, Hermannstadt, Oláhfalva, Bükszäd, Schässburg, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.)

elegans Stierl. (nec Gyllh., Flecki Csiki). Schässburg (Stechenberg, 2. April, c. a.).

Sitona elegans Stierl. Flecki Csiki.

Diese Art sammelte ich in fünf Exemplaren unter Laub. Sie ist sicher zu unterscheiden von S. tibialis Hbst. Der Kopf ist stets wesentlich kleiner, schmaler, mit den Augen kaum höher als der Halsschildvorderrand; die Stirne ist deutlich vertieft, bei tibialis flach und in einer Ebene mit dem oberen Augenrand, bei dieser Art überragt der obere Augenrand deutlich die Stirne. Der Rüssel ist schmaler und

besitzt auf der Spitzenhälfte eine glänzende, in der Mitte fein punktierte und gekielte Area, welche bei tibialis kleiner, grob punktiert und ungelappt ist. Die Flügeldecken sind an den Seiten parallel oder sehr schwach nach hinten verengt, die Schultern eckiger, schärfer vortretend, die Punktstreifen feiner, weniger vertieft und viel feiner punktiert, die Zwischenräume flach, die Schuppen der Flügeldecken wesentlich feiner, gleichmässiger und dichter verteilt, weisslich oder schmutzig weiss, schwach gelblich, auf dem vierten Zwischenraume und deutlich wenig dichter und heller. Die Beine, die Schenkel wenig dunkler.

Der Vorderrand der Vorderbrusthöhle ist nur undeutlich von der Halsschildbrusthöhle getrennt.

lineatus L. Gross-Scheuern, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt.

Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay);

Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

suluralis Steph.

a. **elegans** Gyllh. Kronstadt (Deubel).

a. **lateralis** Gyllh. Hätzeg, Fogarasch,

Kronstadt, Előpatak (Bielz); Hammers-

dorf (Ormay); Unter Kerz (c. a.);

Zalozon, Vargyas (Deubel)

sulcifrons Thunberg.

Bei uns kommt S. sulcifrons Thunbg. in der Stammform mit flacheren Augen und vertiefter Stirne nicht vor; Herr Dr. Krauss aus Marburg hebt aus Unterschied von sulcifrons nur die stärker gewölbten Augen hervor, erwähnt jedoch die ganz ebene Stirne nicht, welche bei belgischen, böhmischen, auch noch ungarischen Stücken tief ausgehöhlt ist und zur Bezeichnung Anlass gegeben hat. Uebrigens halte auch ich die steinungartigen Tiere nur für eine wenig ausgeprägte Varietät. Unausgefärbte Stücke sind ganz rottingelb, Weissgefleckte Tiere, welche die a. **campestris** Herbst vertreteten, kommen auch vor; ich schlage für dieselben Namen a. **pictus** vor.

var. **Deubeli** Krauss. Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz). Hermannstadt,

Hammersdorf, Göcsej Bal, Ormay).

Petrozsény, Előpatak, Oláhfalva (c. a.)

a. **pictus** m. Hermannstadt (Ormay);

Schässburg (c. a.)

puncticollis Steph. Gyke Mészely; Puj

(Hätzeg, c. a.); Kronstadt (Deubel).

flavescens Marsh. Durch das ganze Gebiet

verbreitet.

a. **cinnamomeus** All. Kis-széki tö (Mé-

hely).

longulus Gyll. Puj bei Hätzeg, Unter-

Kerz, Zalatna (c. a.)

lineellus Bondi. Gross-Scheuern, Bük-

szád, S-hegen (Bielz). Hermannstadt

(Ormay); Schässburg, Előpatak,

Rodnagelbirge (c. a.)

Waterhousei Walton. Hermannstadt (Seid-

litz). Karlsburg (c. a.); Hätzeg,

Kronstadt (Deubel)

crinitus Hbst. Hermannstadt, Gross-

Scheuern, Kronstadt (Bielz). Karls-

burg, Unter-Kerz (c. a.)

a. **albescens** Steph. Schässburg (c. a.)

hispidulus F. Girdsau, Kronstadt, Parthau,

Schässburg, S. hegen (Bielz);

Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay);

Hammersdorf, Tordaer Schlucht (c. a.);

Schulergebirge (Deubel).

- a. **tibiellus** Gyll. Gross-Scheuern, Michelsberg, Holzmengen, Kronstadt, Reps, Schässburg (Bielz).
cylindricollis Fahr. Schässburg (Siechholberg, c. a.)
 a. **varians** Desbr. Unter-Kerz (c. a.)
humeralis Steph. Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Oláhfidu, Gyeké, Záh, Előpaták (Bielz), Hermannstadt (Ormay : Hammersdorf, c. a.)
 a. **maculatus** Motsch. Kronstadt, Mészely, Nussbach, Előpaták, Schässburg (c. a.)
inops Gyll. Gyeké, Záh (Bielz), Hermannstadt, Schässburg (c. a.)

932. *Trachyploeus Germar.*

- parallelus** Seidl. Schässburg, Marosújvár (c. a.)
laticollis Boh. Schässburg (vidi).
alternans Gyll. (scaber Reichenb., Schässburg, Tóroczkó, Baassen (c. a.); Hermannstadt (Ormay), Erősd, Kronstadt, Hátzeg (Deubel)
spinimanus Germ. Hermannstadt, Kronstadt, Birtáhn (Bielz); Schässburg (c. a.); Talinenberg, Zinne, Deubel.
scabriculus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Oláhfidu, Sachs.-Regen (Bielz); Michelsberg, Bobenturm (Ormay).
ventricosus Germ. Schässburg (3 Exempl. am Wisterlerz, 1. März und im Juni c. a.); Karlsburg (von Hauptmann Zelli, Deubel).
bifoveolatus Beck. (scaber aut., nec L.). Gross-Scheuern, Holzmengen, Reps, Schässburg, S.-Regen (Bielz)
aristatus Gyll. Hermanns alt, Gross-Scheuern, Porumbach (Bielz); Schässburg, Alsó-Bakos, Oláhfidu, Barszek, Előpaták, Unter-Kerz, Frecker Geh. (c. a.); Erősd, Kronstadt (Deubel)
Olivieri Bedel (squammatus Oliv.). Hermannstadt (Bielz).

933. *Psolidium Illiger.*

- maxillosum** F. Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Meliasch, Reps, Záh (Bielz), Nagylak (Unterweissenburger Komitat, Szamosújvár Ormay); Hammersdorf, Hátzeg, Karlsburg, Kalán (c. a.)

Cneorrhininae.

934. *Liophloeus Germar.*

Die für Siebenbürgen angeführten Arten dieser Gattung bedürfen sehr der Revision. Um diese anzubahnen, gebe ich im folgenden eine kurze Uebersicht der mir bekannt gewordenen Arten:

Nach dem in meiner Sammlung befindlichen Material besitzen wir wohl nur drei Arten. Zunächst scheint *L. Schmidtii* Boh. unserer Fauna fremd zu sein, in Schässburg wenigstens kommt er nicht vor, und wenn nach Seidlitz *L. Herbsti* und *obsequiosus* Synonyme des *L. gibbus* sind,

was ich für wahrscheinlich halte, *L. lentus* Germ. unseres Verzeichnisses aber mit *L. lipo-toviensis* Ws. identisch ist, den ich nur als die Gebirgsform des *L. gibbus* auffassen kann, da sich stichhaltige Unterschiede nicht vorfinden, so reduziert sich die Zahl unserer *Liophloeus*-Arten, einschliesslich der neuen, vielleicht guten Art, auf drei Arten mit vier Varietäten. Dieselben lassen sich nach folgender Uebersicht aneinander halten:

1. *Meta-sternum* zwischen den Mittelhüften fast so breit wie die Mittelhüften, Körper gestreckt, länglich eiförmig oder länglich, Flügeldeckbasis stets gerade abgestutzt, Schultern fast rechtwinklig vortretend, aber abgestumpft. Oberseite dicht mit gelben und braunen, oft etwas metallischen ziemlich grossen Schuppen fleckig bekleidet.

tesselatus Müll. Oberseite etwas glänzend, mit kleinen, wenig bemerkbaren, grauen Schuppen, die nur ein Drittel so gross sind als bei *tesselatus*, ziemlich unlicht bedeckt, so dass das matt glänzende Tegument überall sichtbar wird; Flügeldecken kurzer, seitlich weniger gerundet.

aquisgranensis Först. *L. aquisgranensis* dürfte identisch sein mit *S. chrysotenus* Friv. oder ihm sehr nahe stehen.

Oberseite durchaus matt, fein und dicht granuliert, mit ebenso kleinen aber dunkelbraunen Schuppen sparsam bekleidet.

var. maurus Marsh. *Meta-sternum* wesentlich kürzer als die Mittelhüften, Körper gedrungen, kurz eiförmig.

2. Flügeldecken an der Basis mehr-weniger tief ausgerandet, Stirne stets deutlich dicht, oft runzlig punktiert, Halsschild quer, 1^{te} bis doppelt so breit als lang, an den Seiten stets deutlich gerundet, nach vorne stärker als nach hinten verengt, zuweilen mit seichter Mittelfurche, nie gekielt.

Stirne mit kleinem, strich- oder punktförmigem Grübchen, Flügeldecken dicht mit heller und dunkler braunen oder grauen, selten einfärbig grauen oder grauweißen Schuppen bekleidet, Rüssel mehr-weniger deutlich fein gekielt oder ungekielt, an der Spitze halbkreisförmig eingedrückt, der Eindruck kahl und ungekielt. Form des Berg- und Hügellandes.

gibbus Boh. Oberseite sparsam mit dunkelgrauen oder bräunlichen Schuppen bedeckt, so dass die Grundfarbe sichtbar wird, Halsschild im allgemeinen etwas schmaler, Gelirnsform. Die Tiere vom Retjezat haben in der Regel runzlig punktierte, matte, die vom Schullergerlitz und Fogarascher Gebirge glänzendere, aber stets dicht und deutlich punktierte Stirn.

var. lipo-toviensis Weise. Beschuppung und Punktierung der Stirne wie beim vorigen, aber letztere tief gefurcht, Rüssel mit glatter Mittellinie, die kaum erhalten ist, ♂ sehr robust, die Schienen der Vorderbeine sehr breit, am basalen Viertel plötzlich verengt, im breiten Teile innen gerade, Vorderantennen aussergewöhnlich stark erweitert.

v. sulcifrons n. Flügeldecken an der Basis gerade abgestutzt, breiter als der Halsschild. Die Schultern seitlich ziemlich scharf vortretend, Rüssel kaum länger als der Kopf, der Länge nach mit der Stirne in einer Flucht gewölbt, die Stirne mit rundlichem Grübchen, wie lackiert glänzend, ausserordentlich fein und ziemlich zerstreut punktiert, ebenso die Rüsselbasis, Augen vollkommen flach, aus der Wölbung des Kopfes nicht hervortretend, Halsschild quer, etwa 1^{te} breiter als lang, an den Seiten etwas gerundet, nach vorne wenig stärker als nach hinten verengt, hinter dem Vorderrande schwach eingeschnürt mit feiner seichter Mittelfurche. Flügeldecken mit wenig auffallenden gelbbraunen, etwas metallisch schimmernden Schuppen bedeckt. Im übrigen dem *L. lipo-toviensis* ähnlich.

laevifrons n. sp. **tesselatus** Müll. Hátzeg (Retjezat), Götzenberg, Hammersdorf, Kerz, Gelirz?, Kronstadt, Előpaták, Mediasch, Schäss-

- burg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz);
Hermannstadt, Szamosújvár (Ormay).
var. *aquisgranensis* Först. Schässburg, Tor-
daer Schlucht (c. a.).
var. *maurus* Marsh. *triplicornis* Town.
Kronstadt (Zinne, Méhely).
Schmidt Boh. Homoród (Méhely).
Herbst Gyll. Hermannstadt, Hammersdorf,
Gross-Selenk, Kerzer Gebirge (?). Fog-
arasch, Kronstadt, Hosszufalu, Lartlau,
Mediasch, S.-Regen, Borszék, Dees
(Bielz); Rotenturm, Schanda (Ormay).
obsequolus Gyll. Fogarasch (Bielz).
lentus Germ. Hátszeg, Retezat (?). Nepp-
endorf, Gross-Scheuern, Fogarasch,
Kronstadt, Lartlau, Mediasch, Dees
(Bielz).
gibbus Boh. Malomvizi, Rotenturm, Her-
mannstadt, Schässburg (c. a.); Nagy-
hagymás (Deubel).
var. *liploviensis* Weise, Kerzer Gebirge,
Frecker Gebirge, Serbotaj, Schulerge-
birge, Borszék (c. a.).
var. *sulcifrons* n. Rodnagelberge (Deubel) (c. a.).
laevifrons n. sp. Bucecs (c. a.).

935. *Barynotus* Germar.

- obscurus* F. *murinus* Boud. Hermann-
stadt, Tomoscher Pass, Mediasch
(Bielz); Schässburg, Fuchsloch, Hecke
unter Blättern, 15. Mai, c. a.); Gyergyó-
Tölgyes, Szamosújvár (Ormay); Har-
gita, Zinne bei Kronstadt (Deubel).

Tanymacinae.

Amomphini.

936. *Thylacites* Germar.

- pilosus* F. Schässburg, Breite und Wiet-
berg, 13. April, gesiebt, c. a.; Her-
mannstadt, S.-Regen (Bielz). Fahlen-
berg bei Petersberg (Deubel).

937. *Chlorophannus*.

- gibbosus* Payk. (*pollinosus* F.). Schäss-
burg (auf Weiden, Kokelufel, c. a.).
viridis L. Hátszeg, Hermannstadt, Freck,
Fogarasch, Kronstadt, Dees (Bielz). Ma-
lomvizi, Retezat, Ujszékely (b. Sch.)
Paringul (c. a.).
a. *salicicola* Germ. Hátszeg, Hermann-
stadt, Neppendorf, Fogarasch, Kron-
stadt, Mediasch, Schässburg, Dees,
Klausenburg (Bielz). Retezat (c. a.).
graminicola Gyll. Schässburg (Bielz); Her-
mannstadt (Ormay); Nagy-Ajta, Bar-
róth (Méhely); Unter-Kerz, Karls-
burg, Ujszékely (b. Sch.), Hátszeg (c.
a.).

Tanymecini.

938. *Tanymecus* Schönh.

- palliatu* F. Durch das ganze Berg- und
Hügelland auf Brennessel).

Brachycerinae.

939. *Brachycernus*.

- loveicollis* Gyll. Mezőség (Gyeke, Bielz).

Cleoninae.

Lepirini.

940. *Lepyrus* Germar.

- palustris* Scop. (colon L.). Durch das ganze
Berg- und Hügelland auf Weiden an
süssen Gewässern.
a. *asperatus* Schaaf. (Herbich, Za-
wodsky). Boizsa Gebirge und Baróth
(Méhely).
capucinus Schall. (*binotatus* F.) Wie der
vorige verbreitet.

Cleonini.

941. *Leucosomus* Motschulsky.

- pedestris* Poda (*punctatus* Schrank.).
Durch das ganze Berg- und Hugel-
land verbreitet.

942. *Conioleonus* Motschulsky.

- glaucus* F.
a. *turbatus* Fabr. Fogarasch (Bielz).
Schässburg ist irrthümlich als Fundort dieser
Art angegeben.
exoriatu Gyll. Hermannstadt, Gross-
Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch,
(Bielz); Kronstadt (Bakaló, Deubel).
nigrosuturatus Goeze (*obliquus* F.). Mühl-
bach, Hermannstadt, Fogarasch, Kron-
stadt, Gyeke, Záh (Bielz); Maros-
Ludas (Ormay); Karlsburg (c. a.);
Alsó-Bákos (Deubel).

943. *Stephanocleonus* Motschulsky.

- microgrammus* Gyll. Klausenburg (Bielz).
Das Vorkommen dieser Art bei uns er-
scheint mir sehr fraglich, da sie dem süd-
östlichen Russland angehört; ich besitze die-
selbe aus Uralisk.

944. *Pachycernus* Schönh.

- madidus* Oliv. (*segnis* Germ.). Gross-
Scheuern, Gyeke, Záh (Bielz); Kron-
stadt (Deubel).

945. *Bothynoderes* Schönherr.

- albicans* Gyll. Klausenburg (Bielz, c. a.);
S.-Regen (Zsalemitta?, Bielz).
punctiventris Germ. Déva, Salzburg, Dees
Záh (Bielz).

946. *Mecaspis Schönh.*

alternans Herbst. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Salzburg (Deubel).

caesus Gyll. Schässburg, Baassen, Hammersdorf (c. a.).

M. alternans Hbst. und caesus Gyll. sind oft schwer von einander zu trennen. Nach der weitläufigen Punktierung der Flügeldeckenstreifen und der Zeichnung der Flügeldecken dürfte M. alternans Herbst bei uns gar nicht vorkommen.

striatellus F. (coenobita Oliv.). Hammersdorf (Bielz); Schässburg (c. a.; Persaner Gelfirge, Zernest, Kronstadt (Deubel)).

947. *Pseudocleonus Chevrolat.*

cinereus Schrank. (costatus F.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz). Pils (Nagyenyel). Karlsburg, Marosujvár (c. a.).

grammicus Panz. Kronstadt (Kreuzberg, 4. April, Deubel).

Ps. graminicus Panz. kommt in Schässburg nicht vor; die Angabe beruht auf einer Verwechslung mit einem abgeriebenen Ps. cinereus.

948. *Chromoderus Motschulsky.*

fasciatus Müll. (affinis Schrank). Hátszeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Záh (Bielz); Karlsburg (c. a.).

949. *Cyphocleonus Motschulsky.*

tigrinus Panz. Mühlbach, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Nagyenyel, Szamosujvár, orményszékes Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt (Deubel).

achates Fahrs. Siebenbürgen (Schillitz).

morbillosus F. Kronstadt (Bielz).

trifulcatus Herbst. Kronstädter Gebirge, Königstein, Schässburg (Bielz); Szurdok-Pass (c. a.).

950. *Adosomus Faust.*

roridus Pall. (Fabricii Gemming) Hátszeg, Reys (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

951. *Cleonus Schönh.*

piger Scop. (sulcirostris L.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

952. *Lixus Fabricius.*

Ormay führt für Siebenbürgen L. sanguineus Rossi und Bielz, L. elongatus Germ. = fasciculatus Boh. an; ersterer soll bei Remet-Nagyenyel, letzterer in Klausenburg gesammelt worden sein. Ich halte das Vorkommen beider Arten bei uns für nicht wahrscheinlich.

paraplecticus L. Reussner Teiche. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Gyeke, Záh (Bielz, auf Wasserpflanzen).

canescens Fischer. Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz, auf crambe tartarica); Mezö-Záh (Deubel).

iridis Oliv. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg, Karlsburg. Larve lebt in den Wurzeln und Stengeln einer Umbellifera, (c. a.); Mezö-Záh, Honigberg (am Altfluss, Deubel).

myagri Ol. Hermannstadt, Holzmengen (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Reys 1908 (Deubel).

subtilis Sturm. Schässburg, Dees (c. a.).
difficilis Cap. costirostris Scill., transylvanicus Tourn. (Bielz). Hermannstadt (c. B.), Hammersdorf (c. a.).

cylindrica L. Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz).

Ascanii L. Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.).

flavescens Boh. Karlsburg (Deubel, c. a.); Klausenburg, Baassen, Schässburg (auf Melde, c. a.).

punctiventris Boh. Schässburg (am Scheuerenberg 1 ♀ gekötschert, 23. Mai, c. a.).

algius L. Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.); Torda (Deubel).

elongatus Goeze (filiformis F.). Auf Disteln durch das ganze Berg- und Hügelland.

cardui Oliv. Mit dem vorigen durch das ganze Berg- und Hügelland.

953. *Larinus Germar.*

vulpes Oliv.

var. *orientalis* m. Baassen (c. a., 1 ♀, Mezö-Záh (Deubel)).

Als Stammform des L. vulpes Ol. sind Tiere aus Frankreich zu betrachten: Gyllenh. sind bei der Beschreibung seines L. reconditus Weibchen aus Frankreich vorgelegen (Schönh. 7. 2. 19), was hervorgeht aus „rostrum longitudine fere thoracis“, während er bei der Beschreibung seines L. maculosus (Schönh. III. 112) ♂♂ aus Frankreich, dem südlichen Russland und dem Kaukasus vor sich gehabt; dies beweisen die Worte „rostrum thorace brevius“. Die Vergleichung der französischen vulpes mit denen des südöstlichen Europa und aus Siebenbürgen ergeben einige erwähnenswerte Verschiedenheiten, welche mir genügend erscheinen für diese den Varietätsnamen L. v. orientalis in Vorschlag zu bringen. Durchschnittlich sind die osteuropäischen Tiere grösser, breiter, etwas weniger gewölbt, namentlich auf dem Halsschild; dieser ist etwas kürzer, stärker, runzlig punktiert und unebener; die Unebenheiten entstehen namentlich in der Mitte durch eine stark abgekürzte Mittelgrube hinter dem Vorderrande, die in der Regel im Grunde fein gekielt, oft aber auch obsolet ist, zwei Längsgruben zu beiden Seiten der Mittellinie auf der Scheibe, die aber auch undeutlich werden können. Die Flügeldecken sind an der Basis zu beiden Seiten des Schildchen tiefer quer eingedrückt und die Punctierung ist weniger zusammenhängend und mehr in einzelne Flecken aufgelöst. Gyllenhal in seiner

Beschreibung des *L. macule* ♂♂ bezeichnet die Zeichnung des elen treffend „Elytra — tomento favescente variegata. Antennae vix flexuosae in apice vix o. torcatae“. Die zusammenhängende, fächerförmige Zeichnung ist bei der Varietät unbedingt secondär durch Abänderung in Bielz.

brevis Herbst. Poresest, Szmul (Bielz); Herrmannstadt (Ormay); Nagybagymás (Deubel).

var. **granicollis** Boh. Schassburg (c. a.).

Da diese Varietät auch in Dalmatien und Illyrien vorkommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass *L. pollinis* Germ. (ins. spec. I. p. 388, 393) und Laich. (Tyr. ins. I. p. 229, 21) identisch mit *granicollis* Boh. ist umso mehr, da Germar den *L. sturnus* Schall. kannte, die Worte „macula scutellari grisea“ auch auf diese Art passte, und „aristo thoraci subaequali“ etc. auf *L. brevis*, die er Varietät noch angedeutet worden wäre.

latus Herbst. Kronstadt, S-Regen, Klausenburg, Fogarasch (Bielz).

L. cynarae F. wird von Bielz für Kronstadt, Sachs-Regen und Klausenburg angeführt, jedenfalls irrtümlich; dafür dürfte *L. latus*, der oft schwer von *L. cynarae* F. zu trennen und im südöstlichen Europa verbreitet ist, auch in Siebenbürgen verbreitet sein, obgleich er nicht aus Siebenbürgen nicht vorliegt. Ich beziehe die Fundorte des *cynarae* auf *latus*, bis das Vorkommen des *L. cynarae* erwiesen ist.

obtus Gyllb. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Günsau, Fogarasch, Kronstadt, Előpaták, Götzlerg, Oláhalm, Gyek (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Paj (Hätszeg), Rotenturm, Frecker Geb. (Leita), Schässburg, Baassen (c. a.); Zernest (Deubel).

minutus Gyll. Siebenbürgen (Bielz).

Ich führe diese Art mit einziger Zweifeln, obgleich Bielz keinen bestimmten Fundort angibt; doch halte ich ihr Vorkommen bei uns nicht für ausgeschlossen.

turbinatus Gyllb. Mezöség, Záh (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Baassen, Balánbánya (Paj) (Hätszeg c. a.); Kronstadt (Deubel).

sturnus Schall. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schassburg, S-Regen (Bielz); Michelsberg (Ormay), Déva, Klausenburg, Döcs, Bistritz, Rodnagerge, Balánbánya (c. a.), Nagybagymás (Deubel).

planus F. (cardiac. Oliv.). Sachs-Regen (Bielz), Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Baassen (c. a.), Kronstadt, Zernest (Deubel).

jaceae F. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S-Regen (Bielz), Miroslécs (Iorda), Szarouyár (Ormay), Déva, Nagyvenyel (c. a.).

Beckeri Petri angulatus ant. nec Gyllb.) Karlsburg (von Herrn Major Zölllich gesammelt, c. a.); Neudorf, Mediasch, Döcs (Bielz); Szarouyár (Ormay).

L. longino-tris Gyllb. kommt bei uns nicht vor, mir ist er nur aus den westlichen Mitteleuropäern bekannt geworden, während *L.*

Beckeri nicht nur in Russland verbreitet ist, sondern nur seit dem Erscheinen meiner Bestimmungstabelle des Genus *Larinus* 1907 auch aus Ungarn (also) bekannt geworden ist (Vergl. Bestimmungstabelle des Gen. *Larinus* pag. 123 und 124).

954. *Lachnaeus* Schönh.

Stolatus Mulsant

erinitus Boh. Karlsburg (von Hauptmann Zölllich, Deubel)

955. *Rhinocyllus* Germ.

conicus Fred. (olontalgicus Oliv.). Hätszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Marktschellen, Mediasch, Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Balánbánya (auf *carabus acanthoides*, c. a.), Kronstadt (Deubel)

Tropiphorinae.

956. *Tropiphorus* Schönherr.

micans Boh. Kronstadt (Bielz).

var. **obesus** Fauv. S. o. áta, Schässburg (c. a.); Tuszál, Alsó-Bákos (Deubel).

tomentosus Marsh. Zinne (Kronstadt, Deubel).

obtus Borsl. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Buesees (Bielz)

carinatus Mull. Fogarascher, Frecker und Kronstädter Gebirge, Zibinsgebirge und Zibinsjäser, Götzberg, Prasche, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Tömöseler Pass, Mediasch, Birthalm, Rodnagerge (Bielz), Repevat, Fogarasch, Unter-Kerz (Klosterteich, c. a.), Nagybagymás (Deubel)

transsylvanicus Dan. = rotundatus Dan.). Frecker Gebirge (Serbatu), Buesees, Schulergebirge, Csukás (c. a.)

T. styriacus Debel kommt in Siebenbürgen nicht vor, da das von Fanyel als *T. styriacus* bestimmte Männchen der Schlitz'schen Sammlung ebenfalls ein *T. transsylvanicus* ist.

Rhytirrhininae.

Rhytirrhini.

957. *Minyops* Schönherr.

carinatus L. Schassburg, Hermannstadt, Rotenturm (c. a.), Mezöség, Záh (Bielz), Hammersdorf, Henglerg, Kronstadt (Deubel)

var. **variolosus** F. Hätszeg, Hermannstadt, Marpod, Götzberg, Predeal, Mediasch, S-Regen (Bielz), Rotenturm (Ormay, c. a.).

costalis Schönh. Hermannstadt, Schässburg, Pilis (Nagyvenyel), Kalán, Szurdok-Pass (c. a.).

958. *Dichotrachelus Stierlin.*

Unter Steinen, selten im Mo. s.

Kimakovicii Flach. Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Paringul, Präsbe, Negoi, Bucsees, Nagyagynás (Deubel).

*Alophini.*959. *Alophus Schönh.*

triguttatus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *vau* Schrank. Hammersdorf, Schuler, Creputura bei Zernest (Deubel).

a. *Weberi* Penecke. Seidenburg.

a. *subcarinatus* Reitter. Schässburg, Rodnagelberge (c. a.).

a. *pseudelegans* Reitter. Schässburg, Karlsburg, Klausenburg, Hammersdorf (c. a.); Várhegy (Deubel).

Kaufmanni Stierlin. Retjezat, Hermannstalt, Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *Stierlini* Reitter. Porumbacher Geb. Strunga draului, Ormay.

a. *elegans* Stierl. Marosujvár (c. a.).

960. *Hylobius Schönherr.*

piceus Degeer. Biharer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Marosgebirge, Borgoor Pass (Bielz); Kronstadt (c. a.); Präsbe (bei dem Höljenkloster), Bucsees (Deubel).

abietis L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

pinastri Gyll. Kerzer Gebirge, Bistra, Szurdok-Pass (c. a.).

fatuus Rossi. Hermannstalt, Schässburg, S-Rogen (Bielz); Karlsburg (c. a.); Hönitzberg am Altfluss (Deubel).

var. *rugicollis* Mamm. Hermannstalt (Bielz, c. a.); Marosvásárhely (Bielz).

961. *Liparus Olv.*

L. germanus L. (siehe H. jetzt bei uns nicht gefunden, ebenso fehlt *L. dirus* Herbst; alles, was als *L. germanus* in den Sammlungen steckt, war *L. glabrioris* Küst.; das, was als *L. dirus* Herbst angesehen wurde, war zum Teil *L. transsylvanicus* Petri, zum Teil abgeriebene *L. glabrioris*).

glabrioris Küster. *carinae-rostris* Küster.

Durch das ganze Gebiet verbreitet.

coronatus Goeze. Zibensgebirge, Schässburg (Bielz); Előpaták (c. a.); Kronstadt (Deubel).

transsylvanicus Petri. Karlsburg, Hosszufalu, Schässburg (c. a.); Hammersdorf, Vargyas, Kronstadt (Deubel).

962. *Plinthus Germ.*

Meleus Lacordaire, Reitter.

In meiner Monographie der Gattung *Plinthus* habe ich nachgewiesen, dass unserer Fauna nicht angehören *Pl. Meyerlei*, *Pl. Fendeli*; dafür treten neu in unsere Fauna *Plinthus Parayssi* Boh. und *Pl. Elekeschi* Ormay.

Parayssi Boh. Kronstadt, Rotenturm (c. a.).

Elekesi Ormay. Bemete (Nagvened), Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Dees (c. a.).

Sturmi Germ. In unsern Gebirgen und im Bergland verbreitet.

Tischeri Germar. In unsern Gebirgen und im Berglande verbreitet.

963. *Neoplithus Bebel*

nigratus Rossi. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

porcatus Panz. Zibensgebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Schulergebirge (Bielz).

964. *Liosoma Stephens.*

Leuz führt auch *L. robustum* Sahl. von der Harzta an, wozu jedoch Seidlitz (F. tr. 972, Anm. 59) die Bemerkung macht, dass der Käfer nur aus Versehen in unser Verzeichnis gekommen sein könne.

deflexum Panz. ovatum Clairv. Retjezat, Fogarasch, Kronstalt, S-Rogen, Klausenburg (Bielz).

oblongum Boh. Kronstalt, Schulergebirge, Schässburg, Rodnagelberge (c. a.); Zernest (Deubel).

Bei den Vertretern dieser Art aus Siebenbürgen sind die seitlichen Punkt-Streifen der Flügeldecken schwach vertieft, während bei Exemplare aus Görz die seitlichen Punkte der Flügeldecken nur gereiht sind und nicht in Streifen liegen.

var. *Hopfgarteni* Stierl. Bistra, Malomv. Borszék (c. a.).

cribrum Gyll. Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Alsó-Rakos, Pitra mare (Méhely), Nagyagynás (Deubel).

carpathicum Bruns. Högsteg, Borszék (a.).

bosnicum K. Daniel. Csukás (c. a.); Rodnagelberge, Schulergebirge, Zernester Gebirge, Zinne (Deubel).

965. *Aparopion Hampe.*

(*Stereus* aut. nec Motschulsky).

costatum Falis. Michelsberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Porumbacher Gebirge (Ormay); Hätzeg, Karlsburg, Hammersdorf (c. a.).

966. *Adexius Schönh.*

scrobipennis Schönh. Kronstadt (Bielz), Rotenturm (Ormay), Hammersdorf, Szováta, Schässburg, Tojănfalva (c. a.).

967. *Trachodes Germar.*

hispidus L. Präsbe, Holzmeigen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék, S-Rogen (Bielz), Hermannstalt, Rotenturm (Ormay), Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Hätzeg, Schässburg, Alsó-Rakos, Bidos (c. a.).

Heydeni Stierl. Kronstadt (Bielz, c. a.); Retjezat, Schässburg (c. a.).

968. *Hypera Germ.*

H. oblonga Boh., die im Schichtal, segnis-Cap., welche im Zibinsgebirge vorkommen sollen, die Stammform der *H. comata* Boh. sowie der *H. palumbaria* Germ. sind bei uns nicht nachgewiesen.

oxalidis Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **ovalis** Boh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz), Kerzer Gebirge (Ormay); Schulergebirge, Balanbánya, Rodnagelb. (c. a.); Nagybagynás (Deubel).

intermedia Boh. Paringul, Schässburg, Rodnagelb. (c. a.), Mediasch, Záh (Bielz), Kerzer Gebirge, Perumbacher Gebirge (Ormay), Bucecs (Deubel).

var. **marmorata** Cap. Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.); Zibinsgeb. (Bielz).

elegans Boh. Zibinsgebirge, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

var. **Bonvouloiri** lap. Schässburg, Hammersdorf, Malomviz, Bihargebirge (c. a.).

palumbaria Germ.

var. **coarcticolis** Krauss. Burzenländer Gebirg (Deubel); Borszék (c. a.).

comata Boh.

var. **biharica** Petri. Bihar Gebirge (c. a.).

var. **carpathica** Petri. Fogarascher Geb., Rodnagelb. (c. a.).

velutina Boh. Schulergebirge, Borszék (c. a.); Nagybagynás (Deubel).

rubi Krauss. Borszék (c. a.).

pusilla m. Kerzer Gebirge (Vunetoaren, Rodnagelb. (Kuhhorn, c. a.); Bucecs (Leonhard), Blasewitz, Königstein, Nagybagynás (Deubel).

H. pusilla n. sp. Länge 2,5 mm., 1,55 mm. Zur Vergleichung liegen mir vor 5 Stück des *H. rubi* Krauss vom Bachergebirge, von Dr. Krauss selbst determiniert.

Grösse konstant geringer als die des *H. rubi*, die Form schmaler und schlanker, der Halsschild stets und stärker nach hinten verengt, die Oberseite glänzender, die feine Punktierung nur schwach rünzig, besonders auf der Halsschild, der Rüssel in beiden Geschlechtern kürzer, stärker gebogen und an der Basis durch eine tiefere Einkerbung von der Stirne getrennt, letztere merklich breiter, die punktiertgestreiften Flügeldecken sind in beiden Geschlechtern seitlich weniger stark erweitert, die Zwischenräume der Streifen gewölbt, gleichartig, der fünfte Zwischenraum bildet keine Schwiele vor der Spitze, während eine solche bei den steilchen Stücken schwach, aber deutlich entwickelt ist.

Der Penis dieser Art ist fast symmetrisch, gleich hinter der Basis deutlich verengt, dann bis hinter die Mitte parallel, darauf gerundet verengt, der Apex ist abgerundet, nicht abgestutzt, der Seitenrand der Penisfurchen an der Basis stärker und breiter nach innen umgebogen. Der Penis der *H. rubi* aus Steiermark ist von der Basis an allmählich zuerst schwächer, dann stärker verengt, deutlich asymmetrisch, der Apex schieb abgestutzt, der Seitenrand der Penisfurchen kaum eingebogen.

minuta Petri. Rodnagelb. (c. a.).

tessellata Herbst. Hätzeg (Bielz, c. a.); Hermannstadt (a B), Orlat (c. a.).

969. *Phytonomus Schönherr.*

(Antidonus.)

punctatus F. An Wasserpflanzen durch das ganze Gebiet.

fasciculatus Herbst. Mada Erzgebirge, Bielz; Karlsburg (c. a.); Rothbach (Deubel).

(Eirrhinomorpha.)

adpersus F. (pollux F.). Talmatschel, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.); Honigberg (am Altfluss, Deubel).

rumicis L. Hermannstadt, Meliasch, Gyeke (Bielz); Stolzenburg, Klempold, Kerzer Gebirge (Ormay); Honigberg (am Altfluss, Deubel).

arundinis Payk. Dobra (Bielz).

(Lepalinus.)

striatus Boh. Fogarasch (Bielz).

contaminatus Herbst. Zibinsgebirge (Bielz).

Mir sind *Ph. striatus* Boh. und *Ph. contaminatus* Herbst aus Siebenbürgen nicht zu Gesicht gekommen, wohl verwechselt mit *Ph. meles* F. und *denominandus* Cap.

meles F. Durch das ganze Berg- und Hügel-land auf Klee.

(Phytonomus i. sp.)

nigrirostris F. Hätzeg, Hermannstadt, Rotberg b. H., Fogarasch, Schässburg, S. Bezen (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Nagybagynás, Kronstadt, Vargyas (Deubel).

dentatus Petri. Rodnagelb. (von Deubel gesammelt).

carinicolis Stierl. Kerzer Gebirge (Ormay), Paringul, Malomviz (c. a.), Puj (Hätzeg, vil.).

a. **obscurus** Petri. Paringul (c. a.).

arator L. (polygona L.). Unter-Kerz (c. a.).

pedestris Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Meliasch, Sächs.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg, Szováta, Bükszál (c. a.); Honigberg, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

elongatus Payk. Schichtal (Cimpu micului), Kronstadt (Bielz); Grossau (Ormay); Schässburg, Rodnagelb. (Kuhhorn, c. a.).

denominandus Cap. Karlsburg, Bistritz, Schässburg (Fuchsloch, 21. Mai gekütschert, c. a.).

murinus F. Héviz (Bielz), Honigberg (am Altfluss, Rosenau, Deubel).

Ich habe einen *Ph. murinus* F. aus Siebenbürgen noch nicht gesehen.

plantaginis Degeer. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Kronstadt, Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.).

transylvanicus Petri. Durch das ganze Berg- und Hügel-land, namentlich auf Klee.

Die in Siebenbürgen vorkommende, bisher allgemein als *Ph. variabilis* Herbst bezeichnete

Ptytonomus-Art weicht wesentlich von den süd-europäischen, namentlich den dalmatinischen *Ptytonomus variabilis*, die ich als Stammform betrachte, ab: der Halsschild ist in beiden Geschlechtern stark gerundet, der Rüssel stärker gebogen, die Flügeldecken kürzer beim ♂ von der Basis ab nach hinten verengt etc. Er erinnert oft stark an *Ph. denominandus*. Im übrigen siehe meine Monographie der Hyperiden p. 183.

viciae Gyllh. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Schässburg (vidi), Honigberg (am Abfluss, Deubel).

trilineatus Marsh. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Hammersdorf, Grossau (Ormay); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).

970. *Limobius Schönherr*.

borealis Payk. (dissimilis Herbst. Hampei Cap.). Gross-Scheuern, Zibinsgebirge, Szurul (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Honigberg am Abfluss (Deubel).

971. *Coniatus Germar*.

splendidulus F. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Erirrhiniinae.

Acentrini.

972. *Acentrus Schönherr*.

histrion Boh. Gross-Scheuern (Bielz).

Pissodini.

973. *Pissodes Germ.*

piceae Ill. Héviz (Bielz).

pini L. Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).

nolatus F. Fogarascher Gebirge (Bielz); Kronstadt (Bielz, c. a.).

validirostris Gyllh. Tahnatschel (Bielz); Bucecs (Deubel).

scabricollis Mill. Präsbe (Bielz).

harcyniae Herbst. Schuler (Deubel).

Erirrhiniini.

974. *Grypoidius Stephens*.

equiseti F. Hätzeg, Hermannstadt, Marpod, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Krizba (Deubel).

975. *Pachytychius Jekel*.

sparsutus Oliv. Mühlbach, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg, Gyógy (Bad, Ormay); Hätzeg, Schässburg (auf einer Klecart, c. a.); Kronstadt (Deubel).

976. *Erirrhinus Schönk*

festucae Herbst. Gross-Scheuern, Záh (Bielz); Baassen (auf Schilfrohr, c. a.)

Nereis Payk. Hermannstadt (Bielz)

scirrhus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

977. *Notaris Stephens*.

bimaculatus F. Hammersdorf, Fogarasch, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

scirpi F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gyeke (Bielz). Schässburg, Marosújvár (auf Wasserpflanzen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

acridulus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **montanus** Tourn. Kerzer und Frecker Gebirge, Kronstadt, Rodnag Gebirge (c. a.).

Maerkeli Boh. Topánfalva, Schässburg, Tordaer Schlucht, Alsó-Rákos (c. a.); Rodnag Gebirge (Deubel).

aterrimus Hampe. Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya, Rodnag Gebirge (c. a.); Parigul-Gebirge, Nagy-Bagymás (Deubel).

978. *Icaris Tournier*.

sparganii Gyllh. Nussbach (Bielz).

Schässburg als Fundort des *I. sparganii* Gyllh. ist zu streichen.

979. *Dorytomus Stephens*.

longimanus Forster (vorax F.). Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Freck, Kronstadt, Klausenburg (Bielz).

a. **macropus** Redt. Hermannstadt, Gyeke (Bielz)

a. **ventralis** Steph. Siebenbürgen (Bielz).

Schönherri Faust. Schässburg (c. a.)

tremulae Payk. (variegatus Gyllh., armatus Petri). S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Kronstadt (Deubel).

tortrix L. (pectoralis Panz.). Hätzeg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Büdös, Előpatak, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

validirostris Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

hirtipennis Bedel. Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

var. **taeniatum** Faust. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

flavipes Panz. (suratus Gyllh.). Hätzeg, Kronstadt, Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Dees (Bielz); Rotenturm, Marosújvár, Karlsburg (c. a.).

filirostris Gyll. Schässburg, Fogarasch (Bielz); Újszékely b. Sch. (c. a.).

- Dejeani** Faust (costirostris Gyll. Déva, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- taeniatus** F. (bituberculatus Zett.). Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Előputak, Schässburg, Borszék (c. a.).
- affinis** Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Előputak, Torockó, Schässburg (c. a.); Szamos-návr (Ormay).
- ocalescens** Gyllh. Schässburg (c. a.).
- melanophthalmus** Payk. (punctator Herbst, agnathus Boh. Rotenturm, Schässburg, Kronstadt (c. a.); Hermannstadt, Stolzenburg, Gyergő Tölgyes (Ormay).
- a. clitellarius** Boh. Hermannstadt (Bielz).
- majalis** Payk. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- salicinus** Gyllh. Schässburg (Kokelufer, c. a.).
- villosulus** Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz).
- rufulus** Bielz. Kronstadt (Zinne, Deubel)?
- Reussi** Formanek. Rotenturm (c. a.).
- dorsalis** L. Borszék (auf Sahlweide in grösserer Zahl und verschiedener Färbung, c. a.).

Das Männchen besitzt auf dem letzten Ventalsegment eine Grube, welche beiderseits von einem Höcker begrenzt wird. Diese sexuelle Auszeichnung finde ich nirgends erwähnt.

Smicronychini.

980. *Smicronyx* Schönh.

- jungermanniae** Reich. (fleur Gyllh., variegatus Gyll.) Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- coecus** Reich (politus Boh.) Schässburg (Bielz, c. a.); Rezs (c. a.).

Tanysphyrini.

981. *Tanysphyrus* Germar.

- lemnae** Payk. Hermannstadt, Fogarasei, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Weiber auf der Bente, 26. April, c. a.).

982. *Bagous* Schönh.

- (lyprus.)
- cylindrus** Payk. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz), Kronstadt (Deubel, c. a.).
- Frivaldszkyi** Tourn. Schässburg (Fuchsloch, c. a.).
- (*Bagous* l. sp.)
- nodulosus** Gyllh. (binodulus Thoms. nec Herbst.) Kronstadt (Gespreng, Deubel, Méhely, c. a.).
- trit** Herbst (subcarinatus Bris.). Hermannstadt (Bielz).
- tempestivus** Herbst. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

lutosus Gyll. Hermannstadt (Ormay); Baroth auf feuchten Wiesen, Méhely); Schässburg (Kokelufer, c. a.).

(**glabrirostris** Herbst (colliguensis Herbst, luteolentus Gyllh.). Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Zalán, Halvelagen b. Sch., Schässburg (Kokelufer, c. a.).

subcarinatus Gyllh. Mező-ész (Bielz)

983. *Hydronomus* Schönh.

alismaticus Marsh. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz), Hammersdorf (Ormay). Kronst. alt (Deubel).

984. *Orthochaetes* Germ.

setiger Beck. Schiedthal, Gross-Scheuern (Bielz), Hätzeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Buceses (Deubel).

(*Styphlus* Schönh.)

subsetosus n. sp. Kerzer Gebirge, Buleatal, am Flussufer gesiebt, 2 Exempl.).

Orthochaetes (*Styphlus*) *subsetosus*. Lg. 1.8 mm. (ohne rostro).

Forma et colore *O. setigeri*, sed dimidio minor. Fuscus, opacus, tibiis, tarsis, antennis testaceis. Rostrum valde arcuatum, crassum, thorace vix brevius, subcarinatum, apice nitidum. Antennae funiculo septemarticulato, funiculi articulum I oblongum, latitudine dimidio longius, secundum gracilius, cylindricum, latitudine aequilongum, cetera transversa, clava ovalis, scapus oculum non attingens. Oculi distantes, vix prominentes, frons rostro aequilata. Prothorax subcylindricus quadratus, lateribus medio paulum rotundatus, pone apicem vix constrictus, dorso paulum convexus, opacus, squamulis dispersis minutis adpersus. Elytra oblonga, basi thorace latiora, truncata, humeris rotundatis, sulcata, interstitiis convexis, tertio et quinto, praesertim basin versus, costatis, striis vix punctatis, interstitiis setis brevibus reclinatoris seriatim obtectis. Pedes breves, femoribus clavatis, tibiis apicem versus amplius, tectis, apice truncatis, tarsorum articulum III transversum latum apice bipartitum, unguculi liberi.

Der Käfer hat ganz die Gestalt des *O. setigeri*, ist aber viel kleiner, der Rüssel kürzer, die Fühlerzeitel tiefer, weniger schlank, die Basis der Flügeldecken gerade abgestutzt, nicht wie bei jenem schwach ausgerandet, die Schultern abgerundet vortretend, die Streifen der Flügeldecken kaum sichtbar punktiert, die Interstitien derselben glabros. Es fehlen ihm ferner die langen absteigenden aufrechten Haare, statt deren er kurze, an der Spitze keulenförmig schwach verdickte, nach hinten geneigte Börstchen auf den Zwischenräumen zeigt. Auch auf dem Halsschild befindend sich nur sehr schwer sichtbare, anliegende Schüppchen, an den Schienen anliegende längere Börstchen.

(*Paraphilonus*.)

alpinus Penecke. Buceses, Honigberg (Deubel).

Cossoninae.

985. *Dryophthorus* Schönh.

corticalis Payk. (lymexylon F.). Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (im mul-

migem Holze einer alten Eiche in grosser Anzahl); Kronstadt (Warte, Deubel).

986. *Cossonus Clairville*.

parallelepipedus Herbst. Klausenburg (Bielz); Schässburg (im Mulne einer hohlen Weide, c. a.); Kronstadt (Deubel).

linearis F. Hermannstadt, Zibinsgebirge (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde und an den Wurzeln einer abgestorbenen Zitterpappel in grosser Anzahl, c. a.); Kronstadt (Méhely).

cylindricus Sahlb. Hätzeg (Bielz); Schässburg (Bielz, c. a., im Mulne einer hohlen Weide).

987. *Eremotes Wollaston*.

elongatus Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge, Borszék (Bielz).

ater L. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Oláhfaß (Bielz); Bistra, Frecker Gebirge (Serbota); Rodnagebirge (unter Fichtenrinde, c. a.).

punctatulus Boh. Retjezat, Baassen, Schässburg (in Nussbaumholz, c. a.).

Unsere Art wurde mit Vertretern des *E. punctatulus* aus Frankreich und Sizilien verglichen.

reflexus Boh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz).

(*Brachytemnus*.)

porcatus Germ. Hermannstadt, Marosgebirge (Bielz).

988. *Rhyncolus Germar — Stephens*.

(Hexarthrum.)

culinaris Germ. Hätzeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz), Schässburg (c. a.).

(*Stereocorynes*.)

truncorum Germ. Hammersdorf, Fogarasch, Borszék (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Unter-Kerz (aus Weidenholz); Baassen, Schässburg (aus Eichenrinde, c. a.); Rosenau, Kronstadt (Deubel).

(*Rhincolus*.)

lignarius Marsh. Zibinsgebirge (Bielz), Kronstadt (Deubel).

cylindricus Boh. Kerzer Gebirge, Sächsischen Regen, Borszék (Bielz).

turbatus Schönh. Kronstadt (Bielz); Hätzeg, Baassen, Schässburg (aus Lindenrinde, c. a.).

Cryptorrhynchinae.

989. *Camptorrhinus Schönh.*

statua Rossi. Csáki-Gorbó (Salomon, Bielz); Schässburg (auf Eichenholz von Prof. C. Höchsmann gesammelt, c. a.).

990. *Gasterocercus Laporte*.

depressirostris F. Hermannstadt (j. W., Bielz).

991. *Cryptorrhynchus Illiger*.

lapathi L. Hätzeg, Hermannstadt, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächsischen Regen (Bielz); Borszék (auf Weiden nicht selten, c. a.).

992. *Acalles Schönh.*

denticolis Germ. Durch das ganze Gebiet verbreitet (unter Laub).

variolosus Stierl. Kronstadt, Tartlau, Bodzaer Pass (Kraszna, Bielz); Előpatak (Clement).

camelus F. Zibinsgebirge, Mediasch (Bielz); Búdös, Topánfalva (c. a.).

ptinoides Marsh. Zibinsgebirge (im Tale des Schanta-Baches, Ormay).

roboris Curtis. Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék (Bielz); Schanta (Ormay); Előpatak, Alsó-Rakos, Torockó (c. a.).

pyrenaeus Boh. Rotenturm, Búdös (c. a.); Bucseers, Schuler (Deubel).

hypocrita Boh. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Piatra mare, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay); Ober-Kerz (Glaslütte), Torockó, Präsaka (Zalatna), Búdös (c. a.).

ovalipennis n. sp. Rotenturm, 1 Exempl.

Acalles ovalipennis n. sp. Länge 3'8 mm. *A. hypocrita* Boh. similis, sed forma elytrorum ovali, elytris sulcatis, tuberculis quattuor prothoracis bene distinctis.

Die Art ist kleinen Exemplaren des *Acalles hypocrita* Boh. auf den ersten Blick ähnlich, bei genauerer Vergleichung unterscheidet sie sich durch längere, regelmässig ovale Flügeldecken mit tiefen Furchen, welche auf dem Rücken weniger deutlich, an den Seiten aber grubig punktiert sind. Die ganze Oberseite ist dunkelbraun beschuppt, auf dem Halsschild befinden sich zwei schmale, undeutliche hellere Seitenbänder, auf den Flügeldecken ähnlich wie bei *A. hypocrita*, eine gerade schmale Querlinie hinter der Mitte und vor derselben zahlreiche kleine, isoherte, bindenartig geordnete, hellere, gelblich-weiße Punkte. Auf dem Halsschild fehlen die aufgerichteten Schüppchen des *A. hypocrita*, während je eine Reihe derselben auf den Zwischenräumen der Flügeldecken vorhanden sind, aber nicht so dicht gedrängt und undeutliche Büschel bildend wie bei *A. hypocrita*; dagegen bemerkt man auf der Mitte des Halsschildes in einer Querreihe vier Hockerchen (zwei jederseits), welche aus solchen Schüppchen gebildet sind. Der Russell ist etwas dünner, weniger dicht und etwas feiner punktiert, glänzend, an der Basis ohne kielartige Runzeln. Der Halsschild ist fast so lang als breit, von der Basis nach vorne verjüngt, die Seiten schwach gerundet und hinter dem Vorderende kaum bemerkbar eingeschnürt. Die Flügeldecken sind viel weniger robust, länglicher, oval, mit flachverrundeten Schultern. Die Beine ähnlich denen des *A. hypocrita*. Von *A. caucasicus* Reitter, der mir übrigens nur aus der Beschreibung bekannt ist, unterscheidet sich die Art durch die vier Borstenbüschel des Halsschildes und die gerade schmale Dorsalbinde.

variegatus Boh. Kronstadt (Bielz).

Nachdem Deubel die Art bei Kronstadt nicht wieder gefunden hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihre Auführung bei Bielz auf einem Irrtum beruht, auf einer Verwechslung mit einem grossen *A. validus* Stampe, der zuweilen eine Grösse von 3 mm. erreicht, während P. Meyer die Grösse nur auf 2 $\frac{1}{2}$ mm. angibt.

validus Hampe. Im ganzen Waldgebiet unter Laub.

lemur Germ. Kronstadt, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Roenturm, Gyógy (Bad, Ormay); Búdös, Alsó-Rákös, Rátosnya, Schässburg (c. a.).

echinatus Germ. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

misellus Boh. (ptinoides Gyll.).

v. **turbatus** Boh. Gross-Scheuern, Holzmeinen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg, Schanta, Porumbacher Gebirge, Gyógy (Bad, Ormay).

Papei Solari.

var. **balkanicus** Solari. Baassen (1 Exemplar), Alsó-Rákös (1 Exemplar c. a.).

Centorrhynchinae.

Centorrhynchini.

993. *Mononychus Germar.*

punctum-album Herbst (pseudacori F.). Michelsberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **salviae** Germ. Mező-Záh (Deubel).

994. *Coeliodes Schönh.*

rubricus Gyll. (Hoffmanni Weise). Előpatak (c. a.).

ruber Marsh. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

erythroleucus Gmel. (subrufus Herbst). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

dryados Gmel. L. (quercus F.). Hammersdorf, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold (Ormay); Maros Ujvár, Schässburg, Kronstadt, Előpatak (c. a.).

trifasciatus Bach. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

proximus Schultze. Hätzeg (Deubel).

rubicundus Herbst. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz).

995. *Stenocarus Thomson.*

cardui Herbst. Hammersdorf, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.); Rosenau, Erösd (Deubel).

996. *Craponius Leconte — Seidlitz.*

epilobii Payk. Hermannstadt, Zibinsgeb (Ormay); Borszék (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

997. *Cidnorrhinus Thomson.*

4-maculatus L. (urticae Scop.). Durch das ganze Gebiet auf Brennesseln.

998. *Coeliastes Weise.*

lamii F. Kerzer Gebirge, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Kleinpold (Ormay); Karlsburg, Schässburg, Alsó-Rákös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

999. *Allodactylus Weise.*

exiguus Ol. Gyll. Kalán, Alsó-Rákös (c. a.).

affinis Payk. (geranii Payk.). Hermannstadt, Focarasch, Kronstadt (Bielz); Előpatak, Schässburg, Baassen, Rodnagelbirge (c. a.); Bistritz (Deubel).

1000. *Pseudophytobius Desbrochers.*

veronicae Friv. Karlsburg (von Zeltlich gesammelt, c. a.).

1001. *Scleropterus Schönh.*

serratus Germ. Ober-Seles, Kerzer Geb. (Bielz); Schanta (Ormay); Schuler-Gebirge, Balánbánya, Kalán, Paringulgebirge, Rodnagelbirge (c. a.).

offensus Boh. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Buesecs (c. a.).

1002. *Rhytidossoma Stephens.*

Rh. globulus Herbst fehlt unserer Fauna.

fallax Otto. Frecker Gebirge (Serbota); Schuler-Gebirge, Csukás, Balánbánya, Borszék (c. a.); Krepatura bei Zernest (Deubel).

monticola Otto. Hermannstadt, Előpatak, Schässburg (c. a.); Schuler, Nagy-Hagymás, Kronstadt, Erösd (Deubel).

1003. *Brachyodontus Schultze.*

Reitteri Weise. Rodnagelbirge (c. a.)
Deubeli Ganglb. Buesecs (c. a.)

1004. *Amalus Schönherr.*

haemorrhous Herbst (scortillum Herbst). Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Girelsau, Kronstadt (Bielz). Szamosujvár (Ormay); Schuler-Geb., Schässburg (c. a.).

1005. *Rhinoncus Stephens.*

castor F. Hammersdorf (Ormay); Frecker Gebirge (Leitha); Schässburg (c. a.); Ober-Komana (Méhely); Hátzeg (Deubel).

n. **flavipes** Steph. Schässburg (c. a.).

bruchoides Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte); Előpatak, Bistrilz (c. a.); Hátzeg, Kronstadt (Deubel).

inconspectus Herbst. Girelsau, Forarash (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Rh. *inconspectus* Herbst ist im Katalog der europäischen Käfer von Heyden etc. wohl aus Versehen ausgelassen.

pericarpus L. Hátzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarash, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Heltau (Ormay); Retjezat, Malonyiz, Schässburg, Szováta, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

perpendicularis Reich. (guttalis Grav.) Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Hammersdorf, Heltau (Ormay); Unter-Kerz, Reys, Bistrilz (c. a.); Kronstadt, Schuler, Hammersdorf, Nagy-Hagymás (Deubel).

albicinctus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

1006. *Phytobius Schönh.*

canaliculatus Fabr. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Waltoni Boh. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Hátzeg, Kronstadt (Deubel).

comari Herbst. Hermannstadt (Ormay, c. a.); Kronstadt (Deubel).

4-tuberculatus F. Zibinsgebirge (Bielz); Talmesch (Ormay); Schässburg (Kokelufer c. a.); Kronstadt (Deubel).

granatus Gyll. (Brisouti Scillitz). Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátzeg, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Deubel).

4-cornis Gyll. Hermannstadt, Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Litodactylus).

leucogaster Marsh. Kronstadt (Deubel).

(Eubrychius.)

velatus Beck. Gross-Scheuern (Bielz).

1007. *Marmaropus Schönh.*

Besseri Gyll. Puj (bei Hátzeg, c. a.).

1008. *Phrydiuchus Gozis.*

topiarius Germ. Gross-Scheuern (Bielz); Felső-Orbó (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Hátzeg, Schässburg (c. a.).

Spelseri Schultze. Schässburg (bei einer Ueberschwemmung der Kokel 1890, c. a.).

1009. *Ceutorhynchidius Duv.*

horridus Panz. (spinosis Gemm.). Reys, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Nagy-Hagymás (Deubel).

trogodytes F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Karlsburg, Kronstadt, Alsó-Hákos, Schässburg, Baassen (c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel).

1010. *Ceutorhynchus Germ.*

(Sirocalus.)

terminatus Herbst. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg, Kalán (c. a.); Kronstadt, Törzburg (Deubel).

quercicola Payk. Crepatura bei Zernest (Deubel) det. von Formanek.

nigrinus Marsh. Kronstadt (Zinne, Méhely); Vajda-Hunyad (c. a.).

floralis Payk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

pyrrhorhynchus Marsh. (achilleae Gyll.). Hermannstadt, Neppendorf (Bielz).

pulvinatus Gyll. Salzburg b. Hermannstadt (c. a.); Rodna, Kronstadt (Deubel).

rhenanus Schultze. Kronstadt (Zinne), Rossenau (Deubel), Hammersdorf (c. a.).

Hampei Bris. Reys (Scillitz, 1861).

carniolicus Schultze. Schuler (Deubel).

(Thamnocolus.)

viduatus Gyll. Hermannstadt, Klausenburg Schässburg (c. a.).

pubicollis Gyll. Hermannstadt (j. W.); Baassen, Schässburg (c. a.).

Da es nicht sicher ist, welche von beiden Arten Bielz meint, C. pubicollis Gyll. oder signatus Gyll., die beide bei uns vorkommen, führe ich nur die mir bekannten Fundorte an.

virgatus Gyll. Honigberg am Altfluss (Deubel); Vajda-Hunyad (c. a.).

signatus Gyll. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Kraatzi Bris. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, 6. Mai, zusammen mit C. trimaculatus F. von Distel, c. a.).

(Ceutorhynchus i. sp.)

abbreviatus F. Gross-Scheuern, Marpod, Kerz, Fogarash (Bielz); Hammersdorf, Hátzeg, Rotenturm, (c. a.); Honigberg (Deubel).

geographicus Goeze. Rotenturm, Hammersdorf, Előpatak, Biskád, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátzeg, Puj (bei Hátzeg), Petrozsény (c. a.).

radula Germ. Kronstadt, Klausenburg (Bielz).

crucifer Oliv. (cruciger Herbst) Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Aubel Boh. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod (Bielz)

Sollte C. Aubel Boh. vielleicht ein Druckfehler für Andrea Germ. sein, der sich im Verzeichnis nicht findet, obgleich er bei uns vorkommt? Es liegt diese Annahme um so näher, da Aubel nur aus dem südlichen Europa und dem Kaukasus nachgewiesen wurde.

angulicollis Schultze. Kalán (c. a.); Rosenau, Honigberg (Deubel)

ornatus Gyllh. (Andrea Germ. Seidl.). Karlsburg (c. a.); Rosenau, Kronstadt (Zinne, Deubel).

larvatus Schultze. Schässburg, Baassen, Szováta (c. a.); Rosenau, Kreputura (Deubel).

gibbicollis Schultze. Kronstadt (Kapellenberg, Deubel, c. a.).

litura F. Hermannstadt, Sächsisch-Regen (Bielz).

trimaculatus F. Hammersdorf (Bielz); Schuler-Gebirge, Balánbánya, Schässburg (auf Distel, c. a.); Zernest, Kronstadt, Nagy-Hagymás (Deubel).

asperifoliarum Gyll. Héviz, Oláhfalú (Bielz); Héviz, Schässburg, Kronstadt, Szováta (c. a.); Hammersdorf, Rosenau (Deubel)

cognatus Schultze. Siebenbürgen Catalogus Col. Eur., 6711.

pallidicornis Bris. Zibinsklamm (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel)

urticae Boh. Kronstadt (Zinne, Deubel).

euphorbiae Bris. Schuler-Gebirge, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

ampliennis Schultze. Schässburg (c. a.).

austriacus Bris. Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

transsylvanicus Schultze. Siebenbürgen.

symphyti Bed. (Traphani F.). Hermannstadt, Grolsau, Freck (Bielz), Honigberg (Deubel).

angulosus Boh. Schässburg (c. a.)

suturalis F. Neudorf b. H. Bielz; Schässburg, Előpaták (c. a.); Hammersdorf (Deubel).

arquatus Herbst. Rotenturm (c. a.); Bistritz, Rosenau, Kronstadt (Deubel)

campestris Gyll. Hermannstadt, Fogarasz, Kronstadt, Tarlan (Bielz); Hätzeg, Szováta, Schässburg (c. a.).

chrysanthemi Germ. Kronstadt, Wolkendorf (Bielz), Schässburg (c. a.)

figuratus Gyll. Fogarasz (Bielz)

triangulum Boh. Schässburg, Borszék (c. a.); Schuler, Wolkendorf (Deubel)

rugulosus Herbst. Fogarasz, Kronstadt (Bielz), Schässburg, Oláhfalú (c. a.)

melanostictus Marsh. Karlsburg, Schässburg (Turkenhill, 21. Oktober), Kuckelweiher oder im Röhricht einer sumpfigen Stelle, c. a.), Kreputura, Kronstadt (Deubel).

macula-alba Herbst. Hermannstadt, Kronstadt, S. Regen (Bielz)

albovittatus Germ. Hätzeg, Hermannstadt,

Kronstadt, Mediasch, S. Regen, Záh (Bielz).

marginatus Payk. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz), Stolzenburg (Ormay).

Möller Thoms.

a **rotundatus** Bris. Kronstadt (Zinne, Deubel)

punctiger Gyllh. (Puj. b. Hätzeg), Karlsburg, Schässburg, Borszék (c. a.), Hermannstadt (Seidlitz), Kronstadt (Deubel).

pilosellus Gyll. Schässburg (c. a.)

inhumeralis Schultze. Rotenturm, Schässburg (c. a.).

pollinarius Forst. Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (Kroberg, Mai, c. a.)

pleurostigma Marsh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Schässburg, Kronstadt, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Klein-Pöhl (Ormay); Karlsburg, Schellenberg, Salzburg b. H. (c. a.)

Roberti Gyll. Hermannstadt (Bielz); Kalán (c. a.).

a **alliariae** Bris. Vargyas bei der Almaser Höhle (Deubel).

puncticollis Boh. Karlsburg, Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.); Vargyas b. d. Höhle (Deubel).

obsoletus Germ. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz)

laeulentus Gyll. Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

rapae Gyll. Záh (Mezőség, Bielz); Hermannstadt (Ormay)

borraginis F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, S. Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

syrites Germ. Klausenburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay, c. a., auf crumbe tartarea), Stolzenburg (Ormay, Kronstadt (c. a.), Nagy-Hagymás (Deubel).

arator Gyll. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf (Bielz, c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

assimilis Payk. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (c. a.); Zernest (Deubel)

constrictus Marsh. Kronstadt, Schuler, Vargyas bei der Höhle (Deubel), Schässburg (c. a.).

cochleariae Gyll. Előpaták (Bielz); Schuler-Gebirge, Schässburg (c. a.); Rodnagel, (Deubel).

Schönherri Bris. Előpaták (c. a.), Kronstadt (Zinne, Deubel)

similis Bris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

parvulus Bris. Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.).

nanus Gyll. Kalán (c. a.), Hammersdorf, Kronstadt, Honigberg (Deubel).

angustulus Gyll. Kronstadt (Zinne, Deubel)

sophiae Stev. Kronstadt (Zinne, Deubel)

querceti Gyll. Hermannstadt (Bielz).
consputus Germ. Hátzeg (c. a.).
coarctatus Gyll. (granulicollis Thoms.). Siebenbürgen (Bielz).
quadridens Panz. Hermannstadt, Gyeke, Záh (Bielz); Kronstadt (Deubel).
sulcicollis Payk. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kronstadt, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Belfau, Kleinpold (Ormay); Alsó-Rákos (Deubel).
scapularis Gyll. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).
ignitus Germ. Schässburg, Alsó-Rákos, V. Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).
barbareae Suffr. Hermannstadt (Bielz).

C. barbareae Suffr. ist irrthümlich für Schässburg angeführt.

pervicax Wse. Karlsburg (c. a.).

erysimi F. Im ganzen Gebiete verbreitet, auch im Gebirge (Reljezat).

a. **subniger** Gerh. Schuler-Gebirge (c. a.).

contractus Marsh. Wie der vorige verbreitet.

hirtulus Germ. Schidlat (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

aeneicollis Germ. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.).

canaliculatus Bris. Siebenbürgen (Catalogus Col. Europ., 677).

1011. *Poophagus Schönh.*

sisymbrii F. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, auf Sumpfpflanzen, Deubel, c. a.).

1012. *Tapinotus Schönh.*

sellatus F. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).

1013. *Orobitis Germar.*

cyaneus L. Déva, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Klausenburg (Bielz); Hátzeg, Oláhfalú (Bielz, c. a., Waldrand unter Moos); Hermannstadt (Ormay); Rosénau (Deubel).

Coryssomerini.

1014. *Coryssomerus Schönh.*

capucinus Beck. Kronstadt (Zinne, Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.).

1015. *Baris Germar.*

artemisiae Herbst. Hátzeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

spitzyi Hochh. Baassen (c. a.).

a. **nesapia** Faust. Baassen (c. a.).

sulcata Boh. Klausenburg (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

analis Oliv. Hátzeg, Zeilberg (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

laticollis Marsh. (picina Germ., glabra Bedel ol. nec. Herbst). Hammersdorf, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.).

atramentaria Boh. Karlsburg (Zellich, c. a.).

carbonaria Boh. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf (Bielz, c. a., auf den Wurzeln des Crambe talarica).

timida Rossi. Karlsburg (unter den Weinbergen gekötschert in 2 Exemplaren, c. a.); Mezöség (Gyeke, Bielz).

scolopacea Germ. Schässburg, Klausenburg (Bielz); Karlsburg (c. a.).

janthina Boh. Hátzeg (Bielz); Schässburg (c. a.).

lepidii Germ. Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

coerulescens Scop. Mühlbach, Rothberg b. H., Michelsberg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

abrolani Germ. (jacicornis aut. nec Marsh.). Gross-Scheuern, Tartlau (Bielz).

Villae Comolli. Hátzeg, Gross-Scheuern (Bielz).

chlorizans Germ. Gross-Scheuern, Holzungen, Fogarasch (Bielz); Előpalak (c. a.); Rodnagelberge, Kronstadt (Deubel).

1016. *Limnobaris Bedel.*

T-album L. Hátzeg, Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel).

pusio Boh. Baassen (Bachufer oberhalb des Bades, 14. Juni c. a.).

Calandrinae.

1017. *Sphenophorus Schönh.*

piceus Pall. Záh (Bielz); Karlsburg (c. a.).

abbreviatus F. Hátzeg (Bielz); Karlsburg Baassen (c. a.); Szamosujvár (Ormay). (Ich sammelte den Käfer auf sumpfigem Boden zwischen Sumpfpflanzen.)

Offenbar hat Bielz nicht Sph. abbreviatus F., sondern wie Seidlitz ganz richtig bemerkt, Sph. abbreviatus Redt. = striatopunctatus Goeze gemeint, denn dieser kommt ziemlich häufig, jener sehr selten vor.

striatopunctatus Goeze (mutilatus Laich). Hátzeg, Hermannstadt, Mediasch, Birtahna, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Záh (Bielz); Klausenburg, Kronstadt (c. a.).

1018. *Calandra Clairville.*

granaria L. Durch das ganze Gebiet, oft in Scheuern und auf Fruchtböden.

orizae L. Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Klausenburg, Schässburg (im Reis); Kronstadt (Deubel).

Tychiinae.

Tychiini.

1019. *Balaninus Samouelle*.

elephas Gyll. Hätzeg. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

Im Bielz'schen Verzeichnis fehlt *P. pellitus* Boh., der bei uns vorkommt, wodurch die Veranlassung begründet wird, dass *P. elephas* durch Irrtum in unser Verzeichnis gekommen sei.

pellitus Boh. Schässburg (c. a.); Schuler. Kronstadt (Deubel).

venosus Grav. (glandium Desbr.). Hätzeg. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

villosus F. Hätzeg. Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf Eichen im Frühjahr, c. a.).

nucum L. Hermannstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Szurdok-Pass, Hammersdorf, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

glandium Marsh. (turbatus Gyll., tessellatus Desbr.). Hätzeg. Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos (c. a.).

cerasorum Herbst. (Herbsti Gem.). Hermannstadt (Ormay). Rotenturm (c. a.).

rubidus Gyll. Kronstadt (Gespreng, von Sumpfplanzen geköschert. Deubel).

1020. *Balanobius Jekel*.

crux F. Durch das ganze Berg- und Hügel land auf Weiden.

salicivorus Payk. Wie der vorige.

pyrrhoceras Marsh. Hätzeg. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay). Kronstadt (Deubel).

1021. *Anthonomus Germar*.

varians Payk. Hätzeg (Bielz); Rejczat (c. a.); Buesees (Deubel).

a. **perforator** Herbst. Gyógy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel).

rubi Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Puj (Hätzeg). Karlsburg, Schuler-Gebirge, Alsó-Rákos, Schässburg, Borsók, Rodnag Gebirge (c. a.).

pubescens Payk. Schauta (Ormay, Fichten); Rejczat, Balán (c. a.); Schuler (Deubel).

cinetus Kollar. (piri Boh.). Schässburg, Hätzeg (c. a.).

inversus Bedel (ulmi Desbr.). Karlsburg, Schässburg (c. a.); Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Resinar (Ormay); Kronstadt, Zernesl (Deubel).

pedicularius L. Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay, auf Crataegus); Hätzeg. Buesees, Schässburg, Rotenturm, Balánbánya (c. a.). Kronstadt Zinne, Méhely).

rufus Gyll. Baassen (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pomorum L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Ober-Seles, Kerzer Geb., Schässburg, S.-Regen (Bielz). Heltau, Michelsberg (Ormay); Kronstadt (Deubel). Grosser Schädling auf Apfelbäumen (Apfelblütenstecher).

(Furpes.)

rectirostris L. (druparum L.) Gyógy, Nagyág (Ormay); Kronstadt (Méhely); Malomviz, Schässburg (von Zwetschenbäumen, c. a.).

1022. *Bradybatus Germar*.

Creutzeri Germ. Heltau (Ormay); Hammersdorf (c. a.); Kronstadt Zinne, Deubel).

Kellneri Bach. Hammersdorf, Schässburg (c. a.).

tomentosus Desbr.? Rotenturm, Kronstadt (c. a.).

Dieser langgestreckte *Bradybatus*, dessen Beschreibung ich nicht kenne, hat vollständig ungezähnte Schenkel, der Rüssel ist nach vorne verengt, die Flügeldecken sind dicht grau behaart, nur eine Querbinde hinter der Mitte beinahe unbehaart, glänzend; auf den Zwischenräumen der Punktstreifen erheben sich längere weisse Borsten, die in einer Reihe angeordnet und nach rückwärts geneigt sind. Der Halsschild ist gleichmässig grau behaart. Sollte diese Art mit *tomentosus* nicht identisch sein, so schlage ich für sie den Namen *Bradybatus seriesetosus* vor.

1023. *Acalyptus Schönh.*

carpini Herbst. Fogarasch, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. **sericeus** Gyll. Schässburg (Bielz)

a. **alpinus** Villa (rufipennis Gyll.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmenzen, Marpod, Schässburg, Fogarasch (Bielz); Vargyas, Kronstadt (Deubel).

1024. *Elleschus Stephens*.

scanicus Payk. Schässburg (Bielz, c. a.). Budös (c. a.). Hermannstadt, Szamosújvár (Ormay).

a. **pallidesignatus** Gyll. Schässburg, Flöpatak (c. a.).

bipunctatus L. Schässburg (Bielz, c. a.); Stolzenburg (Ormay). Budös, Borsók (c. a.); Schässburg im April von Sahlweiden geklopft; Rosenau (Deubel).

salicis Petri. Schässburg (Kokelufer auf Weiden, nicht selten); Rosenau (Deubel).

Diese Art hat mit *E. infirmus* Herbst (Schönh. III. 300) grosse Aehnlichkeit, ist aber durch ungezähnte Schenkel und ganz schwarzen Rüssel von ihm verschieden. Desbrochers scheint ebenfalls eine andere, aus Südrussland stammende Art vorgelegen zu haben, wenigstens passt nicht auf unsere Art, dass die zwei ersten Geisselglieder der Fühler verlängert seien, ferner, dass die Flügeldecken nach hinten nicht erweitert und die vorderen Tibien schwach gebogen seien.

1025. *Lignyodes Schönh.*

enucleator Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Schulberg, c. a.).

1026. *Tychius Germar.*

quinquepunctatus L. Durch das ganze Gebiet.

v. **tauni** Frick. Dees (Méhely); Honigberg am Altfluss (Deubel).

polylineatus Germ. Hammersdorf, Güreisan, Rotenturm (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.).

lineatulus Steph. (Schneideri Gyll.). Hätzeg, Schässburg, Baassen (c. a.).

Schneideri Herbst (lineatulus Boh.). Hammersdorf (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

flavicollis Steph. (squamulatus Gyll.). Schässburg (c. a.); Boncz-Nyires (Méhely).

venustus v. **genistae** Boh. Schässburg (Bielz) ist aus unserem Verzeichniss zu streichen, da ihre Aufführung auf einer Verwechslung mit *Sibinia vittata* Germ. beruhte.

Kiesenwetteri Tourn. Schässburg (c. a.).

crassirostris Kirsch. Schässburg (c. a.).

aureolus Kiesenw. Kronstadt, Schässburg (c. a.).

v. **medicaginis** Bris. Zalatna, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

haematopus Gyll. (juncus Boh.). Hätzeg, Schässburg (c. a.); Zinne (Deubel).

femoralis Bris. Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

juncus Reich (curtus Bris.). Gross-Scheuern, Mediasch, Záb (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyógy (Ormay); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

meliloti Steph. Schässburg (Bielz, c. a.); Reps, Előpatak (c. a.); Kronstadt, Hätzeg (Deubel).

tomentosus Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Microtragus.)

picrostris F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

cuprifer Panz. Hätzeg, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Grossau, Stolzenburg (Ormay); Előpatak, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel).

1027. *Sibinia Germar.*

Beckeri Tourn. Karlsburg (c. a.).

fugax Germ. Schässburg (Fuchsloch, 3. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

signata Gyll. (?primita Herbst). Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

vittata Germ. Schässburg, Karlsburg (c. a.).

eana Herbst (?pellucens Scop.-Bedel). Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Méhely); Zinne (Deubel).

viscaria L. (var. Roelofsi Desbr., var. Emeryi Tournil). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (auf einer Silene, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Orchestini.

1028. *Anoplus Schönh.*

plantaris Naezen. Hätzeg, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Büdös, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Malomviz (c. a.); Rosenau (1 Exempl., Deubel).

roboris Suffr. Rosenau (häufig, Deubel).

1029. *Orchestes Illiger.*

Die Arten leben auf Bäumen und Sträuchern.

quercus L. Fogarasch, Kronstadt, Brennendorf, Előpatak (Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold (Ormay); Hätzeg (Deubel).

pilosus F. (ilicis F.). Präsbe (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz, Kronstadt (Deubel).

sparsus Fahr. Hätzeg (Bielz).

fagi L. In Buchenwäldern durch das ganze Gebiet.

testaceus Müller (scutellaris F.). Zibinsgebirge, Fogarasch, Tartlau, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Bucsecs (c. a.); Szurduk-l'ass, Hätzeg (Deubel).

v. **semirufus** Gyll. Rotenturm (c. a.); Kronstadt, Ober-Venice (Méhely).

loniceræ Herbst. Schässburg (c. a.).

rusci Herbst. Hätzeg, Zibins-Gebirge (Bielz); Bükszád (c. a.).

avellanae Donov. Kronstadt, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Breite, 2. Mai, Haselnussstrauch, c. a.).

(Pseudorchestes.)

pratensis Germ. Hermannstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.).

cinereus Fahr. Schässburg (Schneureberg, 23. Mai, gekötscherl, c. a.); Hätzeg (Bielz).

(Tachyerges.)

decoratus Germ. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék, Schässburg (Kokelufer, auf Weiden, 12. Mai); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

- rufilarsis** Germ. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Rosenau (Deubel).
- salicis** L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Salzburg (Ormay); Schässburg; Borszék (auf Weiden, c. a.).
- stigma** Germ. Mühlbach, Hőviz, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék; Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- (*Isometrus*.)
- populi** F. Hätzeg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg; Sächsisch-Begen, Gyögy, Záh (Bielz); Hermannstadt, Nagyenyed, Kakova (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Nagy-Hagyvás (Deubel); Borszék (c. a.).
- foliorum** Müll. (saliceti F.) Schässburg, S-Begen (Bielz); Hammersdorf, Rosenau, Buceacs (Deubel).

1030. *Ramphus Clairville*.

- pulicarius** Herbst. (flavicornis Clairv.) Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rotberg b. H. (Bielz); Schässburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

Mecini.

1031. *Mecinus Germar*.

Die Arten leben auf Wiesenpflanzen, von denen sie gekostet werden.

- collaris** Germ. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Stolzenburg, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Gross-Alisch b. Sch. (c. a.); Karlsburg, Nagy-Hagyvás, Kronstadt (Deubel).
- pyraster** Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Talmesch, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Szamosújvár (Ormay); Karlsburg, Baassen, Schässburg, Előpatak, Kronstadt (c. a.).
- circulatus** Marsh. Hammersdorf (Bielz).

1032. *Gymnetron Schönh*

Die Arten leben auf verschiedenen krautartigen Pflanzen.

- (*Gymnetron* s. str.)
- labile** Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern, Girsau, Marpod, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.).
- latiusculum** Duv. Siebenbürgen (Catalog col. Eur. Heyden, 1906, col. 690).
- rostellum** Herbst. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- melanarium** Germ. Schässburg, Fuchsloch, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- villosulum** Gyll. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt (c. B. Ormay); Kronstadt (Deubel).

- beccabungae** L. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Frecker Gebirge (Seibota, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- v. **veronicae** Germ. Kronstadt, Hätzeg (Deubel); Batsonya (c. a.).

(*Rhina*.)

- asellus** Gray. Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Vajda-Hunyad (Gäa-er Tai auf Verbascum, c. a.); Sosnecő, Ghymscher Pass (Méhely).
- v. **plagiatum** Gyll. Hätzeg, Neudorf b. H. (Holzmengen (Bielz)).
- tetrum** F. Hermannstadt, Schässburg, S-Begen (Bielz); Gyögy-Bad, Ormay; Hätzeg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. **plagiellum** Rosensch. Kronstadt (Zinne, Deubel); Vajda-Hunyad (c. a.).
- v. **subrotundatum** Reiter. (antirrhini Germ.). Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Gyögy-Bad, Ormay; Thordier Schlucht, Zalatna, Kronstadt (c. a.).
- antirrhini** Payk. noctis auct. Hőpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne; Erösd (Deubel)).
- hispidum** Erösd (Gross, G. L.). Hermannstadt, Hőpatak, S-Begen (Bielz).
- melas** Boh. Kronstadt (Deubel).
- netum** Germ. Neudorf, S-Begen (Bielz); Kronstadt, Rosenau (Deubel).
- G. collum Gyll. ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da der Käfer irrtümlich aufgenommen wurde.
- bipustulatum** Rossi (Gross-Scheuern, Neudorf, Schässburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay)).
- a. **fuliginosum** Rosensch. (Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel)). Schässburg, Szováta (c. a.).
- linariae** Panz. Neudorf b. H. Schässburg (Bielz).

1033. *Miarus Stephens*.

- longirostris** Gyll. Fogarasch, Tartlau (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- graminis** Gyll. Hätzeg, Neppendorf, Neudorf bei H. Fogarasch, Beps, Sächsbegen (Bielz); Hammersdorf, Gyögy-Bad, Ormay; Klausenburg, Hőpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- distinctus** Boh. Borszék (c. a.).
- campanulae** L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Mediasch, Hőpatak, S-Begen, Gyögy, Záh (Bielz); Götzenberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Malonyiz, Puj (bei Hätzeg); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. **ursinus** Ab. Puj bei Hätzeg, Schässburg (c. a.).
- v. **rotundicollis** Desbr. Puj bei Hätzeg (c. a.).

v. monticola n. v. Bucsecs, Frecker Gebirge (Serbota); Borszék, Balánbánya, Schässburg (c. a.).

Miarus campanulae v. **monticola** lässt sich nur im männlichen Geschlecht vom typischen **Miarus campanulae** unterscheiden. Während beim ♂ des letzteren das letzte Abdominalsegment tief eingedrückt ist und die seitlichen Ränder der Grube sich in Form zweier kräftigeren, nach abwärts gerichteten und durch eine im Grunde gerundete, tiefe Ausbuchtung von einander getrennten Zähne erheben, ist bei der Varietät **monticola** das letzte Abdominalsegment nur seicht eingedrückt und die Seiten des Eindruckes hinten in ein wenig über das Niveau des Segmentes erhobenes, schwaches Zähnchen erweitert. Bei der Stammform ist die Grube geglättet, glänzend, wenig dicht, grob punktiert, bei **monticola** ist die Punktierung etwas feiner und dichter, der Glanz geringer. Da sich keine sonstigen konstanten Unterschiede vorfinden, geschlechtliche Unterschiede auch sonst sehr verschieden stark ausgeprägt sind, halte ich **monticola** nur für eine lokale, vielleicht auch nur individuelle Abweichung, die ich jedoch erwähnen zu müssen glaubte.

Clonini.

1034. *Cionus Clairville*.

Die Arten leben namentlich auf *Verbascum*.

tuberculosis Scop. (verbasci F.). Hätzeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Zibins-Gebirge, Gvergyó-Tölgyes (Ormay).

scrophulariae L. Retjezat, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Zibinsgebirge, Gvergyó-Tölgyes (Ormay).

thapsi F. (similis Germ.). Hätzeg, Neudorf bei H., Tartlau, Bükszád, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rotenturm, Ober-Forumbach, Zibinsgebirge, Gyógy (Bad), Gvergyó-Tölgyes (Ormay); Retjezat, Puj (bei Hätzeg), Nagyenyei, Karlsburg (c. a.).

Olivieri Rosensch. (Clairville Boh.). Hermannstadt, Fogarasch, Bükszád, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Hätzeg (c. a.).

hortulanus Geoffr. Hermannstadt, Fogarasch, Bükszád, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Hätzeg, Oláhfalú, Reys, Rodnaggebirge (c. a.).

olens F. Holzungen (Bielz); Schässburg (Schulberg, c. a.).

alauda Herbst (Mattaria F.). Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(Cleopus.)

solani F. Schässburg (Schulberg April, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Nanophynial.

1035. *Nanophyes Schönherr*.

circumscriptus Aubé. Schässburg (Scheureberg, 23. Mai, gekötschert).

globulus Germ. Hätzeg, Hermannstadt (J. W.), Fogarasch (Bielz); Hammersdorf (Deubel).

gracilis Redtenb. Hätzeg (Bielz).

marmoratus Goeze (lythri F.). Durch das ganze Gebiet an sumpfigen und feuchten Orten auf *Lythrum*.

Magdalini.

1036. *Magdalis Germ.*

(Tannophilus.)

phlegmatica Herbst. Birtbalm (Bielz); Kronstadt (c. a.).

nifida Gyll. Hermannstadt (Bielz); Bucsecs, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

violacea L. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay, auf getrockneten Fichtenästen); Frecker Gebirge (Serbota); Elöpaták, Karlsburg (von Eiche), Schässburg (Scheureberg von Ulmen, 23. Mai, c. a.); Nagybagymás (Deubel).

frontalis Gyll. Klausenburg (Bielz). Zernest (Coltin Chitilor, Méhely); Kronstadt (Deubel).

duplicata Germ. (?punctipennis Küster). Kronstadt, Rosenau (Deubel).

Weisei Schreiner. Honigberg (am Altfluss, Deubel, det. Formanek)

striatula Desbr. Siebenbürgen (Bielz)

armigera Geoffr. (aterrima F.). Dobra, Schässburg (Bielz); Halmbach b. H. (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

carbonaria L. Szurdokpass (c. a., von Fichten geklopft).

asphaltina Boh. Klausenburg (Bielz).

(Panus.)

cerasi L. Hätzeg, Hermannstadt, Holzungen, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

barbicornis Latr. Schässburg (Birnbäum, Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Edo.)

ruficornis L. (pruni L.) Hätzeg, Gross-Scheuern, Girelsau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Szováta, Baassen (c. a., auf Birnbäum); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

(Panopsis.)

flavicornis Gyllb. Hermannstadt (Ormay). **quercicola** Weise. Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

Apionini.

1037. *Apion Herbst.*

(Onychapion.)

tamarisci Gyll. Siebenbürgen (Bielz).

A. tamarisci Gyll. gehört dem Süden Europas an. Ihr Vorkommen bei uns bedarf noch der Bestätigung, zumal Bielz keinen naheren Fundort angibt und die Art seit Bielz nicht gesammelt wurde. Auch Seidlitz (F. transs.) äussert seinen Zweifel. (Ceratapion.)

sulcifrons Herbst. Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Tadinenberg bei Petersberg (Deubel).

confluens Kirby. Hätzeg, Marjöl (Bielz); Schässburg (c. a.).

stolidum Germ. Hätzeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Oláhfalú (Bielz); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

armatum Gerst. Schässburg (c. a.).

carduorum Kirby (hasicorne Hlg.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Marjöl, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

onopordi Kirby. Hätzeg, Mühlbach, Gross-Scheuern, Neppendorf, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg, Reps, Oláhfalú, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Előpaták, Déva (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

penetrans Germ. Hätzeg, Neppendorf, Előpaták (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

transsylvanicum Schilsky. Siebenbürgen (Schilsky).

(Exapion.)

compactum Desbr. (genistae auctorum) Hätzeg, Mühlbach (r. B.), Torda (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

hilfi v. Deubel Wagner. Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel). Ent. Mitt. I. 1, p. 19.

corniculatum Germ. (difficile auctorum nec Herbst). Schässburg (c. a.); Erösd, Kronstadt (Deubel).

hungaricum Desbr. Schässburg, Alsó-Rákös, Előpaták, Borszék (c. a.); Schuler, Kronstadt, Rosenau (Deubel).

difficile Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Torda (Bielz); Schässburg, Hätzeg (Bielz, c. a.); Kronstadt, Keisd (Deubel).

(Oxystema.)

ochropus Germ. Hätzeg (Bielz).

A. ochropus Germ. ist hi. jetzt in Schässburg nicht gefunden worden.

pomoniae F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

cracca L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Stolbenburg (Ormay); Malomváz, Betezat, Karlsburg, Borszék (c. a.); Kronstadt.

cerdo Gerst. Hätzeg, Freck, Hévi, Nussbach, Előpaták (Bielz); Hermannstadt,

Hammersdorf, Körzer Gebirge, Szamosújvár (Ormay); Malomváz, Schässburg, Klausenburg, Zalatna (c. a.), Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

epeticum Ba. h. Előpaták, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

subulatum Kirby. Kronstadt (Bielz); Malomváz, Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay).

(Aspidapion.)

aeneum F. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

radiolus Kirby. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf (b. H.), Fogarasch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Reps (c. a.); Kronstadt (Deubel).

validum Germ. Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz).

(Synapion.)

ebeninum Kirby. Fogarasch, Reps (Bielz); Helau (Ormay); Hermannstadt, Előpaták, Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.); Rotenturm-Pass, Zernest (Deubel).

(Alacentron.)

curvirostre Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Hätzeg, Déva, Schässburg (c. a.); Algyóg. (Ormay).

(Omplapion.)

laevigatum Payk. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

A. laevigatum Payk. ist dem *A. hookeri* Kirby sehr ähnlich und wahrscheinlich beziehen sich auch die Bielz'schen Fundorte auf letztere Art, da erstere nicht mehr aufgefunden wurde.

hookeri Kirby. Grossau (Ormay); Kronstadt (Zinne, Königstein), Baróth (Méhely); Hévi, Előpaták, Alsó-Rákös, Schässburg (c. a.); Hammersdorf (Deubel).

(Taenipion.)

urticarium Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Kalcipion.)

havofemoratum Herbst. Gyógy (Ormay); Hätzeg (c. a.); Keisd (Deubel).

pallipes Kirby. Hätzeg, Fogarasch (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay).

(Rhopalapion.)

longirostre Oliv. Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Sächsisch-Regen, Gyeke (Bielz); Vajda-Hunyad (Gyalärer Tal, c. a., auf Malven und Lavatera in Gärten); Karlsburg, Hätzeg (Deubel).

(Pseudapion.)

rufirostre F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Záh (Bielz); Schässburg (Bielz, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Catapion.)

pubescens Kirby. Hätzeg, Hermannstadt, Mediasch, Reps, Oláhfalú (Bielz).

seniculus Kirby. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Rotenturm, Kronstadt, Előpaták, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Grossau (Ormay); Schässburg, Borszék (c. a.).

- vlecinum** Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- atomarium** Kirby. Gross-Scheuern, Héviz, Bükszád, Oláhfalva (Bielz); Zalatna, Rátosnya, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schuler (Deubel).
- serpyllicola** Desbr. Schässburg (c. a., vidit Schilsky).
- millum** Bach (annulipes Wenck.). Rátosnya (3 Exemplare. ♂♂, c. a.).
- flavimanum** Gyll. Oláhfalva (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Talmesch, Szamosújvár (Ormay).
- elongatum** Germ. (millum Gyll. nec Bach). Nagyenyed (c. a.).
(Erythrapion.)
- sanguineum** Deg. Bodzaer Gebirge, Ober-Komana (Méhely); Kronstadt (Deubel).
- frumentarium** Payk. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Puj (bei Hátszeg), Schässburg, Baassen, Rátosnya (c. a.); Zernesl, Kronstadt (Deubel).
- v. **cruentatum** Waltl. Kronstadt, Bükszád, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Bucsacs (Deubel).
- miniatum** Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Fuchsloch auf rumex pratensis), Klausenburg (Bielz); Karlsburg, Szováta (c. a.); Zernesl, Schuler (Deubel).
Bükszád ist zu streichen.
(Podapion.)
- filirostre** Kirby. Reps (Bielz); Schässburg (c. a.).
Oláhfalva ist zu streichen.
- nigritarse** Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Rotenturm, Fogarasch, Nussbach, Schässburg, Oláhfalva, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Grossau, Gyógy (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- flavipes** Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
- v. **Lederi** Kirsch. (♂ apicirostre Desbr., ♀ coxale Desbr.). Schässburg (c. a.); Nagy-Ilagymás, Keisld, Rotenturm, Rossenau (Deubel).
- dissimile** Germ. Hátszeg (Bielz).
- ononicola** Bach. Schässburg, Frecker Gebirge (Serbota? Leita?, c. a.); Ober-Komana (Méhely).
- assimile** Kirby. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Topánfalva, Borszék (c. a.); Kronstadt, Tohán (Deubel).
- apricans** Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Gyógy, Michelsberg, Szamosújvár (Ormay); Előpatak, Schässburg, Dees, Karlsburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas bei der Höhle, Nagy-Ilagymás (Deubel).

- varipes** Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, Héviz, Előpatak, Schässburg, Oláhfalva, S.-Regen, Záh (Bielz); Szamosújvár (Ormay); Rotenturm, Alsó-Rákos (Deubel).
- acotivum** Germ. (trifolii Bach). Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- v. **ruficrus** Germ. Mit der Stammform. (Apion i. sp.)
- malvae** F. Déva, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- curtirostre** Germar (humile Germ.). Hermannstadt, Girelsau (Bielz).
Előpatak ist zu streichen.
- simum** Germ. Hermannstadt, Neppendorf, Schässburg (Bielz); Előpatak, Borszék, Oláhfalva (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- sedi** Germ. Salzburg (Ormay).
- brevirostre** Herbst. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- marchicum** Herbst (? aeternum L.). Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rátosnya, Schässburg (c. a.); Keisld (Deubel).
- violaceum** Kirby. Hátszeg, Neudorf b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Nagyenyed, Topánfalva, Rodnagelbirge (c. a.).
Reps ist zu streichen.
- hydrolapathl** Marsh. Hátszeg, Fogarasch (Bielz).
- minimum** Herbst. Hátszeg, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Oláhfalva (Bielz); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Rátosnya (c. a.).
- holosericum** Gyll. Kleinpöld, Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hátszeg (Deubel).
- Gyllenhali** Kirby (unicolor Kirby). Hátszeg, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Zinne, Méhely); Hermannstadt (c. a.); Várhegy (Deubel).
- Spencei** Kirby. Hátszeg, Fogarasch (Bielz); Nagy-Ilagymás (Deubel).
- vorax** Herbst. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (c. a.).
- amethystinum** Mill. Hermannstadt (c. a.).
- viciae** Payk. Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Bucsacs, Tohán (Deubel).
- var. **Griesbachi** Steph. Hammersdorf, Hátszeg, Rejczat, Schässburg, Rátosnya, Borszék (c. a.).
- pisi** F. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- aestlimalum** Faust. Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

punctigerum Payk. Gross-Scheuern, Kronstadt (Mediasch Bielz); Rotenturm, Schässburg, Reps, Dees (c. a.); Hát-szeg (Deubel).

aethiops Herbst (Hát-szeg, Deubel); Bielz; Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

immune Kirby (Kersel, Deubel).

pavidum Germ. Hát-szeg (Bielz); Zalatna, Kronstadt, Schässburg, Nagyenyed (c. a.).

A. striatum Kirby ist durch Irrtum in unser Verzeichnis gekommen und daher zu streichen.

ervi Kirby. Hát-szeg, Gross-Scheuern, Előpatak (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Thordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

smile Kirby. Retjezat (c. a.).

melancholicum Wenck. Kronstadt (Deubel).

ononis Kirby. Marpod (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gyogy Ormay, Nussbach und Előpatak sind als Fundorte des *A. ononis* zu streichen.

elegantulum Germ. Hát-szeg, Gross-Scheuern, Előpatak, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Zalatna, Borszék (c. a.); Kronstadt, Tóhán (Deubel).

astragali Payk. (saeculare Goz.) Hát-szeg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Előpatak (c. a.); Örkény (Zellich, Deubel).

virens Herbst. Hát-szeg, Porcsost, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Balánbánya, Reps, Ratosnya, Borszék, Rodnagelberge (c. a.).

tenuis Kirby. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Hát-szeg, Bükszád, Kronstadt, Schässburg, Előpatak (c. a.).

meliloti Kirby. Marpod, Reps (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú (c. a.).

loti Kirby (angustatum Kirby). Hermannstadt, Előpatak (Bielz); Hát-szeg, Nussbach, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Alsó-Bákos, Nagy-Hagyony, Rotenturm (Deubel).

columbinum Germ. Hát-szeg, Gross-Scheuern, Fogarasz, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

punctirostre Gyll. (Schmidt's Bach.). Hát-szeg (Bielz).

reflexum Gyll. (livescens Gyll.). Reys (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

Rhynchitinae.

1038. *Anletes* Schönh.

basilaris Gyll. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

1039. *Rhynchites* Schönh.

(Deporaus.)

belulae L. Götzenberg, Holzungen, Gross-Schenck, Dévitz, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Stolzenburg, Rotenturm (Ormay, auf Gestrüch in lebenden Hecken, an Waldrändern, auf Waldblössen und in Holzschlägen).

Mannerheimi Hummel (megacephalus Germ.). Hermannstadt (Bielz).

Schässburg war irrtümlich als Fundort dieser Art angegeben, doch ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich noch wird auffinden lassen.

(Pselphorhynchites.)

nanus Payk. (planrostris F.). Gross-Scheuern, Neppendorf, Hammersdorf, Neudorf b. H., Michelsberg, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Bükszád (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

tomentosus Gyll. Schässburg, Unter-Kerz, Borszék (c. a.); Bodzaer Gebirge, Prázmár (Méhely).

(Lasiurhynchites.)

Rh. coeruleocephalus Schall. (cyanorephalus Herbst) ist in unser Verzeichnis irrtümlich hineingekommen. Da sich die Art in den Nordkarpathen findet, ist ihr Vorkommen bei uns nicht ausgeschlossen.

olivaceus Gyll. (comatus Gyll.). Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

cavifrons Gyll. (pubescens Herbst, Schll.). Gross-Scheuern, Marpod, Sachs-Regen (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (Wietberg, c. a.); Hát-szeg, Alsó-Bákos (Deubel).

sericeus Herbst. Déva, S.-Regen, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Hát-szeg (c. a.).

(Coenorrhinus.)

germanicus Herbst. Hát-szeg, Déva, Gross-Scheuern, Girdsán (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

aeneovirens Marsh. Hát-szeg, Gross-Scheuern, Schässburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

interpunctatus Steph. (Albariae Seidl.). Gross-Scheuern, Marpod, Sachs-Regen (Bielz); Hermannstadt, Salzbung, Szamosnyár (Ormay).

pauillus Germ. Hermannstadt, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Hammersdorf, Kronstadt (Deubel). Ein Schädling, namentlich auf Aepfelbäumen, sticht junge Triebe ab).

aequatus L. (pumpureus Goeze). Hát-szeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sachs-Regen, Gyogy, Bielz, Klausenburg (c. a.); Alsó-Bákos (Deubel).

(Invalvulus.)

aethiops Bach. Hermannstadt, Reps (Seidlitz, 1864); Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg (c. a.).

cupreus L. Nendorf, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

coeruleus Degér (conicus Gyll.). Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay).

pubescens F. (parellinus Gyll.). Rothberg (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).

(Merhynchites.)

hungaricus Herbst. Klausenburg (Bielz).

(Rhynchites s. str.)

auratus Scop. Hätzeg, Neppendorf, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed, Schässburg (c. a.).

versicolor Costa, Mezö. Záh (Deubel).

Bacchus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Stolzenburg, Nagybak (Unterweissenburger Komitat), Szamosújvár (Ormay); Hätzeg, Schässburg, Szóváta (c. a.); Várhegy (Deubel).

1040. *Byctiscus Thomson.*

(Rhinomacer Geoffroy.)

populi L. Hermannstadt, Hammersdorf, Reps, Kronstadt, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Schässburg (c. a.).

betulae L. (alni Müll., betuleti F.). Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz). Behenstecher, sticht die Blätter von Beben und Birnbäumchen an und rollt die Eier in dieselben ein.

1041. *Attelabus Linné.*

(Cyphus Thunberg.)

nitens Scop. (curculionoides L.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Nendorf b. H., Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Oláhfalú (Bielz); Magyar-Bükkös (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Schässburg (c. a.).

1042. *Apoderus Oliv.*

(Attelabus auct.)

coryli L. Durch das ganze Gebiet verbreitet auf Gesträuch.

a. **collaris** Scop. Kronstadt (Pojana, Méhely).

erythropterus Zschach. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Oláhfalú, Oláh-Laposbanva (Bielz).

LXXIII. Nemonychidae.

1043. *Nemonyx Redtenb.*

lepturoides F. Klausenburg (Bielz); Klausenburg (von Sumpfplanzen gekötschert, Juli, c. a.); Gyeke (Méhely).

1044. *Rhinomacer Fabricius.*

(Cimberis Gozis.)

attelaboides F. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnag Gebirge (Deubel); Borszék (c. a.).

LXXIV. Ipididae.

Eccoptogastrini.

1045. *Eccoptogaster Herbst.*

(Scolytus auct.)

scolytus F. (Ratzeburgi Seidl., Geoffroyi Goeze.). Kronstadt (Bielz); Schässburg (Mai, am Stamme einer abgestorbenen Ulme in grosser Anzahl, c. a.).

laevis Chap. Baassen (11. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pygmaeus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Bodzaer Pass (Bielz). Soll auf Aesten der Ulme haften.

mali Bechst. (pruni Ratzeb.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Nendorf, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Bistritz, S.-Regen (Müller).

carpini Ratzeburg. Schässburg, Klausenburg (in der Rinde gefällter Hainbuchenstämme, Bielz); Knisd, Kronstadt (Zinne, Deubel).

intricatus Ratzeb. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

rugulosus Ratzeb. Hätzeg, Hermannstadt, Holzmengen, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (gefallter Stamm eines Apfelbaumes, c. a.).

multistriatus Marsb. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (c. a.).

Hylesinini.

1046. *Phloeophthorus Wollaston.*

rhododactylus Marsh. (spartii Nördl.). Kerzer Gebirge (Bielz).

1047. *Phthorophloeus Rey.*

spinulosus Rey. Betjezat, Kronstadt (c. a.); Schulergebirge, Bucecs (Deubel).

1048. *Hylesinus Fabricius*.*crenatus* F. Zibinsgebirge (Bielz)*oleiperda* F. Karlsburg (Deubel, von Hauptmann Zeltlich gesammelt).*fraxini* Panz. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg 21. April auf frisch abgeschnittenen Syringenszweigen in ausserordentlich grosser Zahl anschwärmend).1049. *Pteleobius Reitter*.*vittatus* F. Zibinsgebirge, Sachs.-Regen, Bistritz (Müller); Schässburg (Bielz). In der Rinde kranker und gefällter Fichten, im Zimmer oft schon im Februar schwärmend.1050. *Myelophilus Eichhoff*.*piniperda* L. Talmatschel, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz).1051. *Dendroctonus Erichs.**micans* Kugelann. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Propäste (bei Zernest, Deubel).1052. *Kissophagus Chapuis*.

(Xyletinus.)

pilosus Ratzebg. Schanta (auf gefälltem Fichtenholz, Ormay); Schuler, Kronstadt (Deubel).1053. *Polygraphus Erichs.**polygraphus* L. Frecker Gebirge (Serbota); Rodnagelbirge (c. a.); Bistra (Ormay); Schuler, Bucesecs (Deubel).

Hylastini.

1054. *Hylastes Erichs.*

Die Arten leben in der Rinde von Nadelholzern.

aler Payk. Retezat, S.-Regen, Borszék, Gyeké (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota); Schulergebirge (Balánbánya, c. a.); Erzgebirge (Müller).*cunicularius* Er. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Sachs.-Regen (Bielz); Gyergő-Fölgyes (Ormay); Retezat, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge, Schuler, Nagy-Hagymás (Deubel).var. *brunneus* Er. Zibinsgebirge (Bielz)*angustatus* Herbst. Kronstadt (Bielz)v. *attenuatus* Er. Talmatschel (Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Hylurgops.)

glabratus Zettl. decumanus Er.). Prasche, Kronstadt (Bielz); Schuler-Gebirge, Rodnagelbirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kerzer Gebirge, Schanta (Ormay); Nagy-Hagymás (Deubel).*palliatu*s Gyll. Prasche, Kronstadt, Borszék (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schulergebirge, Balánbánya (c. a.).1055. *Crypturgus Erichs.**pusillus* Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Oláhfalú, Borszék (Fichtenrinde, c. a.); Marosgebirge (Müller).*cinereus* Herbst. Kronstadt, Bodzaer Pass (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagelbirge, Bucesecs (Deubel).1056. *Thamnurgus Eichhoff*.*varipes* Eichh. Rosenau, Alsó-Bákos (Deubel).

Ipini.

1057. *Cryphalus Erichs.*

(Cryphalus s. str.)

piceae Ratzebg. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.); Schuler (Deubel).*abietis* Ratzebg. Zibinsgebirge (Bielz); Schuler, Bucesecs (Deubel)*saltuarius* Weise. Bucesecs (Deubel) (Erioporus.)*fagi* F. Schuler, Kronstadt (Zinne, Deubel).*liliae* Panz. Gross-Scheuern, Birtzhahn (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

(Trypophloeus.)

asperatus Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz). (Hypothenemus.)*Hampei* Ferrari. Siebenburgen (importiert).1058. *Pityophthorus Eichhoff*.*micrographus* L. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schuler, Bucesecs (Deubel).1059. *Pityogenes Bedel*.*chalcographus* L. In unseren Gebirgen verbreitet.v. *sexdentatus* Oliv. Kronstadt (Deubel)*bidentatus* Herbst. Zibinsgebirge, Negovan, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz)*quadridens* Hartig.v. *bistridentatus* Eichh. Hátszegi Geb. (Alpin, Deubel)1060. *Ips Degeer*.

(Tomicus Latreille.)

amitinus Eichh. Kerzer Gebirge (Bielz); Schuler, Krapatura bei Zernest (Deubel).*typographus* L. In unseren Gebirgen verbreitet.

laricis F. Borszék, Borgoer Pass (Bielz).
suturalis Gyll. Talmatschel (Bielz);
 Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
curvidens Germ. Zibinsgebirge, Mediasch
 (Bielz); Borszék (c. a.).
Verentzowi Jakobs. Kronstadt (Deubel).

1061. *Taphrorychus Eichhoff.*

bicolor Herbst. Götzenberg, Kronstadt
 (Bielz); Hätzszeg, Schässburg (c. a.);
 Rolenturm (Ormay).

1062. *Xylocleptes Ferrari.*

bispinus Duft. Gross-Scheuern, Talmatsch,
 Birthalm, Schässburg (Bielz); Michels-
 berg, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt
 (Zinne, Deubel); Bistritz, S.-Regen
 (Müller).

1063. *Dryocoetes Eichhoff.*

autographus Ratzebg. In unseren Gelirgen
 verbreitet.
villosus F. Präsbe, Kerzer Gebirge, Kron-
 stadt (Bielz); Balánbánya, Frecker Ge-
 birge, Oláhfalu (c. a.) Klausenburg
 (Müller).
 (Limantor.)
coryli Perris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

1064. *Xyleborus Eichhoff.*

eurygraphus Ratzebg. Kronstadt (Méhely).
Saxoseni Ratzeburg, Gross-Scheuern, Ham-
 mersdorf, Holzmingen, Pöresset, Kron-
 stadt, Schässburg (vom Nussbaum,
 Bielz); Also-Bakos, Rosenau (Deubel);
 S.-Regen (unter Rotbuchenrinde, Mül-
 ler).
dryographus Ratzeburg, Schässburg (c. a.);
 Rosenau, Neustadt (Deubel).
monographus F. Hermannstadt, Neudorf b.
 H., Brenndorf, Marosgebirge (Bielz);
 Retjezat, Schässburg, Oláhfalu (c. a.);
 Honigberg (Deubel); Klausenburg, S.-
 Regen (Müller).
 (Anisandrus.)
dispar F. Talmatschel, Marosgeb., Bielz;
 Hammersdorf, Schässburg, Grossalisch
 bei Sch., Karlsburg (c. a.); Kronstadt
 (Zinne, Deubel); Bistritz (Müller).

1065. *Xyloterus Erichs.*

(Trypodendron Stephens. pars.)

domesticus L. Retjezat, Zibins-Gebirge,
 Kerzer Gebirge, Kronstadt, Sächs.-
 Regen (Bielz), Hermannstadt (Ormay),
 Retjezat, Schässburg (c. a.), Zernöst,
 Schuler (Deubel).
signatus F. Hätzszeg (Bielz); Hermann-
 stadt (Ormay); Kronstadt (Deubel)

lineatus Oliv. Hätzszeg, Retjezat, Hermann-
 stadt, Zool., Präsbe, Kerzer Gebirge
 (Bielz); Frecker Gebirge (Schöb),
 Schässburg, Balánbánya, Borszék,
 Schulergebirge, Rodnagelirge (c. a.);
 Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).
 v. **melanocephalus** Eichh. Kronstadt, Zer-
 nest, Schuler (Deubel).

Platypini.

1066. *Platypus Herbst.*

cylindrus F. Hätzszeg, Petrozsény, Hermann-
 stadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Brenn-
 dorf, S.-Regen, Csákigorbó (Salamon,
 Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Ro-
 lenturm, Schässburg (im Holze ab-
 sterbender Eichen, c. a.).

Lamellicornia.

LXXV. Lucanidae.

Lucanini.

1067. *Lucanus L.*

cervus L. Durch das ganze Berg- und
 Hügelland, wo Eichenwälder vorhanden
 sind.

Die Larve, welche im Mulme alter Eichen
 lebt, macht sich einen Cocons von Eigrösse
 aus lehmiger Erde, in welchem sie sich verpüpft.
 v. **capreolus** Fuessl. Zusammen mit der
 Stammform.

1068. *Dorcus.*

parallelepipedus Mac. Leay. Durch das ganze
 Gebiet im Mulme alter Bäume und
 Baunstämme, auch in vermodernem
 altem Holz.

1069. *Systenocerus Weise.* (Platycerus auct.)

caraboides L. In Eichen- und Buchen-
 wäldern durch das ganze Gebiet.

v. **rutipes** Herbst. Zusammen mit der
 Stammform.

Sinodendrini.

1070. *Ceruchus Mac. Leay.*

chrysomelinus Hochw. Kerzer Gebirge,
 Kronstadt, Hosszufalu, Rodzaer Pass,
 Görgényer Gebirge, Marosgeb. (Bielz);
 Rodnagelirge, Borszék, Borszék (c. a.);
 Negoi (Albrecht); Marosgebirge (Mül-
 ler).

1071. *Sinodendron Hellwig.*

cylindricum L. Durch das ganze Gebiet,
 namentlich in den Buchenwäldern der
 Gebirge in mauligem Rotbuchenholz.

Aesallui.**1072. Aesalus Fabr.**

scarabaeoides Panz. Hermannstadt, Götzenberg, Kronstadt, Schässburg, Marosgebirge, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay). Im mohnigen Holze alter Eichen.

LXXVI. Scarabaeidae.**Troginae.****1073. Trox Fabr.**

Die Arten leben unter verwesenden Tierstoffen.

sabulosus L. Hermannstadt, Gross-Schenen, Fogarasz, Kronstadt (Bielz); Szamosújvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

hispidus Latrart. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, Záh (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

scaber L. Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, Schässburg, Gycke Záh (Bielz); Klausenburg, Thoräer Schlucht (c. a.).

Coprophagi.**Aphodini.****Psammoblina.****1074. Prammobius Heer.**

sulcicollis Illig. Hátszeg, Törzburger Pass, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Szamosújvár (Ormay); Karlsburg (c. a.); Honigberg (Altflus, Deubel). Ich sammelte die Art in Schässburg am Kokelufer in feuchtem Sande.

laevipennis Costa. Schässburg (einmal im Fluge gefangen, c. a.); Honigberg (Deubel).

1075. Rhyssemus Mulsant.

asper F. (germanus auct.). Hátszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Héviz, S.-Regen, Dees (Bielz); Kálán, Unterkiste, Schässburg (Kokelufer im Gemste, Fuchsbach, Wietberg unter Laub); Kronstadt (Deubel).

1076. Diastictus Mulsant.

vulneratus Sturm. Hermannstadt, Bösszfalu, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Rosenau (Deubel).

1077. Pleurophorus Mulsant.

caesus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Platytomus.)

sabulosus Muls. Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Aphodiina.**1078. Oxyomus Laporte.**

silvestris L. Durch das ganze Gebiet in verwesenden Tier- und Pflanzenstoffen, auch in Exkrementen.

1079. Aphodius Illiger.

Die Arten leben in tierischen Exkrementen.

(Copriformus.)

scrutator Herbst. In den Gärten und im Bergland verbreitet.

(Colobopterus.)

erraticus L. Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Oláhfaln (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Malomviz, Schässburg, Csukás, Halvelagen b. Sch., c. a.).

(Eupleura.)

subterraneus L. Neudorf b. H., Persány, Kronstadt, Mediasch, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg, Marosújvár, Kerzer Gebirge (c. a.); Alsó-Rákös (Deubel).

(Tenechestes.)

fossor L. Im Berg- und Hügelland verbreitet.

a sylvaticus Ahr. Paringulgebirge (Deubel).

(Otophorus.)

haemorrhoidalis L. Neudorf, Mediasch, Reps, Oláhfaln, Dees (Bielz); Nagyenyed, Intra-Gáld (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Előatak (c. a.); Bishütz, S.-Regen (Müller).

a sanguinolentus Herbst. Krepatura, Schuler (Deubel).

(Amoebia.)

brevis Fr. Hammersdorf, Talmatsch, Gycke (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Ormay); Kronstadt (c. a.); Klausenburg (Müller).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

(Aphodius.)

conjugatus Panz. Déva, Hammersdorf, Gross-Schenen, Thalleum, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (c. a.); Krizba (Deubel).

foetens F. Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Kerzer Gebirge, Rodnagelberge (c. a.).

timetarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Loraspis.)

sulcatus F. Hátszeg, Rotenturm (Bielz).

(Calamosternus.)

granarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Bodilus.)

sordidus F. Baróth (Méhely).

rufus Moll. Kerzer Gebirge, Mediasch, Harigita, Kelemengebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg, Kronstadt, Malomviz, Paringul (c. a.); Zernest (Deubel).

nitidulus F. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Nagyenved (Ormay); Schässburg (c. a.).

immundus Creutz. Hátszeg, Hermannstadt, Marienburg b. Kr. (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.).

(Agrilus.)

gibbus Germ. (transsylvanicus Küst.). In unseren Gebirgen verbreitet.

ater Deg. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schanta, Remete (b. Nagyenved, Ormay); Kronstadt (Deubel).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

constans Duftsch. Déva, Erzgebirge (Vormága, Bielz); Szováta (c. a.).

putridus Herbst. Hermannstadt (Bielz); Ratosnya (c. a.).

(Oromus.)

alpinus Scop. Zibins-Gebirge, Surul, Fogarascher, Kerzer, Arpascher Gebirge, Bucsecs (Bielz); Paringul, Rodnagebirge, Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

corvinus Er. Bucsecs (Deubel).

(Nialus.)

lividus Oliv. Hátszeg, Hammersdorf, Girelsau, Hosszufalu (Bielz); Bistra, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Sturmi Harold. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz).

varians Duft. (bimaculatus F.). Hátszeg, Ober-Sebes, Kronstadt, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Bistra, Schässburg, Marosujvár, Oláhfalú (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Dees (Deubel).

a. **ambiguus** Muls. Alsó-Rákös, Kronstadt (Deubel).

plagiatus L. Zibins-Gebirge (Bielz); Petrosény (c. a.); Schuler (Deubel).

niger Panz. Hátszeg, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch (Bielz).

(Plagiogonus.)

Kronstadt, Schässburg (c. a.).

rhododactylus Marsh. (arenarius Oliv.).

(Esimus.)

merdarius F. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schuler (Deubel).

(Trichonolus.)

scrofa F. Mediasch (Bielz).

(Orodalus.)

tristis Panz. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Pilis (bei Nagyenved), Karlsburg (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

pusillus Herbst. Ober-Sebes, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel); Szováta (c. a.).

v. **rufulus** Muls. Kronstadt, Schuler (Deubel).

quadriguttatus Herbst. Ober-Sebes (Bielz); Marosujvár (c. a.).

quadrinaculatus L. Rotenturm, Ober-Sebes, Marktschelken (Bielz).

biguttatus Germ. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

(Amidorus.)

obscurus F. Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Paringul, Balánbánya (c. a.); Schuler, Bodzaer Gebirge (Deubel).

thermicola Er. Neudorf b. H. (Bielz).

porcus F. Thalheim, Mediasch (Bielz).

(Volinus.)

pictus Sturm. Rotenturm (Bielz, c. a.); Kronstadt (Méhely).

sticticus Panz. Neudorf, Holzmeugen, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Hammersdorf, Keisl, Kronstadt (Deubel).

melanostictus Schmidt. Neudorf b. H., Tömscher Pass, Predeal (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hammersdorf, Klausenburg, Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

inquinatus Herbst. Im Berg- und Hügelland verbreitet.

tessulatus Payk. Neudorf b. H. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Deubel).

(Nimbis.)

obliteratus Panz. Hermannstadt, Neudorf b. H., Mediasch (Bielz).

(Melinopterus.)

prodromus Brahm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

punctatosulcatus Sturm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

consputus Creutz. Mediasch (Bielz); Rotenturm (c. a.).

serotinus Panz. Hátszeg, Thalheim (Bielz).

(Melaphodius.)

limbatus Germ. Siebenbürgen (Seidlitz).

(Limarius.)

maculatus Sturm. Zibinsgebirge, Sterpu (Dealu negru), Kerzer Gebirge, Kelemengebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).

(Agolius.)

mixtus Villa. Kerzer Gebirge, Porumbacher Gebirge, Präsbe (Ormay); Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Schuler, Bucsecs (Deubel).

(Biralus.)

montanus Er. (Deuteli Reiter). Schulergebirge (Deubel).

(Aerossus.)

satellitius Herbst. Reys, Marienburg bei Kr., Bistritz (Bielz), Marosujvár (c. a.).**rufipes** L. Im Gebirge und im Bergland verbreitet.**luridus** F. Im Berg- und Hügelland verbreitet.a. **nigripes** F. Kronstadt (Zinne, Méhely), Marosujvár (c. a.).a. **variegatus** Herbst. Klausenburg, Pils, Marosujvár (c. a.).**depressus** Kugel. Surul, Zibinsgebirge, Hermannstadt, Gr.-Schenern, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge (Bielz), Paringulgebirge (c. a.); Rosenau (Deubel); Marosgebirge (Müller).a. **atramentarius** Er. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

1080. *Heptaulacus Mulsant.*

villosus Gyll. Kronstadt (Deubel)**sus** Herbst. Zood (Bielz).

Aegialini.

1081. *Aegialia Latreille.*

(Psammoporus.)

sabuleti Payk. Bursacs (Deubel).

Hybosorini.

1082. *Ochodaenus Serville.*

chrysomeloides Schrank. Schässburg (c. a.).

Geotrupini.

1083. *Bolboceras Kirby.*

unicorne Schrank. Nagyág, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

1084. *Odontaeus Klug.*

armiger Scop. Mediasch (Bielz), Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchshoch, bei Sonnenuntergang schwärmend, 30. Juni). Wenck (August, Sepsiköröspatak (von Direktor Both gesammelt, c. a.); Kronstadt (Méhely); Kaisl, Kronstadt, Bolzaer Gebirge, Zernest (Deubel); Bistritz, Sächs.-Regen (Müller).

Die Tiere, welche im Juni schwärmend gesammelt wurden, sind ganz rötlichgelb gefärbt, während das im August gesammelte, ebenso das aus Sepsiköröspatak stammende Thier ganz schwarz ist.

1085. *Geotrupes Latreille.*

Die Tiere leben im Dünger, schwärmen nach Sonnenuntergang.

mutator Marsh. Hammersdorf, Héviz, Kronstadt, Tarlau (Bielz); Hermannstadt, Ladmesch (Ormay); Schässburg (c. a.).**spiniger** Marsh. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Albrecht).**stercorarius** Scriba. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Anoplotrupes.)

stercorosus Scriba (silvaticus Panz.). Durch das ganze Gebiet verbreitet, namentlich in Gebirgswäldern.

(Trypocopris.)

vernalis L. Refjezat, Hermannstadt, Götzenberg, Kronstadt, Mediasch, Marosgebirge, Bistritz (Bielz); Poplaka, Remete (b. Nagyenved), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg, Hilegyszamos, Balánbánya (c. a.).Nach Bielz soll auch *G. alpinus* Haenb. auf dem Kerzer Gebirge, Bursacs, Schulergeb., Tömöcher Pass und Pitra mare vorkommen, was mir nicht wahrscheinlich vorkommt; vielleicht ist der Irrtum durch die geringe Grösse des an diesen Lokalitäten vorkommenden *G. vernalis* veranlasst worden. Jedenfalls ist eine Feststellung notwendig.a. **autumnalis** Heer. Kronstadt, Tömöcher Pass, Bodzaer Pass, Hargita, Csiker Gebirge, Nagyhagymás (Bielz).

Copriini.

1086. *Scarabaenus Linne.*

pius Illiz. Oláh-Laposbánya (Bielz)

1087. *Gymnopleurus Illiger.*

Mopsus Pall. (Geoffroyi Fuessl.). Hátszeg, Déva, Gross-Schenern, Bielz; Flisabethstadt (Ormay), Hainbach (Albrecht).**Sturmi** Mac Leay. Kronstadt (Bielz); Puj b. Hátszeg, c. a.).

1088. *Sisyphus Latreille.*

Schaefferi L. Déva, Hermannstadt, Gross-Schenern, Mediasch, Záh (Bielz), Szamosujvár (Ormay), Klausenburg (c. a.).

1089. *Oniticellus Latreille.*

fulvus Goeze (flavipes F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

1090. *Onthophagus Latreille.*

Die Arten leben in tierischen Excrementen.

Amyntas Oliv. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Schenern, Hosszufalu, S.-Regen, Dees (Bielz), Szamosujvár (Or-

may); Pilis (bei Nagyenyed), Karlsburg, Klausenburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

taurus Schreber. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

ovatus L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

furcatus F. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzmengen, Marpod, Mezőség, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Salzburg (Albrecht).

semicornis Panz. Hátszeg, Déva, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Nagyenyed (Ormay); Klausenburg (c. a.).

verticicornis Laich. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Repts, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Marosujvár (c. a.).

vitulus F. (camelus F.). Hermannstadt, Schässburg, Záh (Bielz); Klausenburg (c. a.).

fracticornis Preysl. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

coenobita Herbst. Michelsberg, Götzenberg, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Klausenburg (c. a.); Bistritz (Müller).

austriacus Panz. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Pilis (bei Nagyenyed, c. a.); Klausenburg (Müller).

lemur F. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm (Ormay); Pilis (b. Nagyenyed), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

vacca L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

v. **medius** Panz. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Marosujvár (c. a.).

nuchicornis L. Dusch, Zibinsgebirge (Bielz); Intra-Gáld (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

1091. *Caccobius* Thoms.

Schreeberi L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

1092. *Copris* Geoffroy.

lunaris L. Durch das ganze Berg- und Hügelland in Rinderdünger.

Sericinae.

Sericini.

1093. *Serica* Mac. Leay.

brunnea L. Schiefthal, Hermannstadt, Michelsberg, Rotenturm, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch (Bielz); Schässburg, Balánbánya, Rodnagelberge (Hochalpin, c. a.); Nagy-Ilagymás (Deubel).

1094. *Maladera* Mulsant.

holosericea Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet. Ich sammelte den Käfer oft in Maulwurfshäuten.

1095. *Homaloplia* Stephens.

ruricola F. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Batosnya (c. a.); S.-Regen (Müller).

erythroptera Friv. (transsylvaniae Bielz). Schiefthal, Déva, Reussner Feiche, Gross-Scheuern, Marpod, Szombat, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hátszeg (c. a.).

v. **carbonaria** Blanch. Mit der Stammform.

Melotonthinae.

1096. *Rhizotrogus* Latreille.

(*Melotrogus*.)

aequinoctialis Herbst. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

vernus Germ. Kronstadt, Schässburg (Bielz); Bozdaer Gebirge (Deubel).

(*Rhizotrogus* s. str.)

maculicollis Villa. Talmatsch, Rotenturm (Bielz).

aestivus Oliv. Hammersdorf, Birtbähn (Bielz).

1097. *Amphimallus* Latreille.

solstitialis L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

ruficornis F. Fogarasch (Bielz).

assimilis Herbst. Déva, Götzenberg, Porcest, Kronstadt (Bielz); Prasbe, Előpatak, Rotenturm (c. a.); Bozdaer Gebirge (Deubel); Marosgebirge (Müller).

1098. *Melolontha* Fabr.

hippocastani F. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Borszék (auf Sahlweide), Klausenburg (c. a.); Talmesch (Landskrone), von Csiki erhalten (Deubel).

melolontha L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pectoralis Germ. S.-Regen (Bielz).

1099. *Polyphylla* Harris.

fullo L. Hátszeg, Karlsburg, Mühlbach, Reussmarkt, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Scheuk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Záh (Bielz); Salzburg, Nagyenyed (Ormay).

1100. *Anoxia Laporte.*

orientalis Kryn. Karlsburg, Hermannstadt (Bielz).
pilosa F. Klausenburg, Mediasch, Tartlau (Bielz).

Hoplinae.

1101. *Hoplia Illig.*

praticola Duft. Fogarasch, Mediasch, Birtalm, Schässburg, S.-Regen (Bielz), Klausenburg (c. a.).
philanthus Füssl. Zibinsgebirge (Bielz).
farinosa L. Michelsberg, Götzenberg, Krizba, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Talmesch (Ormay); Kalán, Vajda Hunyad (c. a.); Hátszeg (Deubel).
graminicola F. Rotenturm, Mediasch, Dees (Bielz); Nagyenyed, Szamosújvár, Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
hungarica Burm. Schässburg (c. a.), Kronstadt, Bucsecs (Méhely).

1102. *Anomala Samouelle.*

aurata F. (*auricollis* Lap.). Götzenberg, Präße, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay).
aenea Degeer. Auf Weidengebüsch durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
a. bicolor Torre. Retjezat (c. a.).
a. maculata Schilsky. Nagyenyed (c. a.).
a. cyanea Torre. Retjezat (c. a.).
oblonga F. Hermannstadt, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Fogarascher Gebirge, Schässburg (c. a.).
a. bicolor Schilsky. Rotenturm (c. a.).
vitis F. Kovászna (Méhely).

1103. *Phyllopertha Kirby.*

horticola L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1104. *Anisoplia Serville.*

segetum Herbst. Szombat, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
agricola Poda (*villosa* Geoffr.). Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Hátszeg, Rosenau (Deubel); S.-Regen (Müller).
bromicola Germ. Kerzer Gebirge, Gyeke, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Retjezat (c. a., auf Roggenähren).
austriaca Herbst. Kerzer Gebirge, Szombat, S.-Regen (Bielz).
graminivora Dufour (*tempestiva* Er.). Salzburg (Ormay).
cyathigera Scop. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Bukszad, S.-Regen (Bielz);

Salzburg, Stolzenburg (Ormay); Hosszufalu (c. a.).

lata Lr. Hosszufalu? (Bielz). Karlsburg (c. a.); Gyeke auf Hafer. Méhely. Ich besitze vier Exemplare aus Hosszufalu, welche aber *cyathigera* sind; daher erscheint mir das Vorkommen des *A. lata* in Hosszufalu fraglich.

flavipennis Brull. Mezöség, Gyeke (Bielz).
dispar Er. Salzburg (Ormay).

Dynastinae.

1105. *Oryctes Illig.*

nasicornis L.
 var. *grypus* Illig. Hátszeg, Karlsburg, Hermannstadt, Neudorf bei H., Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz), Nagyenyed (Ormay); Grosspold (Albrecht).

1106. *Pentodon Hoppe.*

idiota Herbst. Bistritz, Magyar-Lapos (Bielz).

Valginae.

1107. *Valgus Scriba.*

hemipterus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, auf Blüten, aber auch nicht selten an Hausmauern.

Trichiinae.

1108. *Osmoderma Serville.*

eremita Scop. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Girelsau, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat (Ormay).

1109. *Gnorimus Serville.*

variabilis L. Karlsburg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Tartlau, Mediasch, Csiker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Tartlau (Deubel).

nobilis L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

1110. *Trichius Fabr.*

fasciatus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

abdominalis Mén. Götzenberg, Girelsau, Vistertal, Néviz, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz), Hammersdorf, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Hlászág bei Kleinkopisch (c. a.).

Cetoniinae.

1111. *Tropinota Mulsant.*
(*Epicometis* Burmeister.)

hirta Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, namentlich auf *Leontodon taraxacum*.

1112. *Oxythyrea Mulsant.*
(*Leucoscelis* Burmeister.)

funesta Poda. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1113. *Cetonia Fabr.*

aurata L. Durch das ganze Gebiet auf verschiedenen blühenden Pflanzen und am ausfliessenden Saft der Bäume.

1114. *Liocola Thomson.*

marmorata F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1115. *Potosia Mulsant.*

aeruginosa Drury (*speciosissima* Scop.). Hermannstadt, Hammersdorf, Girelsau, Zood, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz).

affinis Andersch. Karlsburg, Kronstadt (Bielz).

cuprea F. (*floricola* auct.). Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Bistrilz (Bielz); Salzburg, Michelsberg, Riu Szat (Ormay); Előpatak, Schässburg (c. a.).

v. *metallica* Herbst. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Oláhfalú (c. a.).

hungarica Herbst. Karlsburg, Reussner Teiche, Stolzenburg, Gross-Schenk, Törmöcher Pass, Előpatak, Klausenburg, Oláhfalú, Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz).

Üebersicht unserer Käferfauna

nach Familien, Gattungen, Arten und Varietäten.

Familien	Gat- tungen	Arten	Varie- täten	Subvarie- täten	Familien	Gat- tungen	Arten	Varie- täten	Subvarie- täten
1. Cicindelidae	1	9	1	10	39. Helodidae	8	14	3	
2. Carabidae	70	460	109	42	40. Dryopidae	7	19	2	
3. Halipidae	2	10	1	—	41. Georyssidae	1	4		—
4. Dytiscidae	19	78	1	—	42. Heteroceridae	2	11		
5. Gyrinidae	2	5	1	—	43. Dermestidae	9	28	1	
6. Rhysodidae	1	2	—	—	44. Nosodendridae	1	1		—
7. Staphylinidae	141	852	50	8	45. Byrrhidae	11	27	3	2
8. Pselaphidae	18	72	6		46. Dascillidae	1	1		—
9. Clavigeridae	1	2	—		47. Elateridae	32	126	15	7
10. Scydmaenidae	9	48	1		48. Cerophytidae	1	1	—	
11. Silphidae	22	66	2	1	49. Eucnemidae	7	16	1	
12. Liodidae	10	53	6		50. Buprestidae	18	67	5	
13. Clambidae	2	6	—	—	51. Lymexylidae	2	2	2	—
14. Leptinidae	4	1	—	—	52. Bostrichidae	5	5		—
15. Corylophidae	5	12	—	—	53. Lyctidae	1	2	—	—
16. Sphaeriidae	1	1	—		54. Ptinidae	3	18	—	—
17. Trichopterygidae	9	25	1		55. Anobiidae	15	39	3	
18. Scaphidiidae	3	7			56. Oedemeridae	7	21	—	—
19. Histeridae	15	60	3		57. Pythidae	5	9	—	
20. Hydrophilidae	23	93	11	—	58. Pyrochroidae	1	3		
21. Cantharidae	33	139	16	—	59. Hylphilidae	2	3	1	
22. Cleridae	41	18	3	—	60. Anthicidae	5	20	1	
23. Derodontidae	2	2	—	—	61. Meloidae	10	30	1	
24. Byturidae	1	2		1	62. Rhipiphoridae	2	2	—	
25. Ostomidae	5	7			63. Mordellidae	8	34		6
26. Sphaeritidae	1	1			64. Melandriidae	15	31	2	
27. Nitidulidae	24	125	12	10	65. Lagriidae	2	3	—	—
28. Cucujidae	12	33	2		66. Alleculidae	8	19	2	4
29. Cryptophagidae	13	92	4	1	67. Tenebrionidae	28	51	—	
30. Erotylidae	6	16	1	—	68. Cerambycidae	68	188	13	19
31. Phalacridae	3	18	2		69. Chrysomelidae	68	419	31	92
32. Lathridiidae	7	44	2	—	70. Lariidae	3	20	2	—
33. Mycetophagidae	5	12	2	6	71. Anthribidae	7	18		—
34. Sphindidae	2	3			72. Curculionidae	133	783	47	48
35. Cisidae	6	30	2	—	73. Nemomychidae	2	2	—	—
36. Colydiidae	20	29	—	—	74. Ipidae	22	57	5	—
37. Endomychidae	10	19	1	4	75. Lucanidae	6	6	2	—
38. Coccinellidae	29	63	8	52	76. Scarabaeidae	13	148	6	10
					1117	4763	402	324	

Index alphabeticus Generum.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Abacopercus . . .	31	Aleochara . . .	102	Anthophagus . . .	55	Batriscus . . .	106
Abax . . .	31	Aleuonota . . .	91	Anthracus . . .	28	Baudia . . .	24
Abdera . . .	228	Alexia . . .	178	Anthrenus . . .	192	Bembidium . . .	14
Abattaria . . .	118	Allecula . . .	231	Anthribus . . .	288	Berosus . . .	131
Abemus . . .	75	Allodactylus . . .	324	Aparopion . . .	314	Bessolna . . .	93
Abraeus . . .	129	Allosterna . . .	242	Aphidecta . . .	181	Bessopora . . .	101
Absidia . . .	139	Alophus . . .	313	Aphodius . . .	352	Betarmen . . .	202
Acalles . . .	322	Alpacus . . .	10	Aphthona . . .	281	Biblopectus . . .	106
Acalyptus . . .	332	Alphitobius . . .	236	Apimela . . .	91	Biblioporus . . .	106
Acanthocinus . . .	249	Alphitophagus . . .	235	Apion . . .	339	Bidessus . . .	43
Acanthoderes . . .	249	Amalus . . .	324	Apistus . . .	176	Bisnius . . .	71
Acanthopus . . .	237	Amara . . .	29	Apoderus . . .	345	Bius . . .	237
Acentrus . . .	317	Amarochara . . .	99	Apteropoda . . .	284	Blaps . . .	233
Achenium . . .	67	Amauronyx . . .	106	Aptinus . . .	42	Blechnus . . .	40
Acidota . . .	54	Amblistomus . . .	24	Archontas . . .	196	Bledius . . .	59
Acilius . . .	48	Amblystus . . .	26	Areopagus . . .	108	Bledius . . .	59
Aclypea . . .	117	Amoecius . . .	352	Argoptochus . . .	298	Blethisa . . .	11
Acmæodera . . .	210	Amphichroum . . .	54	Argopus . . .	284	Blitophaga . . .	117
Acmæops . . .	239	Amphicyllis . . .	120	Argutor . . .	33	Bolboceras . . .	355
Acritus . . .	129	Amphimelus . . .	358	Arrhenoplita . . .	235	Boletophagus . . .	234
Aerognathus . . .	56	Amphotis . . .	150	Aromia . . .	246	Bolitobius . . .	82
Acrolocha . . .	52	Anacaena . . .	132	Arpedium . . .	54	Bolitochara . . .	90
Acrodon . . .	30	Anaesthetis . . .	251	Arthrolips . . .	123	Boopinus . . .	57
Acrulia . . .	52	Anaglyptus . . .	247	Asaphidion . . .	13	Borboropora . . .	91
Actephilus . . .	27	Anaspis . . .	226	Asemum . . .	244	Boros . . .	237
Actobius . . .	71	Anatis . . .	183	Aspidiphorus . . .	173	Bostrychus . . .	213
Acupalpus . . .	27	Anaulacaspis . . .	90	Astenus . . .	63	Bothrideres . . .	177
Acylophorus . . .	80	Anchastus . . .	202	Astilbus . . .	97	Botriopterus . . .	33
Adafia . . .	182	Anchomenus . . .	37	Astrapæus . . .	80	Bothynoderes . . .	308
Adelocera . . .	196	Anchus . . .	38	Astynomus . . .	249	Brachida . . .	86
Adelosia . . .	32	Ancistronycha . . .	137	Atemeles . . .	98	Brachycerus . . .	308
Aderees . . .	124	Ancyrophorus . . .	56	Atheta . . .	91	Brachygluta . . .	107
Adexius . . .	314	Anemadus . . .	116	Athous . . .	205	Brachylacon	
Adimonia . . .	274	Anisarthron . . .	244	Atomaria . . .	165	(Lacon) . . .	196
Adonia . . .	181	Anisodactylus . . .	28	Attagenus . . .	191	Brachynus . . .	42
Adosomus . . .	309	Anisoplia . . .	359	Attalus . . .	113	Brachydontus . . .	324
Adoxus . . .	263	Anisosticta . . .	181	Attelabus . . .	345	Brachypterus . . .	149
Adrastus . . .	199	Anisotoma . . .	120	Auletes . . .	343	Brachysomus . . .	302
Aegialia . . .	355	Anobium . . .	216	Aurigena . . .	208	Brachyta . . .	239
Aegosome . . .	238	Anodus . . .	76	Autalia . . .	90	Brachytarsus . . .	288
Aetophorus . . .	41	Anolisus . . .	137	Axinotarsus . . .	143	Brachytemnus . . .	321
Aesalus . . .	351	Anomala . . .	359			Bracteon . . .	14
Agabus . . .	46	Anonimatus . . .	177			Bradibatus . . .	332
Agapanthia . . .	251	Anoncodes . . .	218	Badister . . .	24	Bradycellus . . .	28
Agaricochara . . .	87	Anophthalmus . . .	21	Bagous . . .	319	Bradytus . . .	30
Agaricophagus . . .	119	Anoplodera . . .	240	Balaninus . . .	331	Bromius . . .	263
Agathidium . . .	120	Anopleta . . .	93	Balanobius . . .	331	Broscus . . .	13
Agelastica . . .	273	Anoplus . . .	334	Baptolinus . . .	70	Bruchidius . . .	287
Aglenus . . .	175	Anotylus . . .	58	Baris . . .	329	Bruchus . . .	286
Agnaathus . . .	231	Anoxia . . .	359	Barynotus . . .	307	Bruxaxis . . .	107
Agonum . . .	37	Anthaxia . . .	209	Baryodina . . .	103	Bryobius . . .	35
Agrilus . . .	211	Anthrophagus . . .	165	Barypithes . . .	302	Bryocharis . . .	83
Agriotes . . .	199	Anthicus . . .	221	Batenus . . .	38	Bryoporus . . .	82
Agyrtes . . .	118	Anthobium . . .	51	Bathyscia . . .	114	Buprestis . . .	209
Alaobia . . .	93	Anthocomus . . .	144	Batophila . . .	280	Byctiscus . . .	345
Alconotha . . .	92	Anthonomus . . .	331	Batriscodes . . .	106	Byrrhus . . .	194

	Seite		Seite		Seite		Seite
Bythinus . . .	108	Chaetocnema . . .	278	Coprophilus . . .	56	Dapalinus . . .	316
Byturus . . .	148	Chaleoides . . .	277	Coproporus . . .	85	Dapsa . . .	179
Caccobius . . .	357	Chalcophora . . .	208	Coptocephala . . .	257	Daptus . . .	24
Caccoporus . . .	58	Charopus . . .	112	Coraeus . . .	211	Dascillus . . .	195
Caenocara . . .	217	Chatartus . . .	160	Corylophus . . .	123	Dasyceus . . .	169
Caenocorse . . .	236	Chaporus . . .	35	Corticaria . . .	170	Dasytes . . .	144
Caenoptera . . .	242	Chilocorus . . .	184	Corticarina . . .	171	Dasytiscus . . .	145
Caenoscelis . . .	165	Chiloneus . . .	301	Corticeus . . .	235	Dechomus . . .	177
Calamobius . . .	251	Chilopora . . .	99	Corticeus . . .	176	Deleaster . . .	56
Calandra . . .	330	Chilotoma . . .	257	Corylophus . . .	123	Deltoomerus . . .	22
Calathus . . .	37	Chlaenites . . .	23	Corymbites . . .	196	Demetrius . . .	41
Calitys . . .	148	Chlaenius . . .	23	Corynetes . . .	147	Demosoma . . .	101
Calusa . . .	91	Chloridium . . .	14	Coryphiodes . . .	56	Dendrobium . . .	216
Callicerus . . .	97	Chlorophanus . . .	307	Corysomerus . . .	329	Dendroctonus . . .	347
Calidium . . .	245	Choleva . . .	114	Cossonus . . .	321	Dendrophagus . . .	160
Callimus . . .	243	Cholerus . . .	113	Craponius . . .	324	Dendrophilus . . .	127
Callipora . . .	2	Choragus . . .	289	Cratararea . . .	102	Denops . . .	146
Callistus . . .	23	Chromoderus . . .	309	Creniphilus . . .	132	Denticollis . . .	206
Callostocarabus . . .	4	Chrysanthia . . .	218	Creocephalus . . .	76	Deporaus . . .	344
Calodera . . .	99	Chrysobothris . . .	210	Crepidodera . . .	275	Dermostes . . .	190
Calopterus . . .	36	Chrysocarabus . . .	4	Criocephalus . . .	213	Derocrepis . . .	275
Calopus . . .	217	Chrysochloa . . .	268	Crioceris . . .	256	Derodontus . . .	148
Calosoma . . .	2	Chrysochus . . .	263	Cryphalus . . .	348	Deronectes . . .	43
Calypsa . . .	88	Chrysomela . . .	264	Cryphiphorus . . .	297	Deroplia . . .	250
Calvia . . .	181	Cicindela . . .	1	Cryptarcha . . .	157	Deropoda . . .	101
Calypotomerus . . .	122	Cicones . . .	176	Crypticus . . .	234	Deubelia . . .	100
Calytis . . .	148	Cidnorrhinus . . .	324	Cryptobium . . .	67	Deuterocharabus . . .	8
Camptorrhinus . . .	321	Cionus . . .	337	Cryptocephalus . . .	258	Deixiogra . . .	102
Campylus . . .	206	Cis . . .	174	Cryptohypnus . . .	200	Diachromus . . .	28
Cantharis . . .	137	Cistela . . .	194	Cryptophagus . . .	162	Dialycera . . .	52
Capnodis . . .	208	Clambus . . .	122	Cryptopleurum . . .	136	Dianous . . .	63
Carabus . . .	3—5	Claviger . . .	110	Cryptorhynchus . . .	322	Diaperis . . .	234
Cardioli . . .	91	Clemmus . . .	178	Cryptotrichus . . .	36	Diastictus . . .	351
Cardiophorus . . .	201	Clemmys . . .	178	Crypturgus . . .	348	Dibolia . . .	283
Cardiphilus . . .	57	Cleoecharis . . .	66	Ctenopus . . .	233	Dicerea . . .	208
Carpathobirrhululus . . .	191	Cleonus . . .	309	Ctenistes . . .	109	Dichirotrichus . . .	28
Carpathophilus . . .	8	Cleopus . . .	336	Ctesias . . .	192	Dichotrachelus . . .	313
Carpheis . . .	82	Clerus . . .	147	Cucujus . . .	160	Dictyopterus . . .	136
Carpophilus . . .	150	Clibanarius . . .	39	Curinus . . .	135	Dikera . . .	91
Cartodera . . .	340	Clivina . . .	12	Cybister . . .	49	Dilus . . .	243
Cartodere . . .	170	Clytanthus . . .	247	Cybocephalus . . .	157	Dima . . .	196
Cassida . . .	285	Clytra . . .	257	Cychramus . . .	156	Dimetrota . . .	95
Cateretes . . .	149	Clytus . . .	246	Cychrus . . .	2	Dinaraea . . .	92
Cathartus . . .	160	Cnemidotus . . .	42	Cyclonolum . . .	134	Dinarda . . .	102
Cathusia . . .	91	Coccidula . . .	186	Cylindrosoma . . .	126	Dinoderus . . .	213
Catopomorphus . . .	115	Coccinella . . .	182	Cyllodes . . .	156	Dinodes . . .	23
Catops . . .	115	Coelambus . . .	43	Cymbiodyta . . .	133	Dinopsis . . .	85
Cela . . .	30	Coeliastes . . .	324	Cymindis . . .	41	Diodesma . . .	176
Cephalotes . . .	13	Coeliodes . . .	323	Cymegetis . . .	180	Diphyllus . . .	168
Cephennium . . .	110	Coelostoma . . .	134	Cyphea . . .	88	Diplocampa . . .	18
Cerambyx . . .	213	Colaphus . . .	263	Cyphocleonus . . .	309	Diplocoelus . . .	168
Ceranota . . .	103	Colenis . . .	119	Cyphon . . .	187	Diraeca . . .	228
Cercus . . .	149	Colobicus . . .	176	Cyphas . . .	345	Dirrhagus . . .	207
Cereyon . . .	135	Colony . . .	116	Cyrtanaspis . . .	226	Ditoma . . .	176
Cerocoma . . .	223	Colydium . . .	175	Cyrtocelytus . . .	247	Dodecastichus . . .	289
Cerophytum . . .	207	Colymbetes . . .	48	Cyrtotonotus . . .	30	Dolieaon . . .	67
Ceruchus . . .	350	Combocerus . . .	168	Cyrtoseydinus . . .	112	Dolichosoma . . .	145
Cerylon . . .	177	Conalia . . .	225	Cirtotriplax . . .	167	Dolichus . . .	37
Cetonia . . .	361	Coniatus . . .	317	Cyrtusa . . .	120	Dolopius . . .	198
Centorrhynchidius . . .	326	Conioleonus . . .	308	Cystoplastus . . .	120	Donacia . . .	253
Centorrhynchus . . .	326	Conosoma . . .	83	Cytilus . . .	194	Dorcadion . . .	248
Chaetarthria . . .	134	Conurus . . .	83	Dacne . . .	167	Dorcatoma . . .	217
Chaetocarabus . . .	4	Copelatus . . .	47	Dadobia . . .	97	Dorcus . . .	350
		Cophosus . . .	34	Dadopora . . .	150	Dorymerus . . .	293
		Copris . . .	3-7	Danaceae . . .	145	Dorytomus . . .	318
		Coprochara . . .	103			Dracica . . .	92

	Seite		Seite		Seite		Seite
Lamia	248	Lithocharis	65	Miarus	336	Neorescius	24
Lamprias	39	Laxus	309	Micetotrogus	333	Nephanes	124
Lamprinodes	83	Lobrathium	66	Mielus	190	Nephus	186
Lamprinus	83	Lochnaea	274	Mierambe	162	Nestus	60
Lamprorhiza	137	Lochmusa	98	Mieraspis	183	Neuraphes	111
Lamprosoma	262	Longitarsus	282	Merocara	187	Niphethodes	56
Lamproyris	137	Lopha	17	Microderes	27	Niptus	214
Langelandia	177	Loricera (Loricera)	12	Migroglossa	102	Nitidula	152
Lareynia	189	Lorocera	12	Microlestes	10	Nivellia	240
Laria	286	Lucanus	350	Micropeplus	50	Nosodendron	193
Laricobius	148	Luciola	137	Microsaurus	77	Nosodes	148
Larinus	310	Ludius	199	Microtherium	111	Nossidium	123
Lasia (Subcoecina)	180	Luperus	273	Microzoum	234	Notaphus	15
Lasioderma	217	Lycoperdina	179	Micrurula	152	Notaris	318
Lastoharpalus	26	Lyctus	213	Minota	278	Noterus	44
Lathinus	189	Lydus	223	Minyops	312	Notiophilus	11
Lathridius	69	Lygistopterus	137	Mniobates	99	Notothecta	97
Lathrimacum	54	Lymexylon	212	Mniophila	284	Notoxus	221
Lathrobium	66	Lyperosomus	3	Mnusa	100	Nudobius	70
Lathropus	361, 362	Lyprus (Bagous)	319	Molops	31		
Lobia	39	Lythraria	277	Molorechus	242	Oberca	253
Leiestes	179	Lytha	223	Molytes	313	Obrum	243
Leiosoma	314			Monochamus	219	Ocalea	100
Leirides	30	Magdalis	338	Mononychus	323	Ochina	217
Leistidius	10	Malachius	143	Monotoma	159	Ochodacus	355
Leistotrophus	76	Maladera	358	Montandonia	150	Ochthebus	130
Leistus	9	Malchinus	141	Mordella	225	Ochthenomus	222
Lema	255	Malthinus	141	Mordellistena	225	Ochthophilus	
Leptacinus	68	Malthodes	141	Morinus	248	(Perileptus)	19
Leptinus	122	Mantura	278	Morphocarabus	6	Octoemmus	175
Leptomastax	113	Marmaropus	325	Morychus	193	Ocybus	76
Leptura	240	Marolia	230	Mycetaea	179	Ocyusa	100
Leptusa	88	Mecaspis	309	Mycetina	179	Odacantha	41
Leptyrus	308	Mecanotarsus	221	Mycetochara	232	Odeonta	355
Lesteva	54	Mecinus	335	Mycetodrepa	101	Oedeptoma	117
Leucocelis (Oxythyraea)	361	Medon	66	Mycetophagus	172	Oedemera	218
Leucoparyphus	85	Megacronus (Bricharis)	83	Mycetoporus	81	Olibus	168
Leucosomus	378	Megalodorus	110	Mycterus	220	Oligomerus	216
Licinus	24	Megapenthes	202	Miclophilus	347	Oligota	86
Lichenium	234	Megarthus	70	Mylabris	286	Olisthaerus	
Laesthes	179	Megasternum	136	Mylacus	298	(Stilbus)	169
Lagnyodes	333	Megatoma	191	Myllaena	86	Olistherus	50
Limnebius	134	Megodontus	3	Myrmecoxenus	177	Olisthopus	37
Limnichus	193	Melandrya	230	Myrmecodonia	98	Olophrum	54
Limnobaris	330	Melanion	234	Myrmoeccia	98	Omalius	53
Limnocarabus	5	Melanophila	209	Myrrha	184	Omaseus	33
Limnoxenus	132	Melanophthalma	171	Mysia	183	Omas	303
Limobius	317	Melanotus	201	Nacorda	218	Omoglynnius	49
Limodromus	38	Melasia	236	Nalassus	237	Omophilus	233
Limoniis	204	Melasis	207	Nanophyes	338	Omophron	10
Limoxenus	132	Melasoma	272	Napochus	112	Omosiphora	152
Lina	272	Melous	313	Nargus	114	Omosita	152
Liocola	361	Meligethes	153	Nebria	10	Oncomera	218
Liodes	119	Meloe	22	Necrobia	147	Oniticellus	356
Lionychus	40	Melolontha	358	Necrodes	117	Ontholestes	76
Liophiloeus	305	Menephilus	236	Necrophilus	118	Onthophagus	356
Lioplerus	47	Menesia	252	Necrophorus	117	Onthophilus	129
Liopus	250	Mesagroicus	303	Necydalis	242	Oodes	23
Liosoma	314	Mesosa	250	Neja	14	Oospaerula	119
Liotrichus (Haplotarsus)	198	Metaxya	92	Nemadus	116	Ootyus	166
Liparus	313	Metopsia	50	Nemosoma	148	Opatrum	234
Lissodema	219	Metabletus	40	Nemomyx	346	Opatroides	234
Litargus	173	Metallina	14	Neobisnius	71	Opetiopalpus	147
		Metococcus	224	Neodorcadion	217	Ophonus	24
				Neophilonthus	314	Opilo	146
						Orchesia	227

	Seite		Seite
Orchestes . . .	334	Percosia . . .	31
Orectochilus . . .	49	Perileptus . . .	19
Oreobius . . .	9	Periphus . . .	15
Oreodytes . . .	43	Peritelus . . .	298
Oreophilus . . .	35	Perotis . . .	208
Oreostiba . . .	92	Petrophilus . . .	35
Orestia . . .	277	Phaedon . . .	271
Orina . . .	268	Phaenops . . .	209
Orinocarabus . . .	8	Phaganthus . . .	55
Orithales . . .	198	Phalacrus . . .	168
Orites . . .	34	Phausis . . .	137
Orobitis . . .	330	Phelates . . .	204
Orophius . . .	175	Philochthus . . .	18
Orphilus . . .	192	Philonthus . . .	71
Orsodacne . . .	251	Philorinum . . .	54
Orthocerus . . .	176	Philydrus . . .	133
Orthochaetes . . .	320	Phloeobium . . .	50
Orthoperus . . .	123	Phloeocharis . . .	50
Orthopleura . . .	147	Phloeodroma . . .	99
Oryctes . . .	369	Phloeonomus . . .	53
Osmoderma . . .	360	Phloeopara . . .	99
Osphya . . .	231	Phloeophthorus . . .	346
Ostoma . . .	148	Phloeostiba . . .	53
Othius . . .	70	Phloeostichus . . .	161
Otiorrhynchus . . .	289	Phloeostrya . . .	228
Oxylaemus . . .	177	Pholeuon . . .	114
Oxymirus . . .	239	Phosphaenus . . .	137
Oxyomus . . .	352	Phosphuga . . .	117
Oxinotilus . . .	43	Phratora (Phyllo-	
Oxypoda . . .	100	decta) . . .	270
Oxyporus . . .	60	Phricocarabus . . .	9
Oxytelus . . .	57	Phrydiuchus . . .	325
Oxythyraea . . .	361	Phryganophilus . . .	231
		Phthorophloeus . . .	346
Pachnephorus . . .	263	Phyllobius . . .	299
Pachnida . . .	92	Phyllobrotica . . .	273
Pachybrachus . . .	262	Phyllopecta . . .	270
Pachycerus . . .	308	Phyllorepes . . .	52
Pachygluta . . .	88	Phylloredrepoidea . . .	53
Pachyta . . .	239	Phyllopertha . . .	359
Pachytichius . . .	317	Phyllotreta . . .	280
Paederidius . . .	64	Phymatodes . . .	244
Paederus . . .	64	Phymatura . . .	89
Palorus . . .	236	Phytohaenus . . .	220
Panagaeus . . .	23	Phytobius . . .	325
Paophilus . . .	302	Phytodecta . . .	270
Paracynus . . .	133	Phytoecia . . .	252
Paramesochoma . . .	162	Phytonomus . . .	316
Parastenius . . .	62	Pidonia . . .	240
Pardileus . . .	25	Pilemia . . .	252
Parnus (Dryops) . . .	188	Pisadia . . .	89
Paromalus . . .	127	Pissodes . . .	317
Parophonus . . .	25	Pityogenes . . .	348
Pasilia . . .	88	Pityophagus . . .	157
Patrobis . . .	22	Pityophthorus . . .	348
Padiacus . . .	161	Placusa . . .	87
Pedilophorus . . .	114	Plagiodera . . .	272
Pedinus . . .	233	Plagionotus . . .	246
Pedius . . .	32	Planeus-tomus . . .	56
Pelecotoma . . .	224	Plataraea . . .	93
Pella . . .	98	Platambus . . .	47
Pelochares . . .	193	Plataphodes . . .	15
Peltis . . .	117	Plataphus . . .	15
Pentaria . . .	226	Plateumaris . . .	251
Pentaphyllus . . .	235	Platycarabus . . .	4
Pentodon . . .	360	Platyctis . . .	136

	Seite		Seite
Platydema . . .	235	Pseudolinnaeum . . .	15
Platydomene . . .	66	Pseudophonus . . .	25
Platyderus . . .	36	Pseudoptochus . . .	302
Platydracus . . .	75	Pseudotriphylus . . .	172
Platynaspis . . .	185	Pseudophytobius . . .	324
Platynus . . .	38	Psoa . . .	213
Platyola . . .	101	Psylliodes . . .	279
Platypus . . .	350	Pteleobius . . .	347
Platyrhinus . . .	288	Ptenidium . . .	124
Platyseelis . . .	233	Pterostichus . . .	32
Platysma . . .	33	Pteryngium . . .	162
Platysoma . . .	126	Pteryx . . .	124
Platystethus . . .	58	Ptilinus . . .	216
Platystomus . . .	288	Ptilolum . . .	124
Platytarsus . . .	302	Ptilium . . .	124
Plectrophloeus . . .	104	Ptinella . . .	124
Plectroscelis . . .	278	Ptinus . . .	214
Plegaderus . . .	128	Ptomaphagus . . .	116
Pleganophorus . . .	179	Ptosima . . .	210
Pleurophorus . . .	351	Pullus . . .	185
Plinthus . . .	313	Purpuricenius . . .	246
Pocadius . . .	156	Pycnomerus . . .	177
Podabrus . . .	137	Pycetocraerus . . .	58
Podagrica . . .	275	Pygidia . . .	140
Podonta . . .	233	Pyrochroa . . .	220
Poecilonota . . .	209	Pyropterus . . .	136
Poecilus . . .	32	Pyrrhidium . . .	245
Pogonidium . . .	14	Pytho . . .	219
Pogonistes . . .	22		
Pogonocerus . . .	259	Quedionuchus . . .	78
Pogonochaerus . . .	250	Quedius . . .	76
Pogonophorus . . .	9		
Pogonus . . .	22	Rabigus . . .	74
Polychara . . .	103	Reichenbachia . . .	107
Polydrosus . . .	300	Rhagium . . .	238
Polygraphus . . .	347	Rhagonycha . . .	139
Polyphylla . . .	358	Rhamnusium . . .	238
Polystichus . . .	41	Rhamphus . . .	335
Poophagus . . .	329	Rhantus . . .	47
Porcinolus . . .	195	Rhinocyllus . . .	3
Porthmidius . . .	202	Rhinomacer . . .	34
Potamophilus . . .	188	Rhinomias . . .	
Potosia . . .	362	(Omias) . . .	303
Prasocuris . . .	271	Rhinoncus . . .	325
Pria . . .	153	Rhinosimus . . .	220
Princidium . . .	14	Rhizobius . . .	156
Prionocyphon . . .	187	Rhizophagus . . .	157
Prionus . . .	238	Rhizotrogus . . .	358
Pryonychus . . .	231	Rhopalodontus . . .	175
Pristilophus (Neo-		Rhopalopus . . .	245
pristilophus) . . .	198	Rhynchaenus . . .	334
Pristonychus . . .	36	Rhynchites . . .	344
Procerus . . .	2	Rhyncolus . . .	321
Procraterus . . .	202	Rhysodes . . .	49
Procrustes . . .	3	Rhyssenus . . .	351
Pronomaea . . .	86	Rhytidosoma . . .	324
Propylaea . . .	184	Riolus . . .	189
Prosternon . . .	198	Rosalia . . .	245
Prostomis . . .	161	Rybaxis . . .	107
Proteinus . . .	51		
Psallidium . . .	305	Sacium . . .	122
Psammbius . . .	351	Saperda . . .	251
Psammodius . . .	351	Saphanus . . .	243
Psammoecus . . .	160	Saprinus . . .	128
Pselaphus . . .	109	Sauleyella . . .	104
Pseudocleonus . . .	309	Scaphidema . . .	234

ICI '87

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00074 5315